

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-802437

Promis

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : 00372	Société : RAM	184089	
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : Bassette Halima			
Date de naissance : 01/01/1946			
Adresse : Asifc N° 319 Marrakech			
Tél. : 06 61 20 89 20	Total des frais engagés : 757,60 Dhs		

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin	<i>Dr SARA DILAI Spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux et Abdelkarim El Khatib Appt. N°1 Imm 5 Angle Allal El Fassi El Khatib - Marrakech</i>		
Cachet du médecin :			
Date de consultation :	31/10/2023		
Nom et prénom du malade :	Bonne Flâneuse 77 ans		
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	HTA + Diabète + Dyslipidémie		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à Marrakech le 31/10/2023.

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT	N° W21-802437
Déclaration de maladie	
Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.	
Coupon à conserver par l'adhérent(e).	
Matricule : 00372	
Nom de l'adhérent(e) : Bassette	
Total des frais engagés : 757,60	
Date de dépôt : 31/10/2023	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
3/11/2023	Ca		250000	INP : Dr 071169759 SARA DILAI Spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins N°1 à l'Institut de Cardiologie et de Maladies Vasculaires

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie KAMILIA <u>Dr. Beuchra BAGHDAD</u> <u>457D, Lot, Bouanania - Assif (O)</u> <u>Marrakech</u> <u>Tél : 05 24 30 0 22</u>	31/10/23	502,60

072035393
ANAL

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

Dr. DILAI SARA
Spécialiste des maladies du Cœur
et des vaisseaux



حورة ديلائي، سارة
الخصائية في أمراض القلب
والشرايين

- Echocardiographie doppler
- Holter tensionnel
- Holter Rythmique
- Epreuve d'effort

- الفحص بالصدى الصوتي
- قياس دقات القلب والضغط الدموي على المدى الطويل
- إمتحان الجهد

Marrakech, le :

31/10/23

H^{me} Boussetta Halima.

111, 10 Bi - prétors 5/1,25
x3

58, 10 cardensiel 5 my
x3

507, 60

% up x 21 g

W

3 my

Dr. SARA DILAI
Spécialiste des maladies du cœur
et des vaisseaux
Appt. n° 1, Imm. 5 Angle Allal El Fassi
et Abdelkarim El Khattabi - Marrakech
Tél./Fax : 05 24 291 293

Pharmacie KAMILIA
Dr. Bouchra BAGHDAD
7S-7D, Lot Bouamria - Assif (C)
Marrakech
Tél : 05 24 30 63 22



6 118001 100873

Cardensiel® 5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 58,10 DH

7862160239



6 118001 100873

Cardensiel® 5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 58,10 DH

7862160239



6 118001 100873

Cardensiel® 5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 58,10 DH

7862160239

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

BIPRETERAX® Arginine 5 mg / 1,25 mg

Comprimé pelliculé

Périndopril arginine/Indapamide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement identiques aux vôtres.

• Si vous
ment

ne donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont

en votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas
irables éventuels ?».

11,10

QUE CON

1. Qu'est
cas est-il

2. Quelle

5 mg/1,25

3. Commerci

4. Quels sont le

5. Comment conse

6. Contenu de l'embo

1. QU'EST-CE QUE BIPRETERAX ? QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg

principes actifs, le périndopril et l'indapamide.

est indiqué dans le traitement de

Le périndopril appartient à la classe

l'angiotensine II (ACE). Il agit en dilatant

les artères et les veines, facilitant ainsi le travail

du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

L'indapamide est un diurétique.

Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins.

Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère

augmentation de la quantité d'urine produite.

Ces deux principes actifs réduisent la

pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :

• si vous êtes allergique au périndopril ou à d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. «Contenu de l'emballage et autres informations.»).

• si vous avez déjà eu des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelles qu'en soient les circonstances (état appelé angioédème).

• si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un

médicament contenant de l'alsikiren pour diminuer votre pression artérielle.

pelliculé et dans quel

BIPRETERAX Arginine

comprimé pelliculé ?

comprimé pelliculé ?

COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS

diurétiques, code ATC : C09BA04

pelliculé est une association de deux

médicament est un anti-hypertenseur et

à l'adulte.

peurs de l'enzyme de conversion de

les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail

du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

L'indapamide est un diurétique.

Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins.

Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère

augmentation de la quantité d'urine produite.

Ces deux principes actifs réduisent la

pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

• médicaments pour traiter le diabète tels qu'insuline, metformine ou gliptines,

• calcium y compris les suppléments calciques,

• laxatifs stimulants (ex: senné),

(ex: l'acide acétylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, ainsi que pour empêcher la formation de caillot sanguin)),

• amphotéricine B par injection (pour traiter une infection fongique sévère),

• médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie dont les antidépresseurs tricycliques et les neuroleptiques (comme l'amisulpride, le sulpiride, le sultopride, le tiapride, l'halopéridol, le dropéridol),

• tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn),

• triméthoprime (pour le traitement d'infections),

• vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins),

• médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex: épédrine, nadrénaline ou adrénaline).

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons

Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant un repas.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

BIPRETERAX® Arginine 5 mg / 1,25 mg

Comprimé pelliculé

Périndopril arginine/Indapamide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement identiques aux vôtres.

• Si vous
ment

ne donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont

en votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas
irables éventuels ?».

11,10

QUE CON

1. Qu'est cas est-il
2. Quelle 5 mg/1,25
3. Commerç
4. Quels sont le
5. Comment conse
6. Contenu de l'embo
1. QU'EST-CE QUE BIPRETERAX ?
- QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

BIPRETERAX. Arginine 5 mg/1,25 mg. Les deux principes actifs, le périndopril et l'indapamide, sont indiqués dans le traitement de l'hypertension artérielle.

Le périndopril appartient à la classe des antagonistes de l'angiotensine II (ACE). Il agit en dilatant les artères et les veines, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. «Contenu de l'emballage et autres informations.»).
- si vous avez déjà eu des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelles qu'en soient les circonstances (état appelé angioédème).
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'alsikiren pour diminuer votre pression artérielle.

comprimé et dans quel

BIPRETERAX Arginine

comprimé pelliculé ?

comprimé pelliculé ?

COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS

diurétiques, code ATC : C09BA04

Le comprimé est une association de deux médicaments : le périndopril et l'indapamide. Le périndopril est un anti-hypertenseur et l'indapamide est un diurétique.

Les diurétiques, code ATC : C09BA04, sont utilisés pour empêcher le corps de retenir trop de liquide dans les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. «Contenu de l'emballage et autres informations.»).
- si vous avez déjà eu des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelles qu'en soient les circonstances (état appelé angioédème).
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'alsikiren pour diminuer votre pression artérielle.

- médicaments pour traiter le diabète tels qu'insuline, metformine ou gliptines,
- calcium y compris les suppléments calciques,
- laxatifs stimulants (ex: senné),
- anti-inflammatoires non stéroïdiens (ex: ibuprofène) ou dose élevée de salicylates (ex.: l'acide acétylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, ainsi que pour empêcher la formation de caillot sanguin)),
- amphotéricine B par injection (pour traiter une infection fongique sévère),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie dont les antidépresseurs tricycliques et les neuroleptiques (comme l'amisulpride, le sulpiride, le sultopride, le tiapride, l'halopéridol, le dropéridol),
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn),
- triméthoprime (pour le traitement d'infections),
- vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins),

- médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex: éphédrine, nadrénaline ou adrénaline).
- BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons**
- Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant un repas.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé. BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

BIPRETERAX® Arginine 5 mg / 1,25 mg

Comprimé pelliculé

Périndopril arginine/Indapamide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement identiques aux vôtres.

• Si vous
ment

ne donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont

en votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas
irables éventuels ?».

11,10

QUE CON

1. Qu'est cas est-il
2. Quelle 5 mg/1,25
3. Commerç
4. Quels sont le
5. Comment conse
6. Contenu de l'embo
1. QU'EST-CE QUE BIPRETERAX ?
- QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

BIPRETERAX. Arginine 5 mg/1,25 mg. Les deux principes actifs, le périndopril et l'indapamide, sont indiqués dans le traitement de l'hypertension artérielle.

Le périndopril appartient à la classe des antagonistes de l'angiotensine II (ACE). Il agit en dilatant les artères et les veines, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. «Contenu de l'emballage et autres informations.»).
- si vous avez déjà eu des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelles qu'en soient les circonstances (état appelé angioédème).
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

comprimé et dans quel

BIPRETERAX Arginine

comprimé pelliculé ?

comprimé pelliculé ?

COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS

diurétiques, code ATC : C09BA04

Le comprimé est une association de deux médicaments : le périndopril et l'indapamide. Le périndopril est un anti-hypertenseur et l'indapamide est un diurétique.

Les diurétiques, code ATC : C09BA04, sont utilisés pour empêcher le corps de retenir trop de liquide dans les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. «Contenu de l'emballage et autres informations.»).
- si vous avez déjà eu des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelles qu'en soient les circonstances (état appelé angioédème).
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

- médicaments pour traiter le diabète tels qu'insuline, metformine ou gliptines,
- calcium y compris les suppléments calciques,
- laxatifs stimulants (ex: senné),
- anti-inflammatoires non stéroïdiens (ex: ibuprofène) ou dose élevée de salicylates (ex.: l'acide acétylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, ainsi que pour empêcher la formation de caillot sanguin)),
- amphotéricine B par injection (pour traiter une infection fongique sévère),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie dont les antidépresseurs tricycliques et les neuroleptiques (comme l'amisulpride, le sulpiride, le sultopride, le tiapride, l'halopéridol, le dropéridol),
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn),
- triméthoprime (pour le traitement d'infections),
- vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins),

- médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex: éphédrine, nadrénaline ou adrénaline).
- BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons**
- Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant un repas.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé. BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.