

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

184735

Déclaration de Maladie

M23- 0028706

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0247 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : MALLOULI EL MOSTAF

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0613973734 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. BABOU Balkis
Spécialiste des Maladies
Cardio-Vasculaires Adultes et Enfants
600, Av. Driss Harti 1^{er} étage Db. Lahjar
Cité Dimaar, Préfecture d'Arrondissement Ben M'sick
Tél. 05 22 56 76 56 - Urgence 06 66 54 77 15



Cachet du médecin :

Date de consultation : 23/11/2023

Nom et prénom du malade : ESSOURI Rymia Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : DL Thrombose

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____ Le : _____ / _____ / _____

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/11/2023	Dr. BALKIS - Cardiologie	Dr. BALKIS - Cardiologie	3466805	3466805
04/12/2023	Dr. BALKIS - Cardiologie	Dr. BALKIS - Cardiologie	3466805	3466805

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Tachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	27/11/2013	B4000	545 Dh

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ————— G 00000000 00000000 35533411 11433553		COEFFICIENT DES TRAVAUX
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Balkis BABOU

Spécialiste des maladies

Cardio-Vasculaires

- Echodoppler cardiaque couleur
- Holter tensionnel - Holter Rythmique
- Epreuve d'effort
- Spécialiste de la cardiologie pédiatrique
- Traitements et suivi de l'hypertension artérielle et des dyslipidémies
- Cardio - Oncologue



الدكتورة بلقيس بابو

أخصائية أمراض القلب والشرايين

- الفحص بالصدى بالألوان
- تخطيط القلب عند المجهود
- علاج أمراض القلب عند الأطفال والرضع
- علاج و تتبع أمراض الضغط الدموي و أمراض الكوليستيرونول
- تسجيل الضغط الدموي ودقائق القلب على المدى الطويل
- علاج أمراض القلب عند مرضى السرطان

Casablanca

23/11/2023

الدار البيضاء في:

Essouiri Dnia

16450

1) -

Dogmatil

S.V.

1 qj le

(329,00x5)

Matin

(199,00x2)

28800

2) -

D-Stress

S.V.

1 qj le

Auj -

42250

دوائية بنموسى
PHARMACIE BENMOUSSA
26, AV. Cdt. Driss El Harti
Jamilia 3 - Cité Diemaa
1000 Casablanca 373867 - CASABLANCA

3 més

Dr. BABOU Balkis

Spécialiste des Maladies
Cardio-Vasculaires Adultes et Enfants
100, Av. Driss Mami 1^{er} Etage da Lahjar
Prefecture d'Arrondissement de Casablanca
06 66 54 71 15

S.P.

LABORATOIRE synergia®

42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE

Tél. 00 33 (0)4 77 49 30 10

Distribué au Mar

9, Rue Randal Me

www.hyphadiet.fr



FR

Respecter
toute pas à
toute de vie
tantes aux
allergiques



À consommer avant fin/ Numéro de lot : voir étui.

P.P.C : 129 DH

Lot :

DSS04/23

04/26

Autorisation du ministère de la santé :
N°2021110714/V1/CA/DPS/DMP/18

3 760139 290518



Dogmatil® 50 mg

Sulpiride

Gélule

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE DOGMATIL 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANTISSYCHOTIQUE

NEUROLEPTIQUE BENZAMIDE- code ATC : N05AL01

DOGMATIL appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotique neuroleptiques. Il appartient à la famille des benzamides.

Ce médicament est utilisé :

- Chez l'adulte : pour traiter certaines formes d'anxiété.
- Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : pour traiter certains troubles graves du comportement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOGMATIL 50 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DOGMATIL 50 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique au sulpiride ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés da la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).
- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un

cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire,

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec DOGMATIL n'est pas contre-indiquée (Voir la rubrique « Autres médicaments et DOGMATIL 50 mg, gélule »), Si vous avez une maladie du sang (la porphyrine aigüe) caractérisée par une accumulation de pigments dans l'organisme,

- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers la gélule et s'étouffer avec.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOGMATIL 50 mg, gélule.

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque (voir rubrique « 4. Quels sont les effets indésirables éventuels »).

- Utilisez ce médicament avec précautions dans les cas suivants :
 - Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes d'insuffisance rénale ou d'hypertension artérielle (pression artérielle élevée).

- Si vous souffrez d'hypertension artérielle en raison du risque de crise d'hypertension, parlez-en à votre médecin. Un suivi est nécessaire.

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau).

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formations de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins.

- Si vous êtes atteints ou avez été atteint de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil), d'iléus (arrêt du transit intestinal), de sténose digestive congénitale (rétrécissement du tube digestif présent à la naissance), de rétention urinaire (incapacité à vider la vessie) ou d'hyperplasie de la prostate).

Si vous avez des antécédents de prolactine dans le

DOGMATIL 50 MG
GELULE B20

P.P.V : 32DH90



6 118000 061199

- Prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale), dans

PER. 10/2026
101 : 23E003

4000

étroitement pendant le



Dogmatil® 50 mg

Sulpiride

Gélule

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE DOGMATIL 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANTISSYCHOTIQUE
NEUROLEPTIQUE BENZAMIDE- code ATC : N05AL01

DOGMATIL appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotique neuroleptiques. Il appartient à la famille des benzamides.

Ce médicament est utilisé :

- Chez l'adulte : pour traiter certaines formes d'anxiété.
- Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : pour traiter certains troubles graves du comportement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOGMATIL 50 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DOGMATIL 50 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique au sulpiride ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés da la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).
- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un

cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire,

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec DOGMATIL n'est pas contre-indiquée (Voir la rubrique « Autres médicaments et DOGMATIL 50 mg, gélule »), Si vous avez une maladie du sang (la porphyrine aigüe) caractérisée par une accumulation de pigments dans l'organisme,

- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers la gélule et s'étouffer avec.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOGMATIL 50 mg, gélule.

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque (voir rubrique « 4. Quels sont les effets indésirables éventuels »).

- Utilisez ce médicament avec précautions dans les cas suivants : - Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes d'insuffisance rénale ou d'hypertension artérielle (pression artérielle élevée).

- Si vous souffrez d'hypertension artérielle en raison du risque de crise d'hypertension, parlez-en à votre médecin. Un suivi est nécessaire.

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau).

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formations de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins.

- Si vous êtes atteints ou avez été atteint de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil), d'iléus (arrêt du transit intestinal), de sténose digestive congénitale (rétrécissement du tube digestif présent à la naissance), de rétention urinaire (incapacité à vider la vessie) ou d'hyperplasie de la prostate).

DOGMATIL 50 MG

GELULE B20

P.P.V : 32DH90



6 118000 061199

- Prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale), dans

PER. 10/2026
101 : 23E003

4000

étroitement pendant le



Dogmatil® 50 mg

Sulpiride

Gélule

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE DOGMATIL 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANTISSYCHOTIQUE
NEUROLEPTIQUE BENZAMIDE- code ATC : N05AL01

DOGMATIL appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotique neuroleptiques. Il appartient à la famille des benzamides.

Ce médicament est utilisé :

- Chez l'adulte : pour traiter certaines formes d'anxiété.
- Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : pour traiter certains troubles graves du comportement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOGMATIL 50 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DOGMATIL 50 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique au sulpiride ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés da la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).
- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un

cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire,

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec DOGMATIL n'est pas contre-indiquée (Voir la rubrique « Autres médicaments et DOGMATIL 50 mg, gélule »), Si vous avez une maladie du sang (la porphyrine aigüe) caractérisée par une accumulation de pigments dans l'organisme,

- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers la gélule et s'étouffer avec.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOGMATIL 50 mg, gélule.

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque (voir rubrique « 4. Quels sont les effets indésirables éventuels »).

- Utilisez ce médicament avec précautions dans les cas suivants : - Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes d'insuffisance rénale ou d'hypertension artérielle (pression artérielle élevée).

- Si vous souffrez d'hypertension artérielle en raison du risque de crise d'hypertension, parlez-en à votre médecin. Un suivi est nécessaire.

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau).

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formations de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins.

- Si vous êtes atteints ou avez été atteint de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil), d'iléus (arrêt du transit intestinal), de sténose digestive congénitale (rétrécissement du tube digestif présent à la naissance), de rétention urinaire (incapacité à vider la vessie) ou d'hyperplasie de la prostate).

DOGMATIL 50 MG

GELULE B20

P.P.V : 32DH90



6 118000 061199

- Prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale), dans

PER. 10/2026
101 : 23E003

4000

étroitement pendant le



Dogmatil® 50 mg

Sulpiride

Gélule

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE DOGMATIL 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANTISSYCHOTIQUE

NEUROLEPTIQUE BENZAMIDE- code ATC : N05AL01

DOGMATIL appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotique neuroleptiques. Il appartient à la famille des benzamides.

Ce médicament est utilisé :

- Chez l'adulte : pour traiter certaines formes d'anxiété.
- Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : pour traiter certains troubles graves du comportement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOGMATIL 50 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DOGMATIL 50 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique au sulpiride ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés da la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).
- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un

cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire,

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec DOGMATIL n'est pas contre-indiquée (Voir la rubrique « Autres médicaments et DOGMATIL 50 mg, gélule »), Si vous avez une maladie du sang (la porphyrine aigüe) caractérisée par une accumulation de pigments dans l'organisme,

- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers la gélule et s'étouffer avec.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOGMATIL 50 mg, gélule.

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque (voir rubrique « 4. Quels sont les effets indésirables éventuels »).

- Utilisez ce médicament avec précautions dans les cas suivants :
 - Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes d'insuffisance rénale ou d'hypertension artérielle (pression artérielle élevée).

- Si vous souffrez d'hypertension artérielle en raison du risque de crise d'hypertension, parlez-en à votre médecin. Un suivi est nécessaire.

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau).

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formations de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins.

- Si vous êtes atteints ou avez été atteint de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil), d'iléus (arrêt du transit intestinal), de sténose digestive congénitale (rétrécissement du tube digestif présent à la naissance), de rétention urinaire (incapacité à vider la vessie) ou d'hyperplasie de la prostate).

Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formations de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins.

**DOGMATIL 50 MG
GELULE B20**

P.P.V : 32DH90



6 118000 061199

- Prenez votre médicament :

- Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale), dans

PER. 10/2026
101 : 23E003

4000

étroitement pendant le



Dogmatil® 50 mg

Sulpiride

Gélule

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE DOGMATIL 50 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANTISSYCHOTIQUE
NEUROLEPTIQUE BENZAMIDE- code ATC : N05AL01

DOGMATIL appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotique neuroleptiques. Il appartient à la famille des benzamides.

Ce médicament est utilisé :

- Chez l'adulte : pour traiter certaines formes d'anxiété.
- Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans : pour traiter certains troubles graves du comportement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DOGMATIL 50 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DOGMATIL 50 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique au sulpiride ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).
- Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un

cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire,

- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec DOGMATIL n'est pas contre-indiquée (Voir la rubrique « Autres médicaments et DOGMATIL 50 mg, gélule »), Si vous avez une maladie du sang (la porphyrine aigüe) caractérisée par une accumulation de pigments dans l'organisme,

- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers la gélule et s'étouffer avec.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DOGMATIL 50 mg, gélule.

- Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque (voir rubrique « 4. Quels sont les effets indésirables éventuels »).

- Utilisez ce médicament avec précautions dans les cas suivants : - Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes d'insuffisance rénale ou d'hypertension artérielle (pression artérielle élevée).

- Si vous souffrez d'hypertension artérielle en raison du risque de crise d'hypertension, parlez-en à votre médecin. Un suivi est nécessaire.

- Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau).

- Si vous ou quelqu'un de votre famille avez des antécédents de formations de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins.

- Si vous êtes atteints ou avez été atteint de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil), d'iléus (arrêt du transit intestinal), de sténose digestive congénitale (rétrécissement du tube digestif présent à la naissance), de rétention urinaire (incapacité à vider la vessie) ou d'hyperplasie de la prostate).

- Si vous avez des antécédents de prolactinose (augmentation de la prolactine dans le

DOGMATIL 50 MG
GELULE B20

P.P.V : 32DH90



6 118000 061199

- Prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale), dans

PER. 10/2026
101 : 23E003

4000

étroitement pendant le

Docteur Balkis BABOU

Spécialiste des maladies

Cardio-Vasculaires

• Echodoppler cardiaque-couleur

• Holter tensionnel - Holter Rythmique

- Epreuve d'effort

• Spécialiste de la cardiologie pédiatrique

• Traitement et suivi de l'hypertension artérielle

et des dyslipidémies

• Cardio - Oncologue



الدكتورة بلقيس بابو

أخصائية أمراض القلب والشرايين

• الفحص بالصدى بالألوان

• تخطيط القلب عند المجهود

• علاج أمراض القلب عند الأطفال والرضع

• علاج و تتبع أمراض الضغط الدموي

وأمراض الكوليستيرونول

• تسجيل الضغط الدموي ودقائق القلب على

الدكتور بلقيس بابو

• علاج أمراض القلب عند مرضى السرطان

Casablanca : 04/10/2023 الدار البيضاء في:

Essouiri Jmia

1) - Nevimex plus
84.50 1 gel le soir -

2) - Sulpiride
14/10/2023 1 Matz

صيدلية بنموسى
PHARMACIE BENMOUSSA
26, AV. DRISSE EL HARTI
Jamila 3 - Cité Djémâa
Tél : 0522 37 38 67 - CASABLANCA

140.90

Dr. BABOU Balkis
Spécialiste des Maladies
Cardio-Vasculaires Adultes et Enfants
600, Av. Driss El Harti, 1^{er} étage, 1000 Casablanca
Téléphone : 05 22 56 76 56
Téléphone : 06 93 20 33 84 • Urgence : 06 66 54 77 15 • Email : baboubalkis@yahoo.fr

600, Avenue Driss El Harti, Db.Lahjar, 1^{er} étage, Ben Msik - Casablanca - Tél. : 05 22 56 76 56

Urgence : 06 93 20 33 84 • Urgence : 06 66 54 77 15 • Email : baboubalkis@yahoo.fr

SULPIDAL® 50 mg gélules

Sulpiride

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) DENOMINATION
SULPIDAL® 50 mg - gélule

Sulpiride

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Excipients q.s.p. 1 gélule., 50 mg

c) FORME PHARMACEUTIQUE

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE
BENZAMIDE

Boîte de 20 gélules.
(N : Système Nerveux)

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certains troubles du comportement de l'adulte et de l'enfant de plus de 6 ans.

3. ATTENTION !

al DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS les cas suivants :

- allergie au sulpiride ou à l'un des constituents de la gélule,

- en association avec les antiparkinsoniens dopaminergiques.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL

PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE

En cas d'apparition immédiatement

Afin de dépister un électrocardiogramme

Chez l'enfant, un La prise de comprimés et s'étoufent

En raison de la syndrome de la

cl) PRECAUTIO

Afin que votre il est nécessaire

- maladie car maladie de

- insuffisanc - antécédent

La prise de

6 118000 180609

SULPIDAL® 50 mg



0

28,20

PPV
LOT
PER

ter
raler de
mme, de
ts rares).

un

352106-02

SULPIDAL® 50 mg gélules

Sulpiride

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) DENOMINATION
SULPIDAL® 50 mg - gélule

Sulpiride

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Excipients q.s.p. 1 gélule., 50 mg

c) FORME PHARMACEUTIQUE

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE
BENZAMIDE

Boîte de 20 gélules.
(N : Système Nerveux)

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certains troubles du comportement de l'adulte et de l'enfant de plus de 6 ans.

3. ATTENTION !

al DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS les cas suivants :

- allergie au sulpiride ou à l'un des constituents de la gélule,

- en association avec les antiparkinsoniens dopaminergiques.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL

PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE

En cas d'apparition immédiatement

Afin de dépister un électrocardiogramme

Chez l'enfant, un La prise de comprimés et s'étoufent

En raison de la syndrome de la

cl) PRECAUTIO

Afin que votre il est nécessaire

- maladie car maladie de

- insuffisanc - antécédent

La prise de

6 118000 180609

SULPIDAL® 50 mg



0

28,20

PPV
LOT
PER

ter
raler de
mme, de
ts rares).

un

352106-02



Gélules
Voie orale

NEOVIMAG® PLUS

FORME ET PRÉSENTATION :

Gélules, boîte de 30.

COMPOSITION (par 2 gélules) :

Magnésium marin (300 mg), extrait de Mélisse, Vitamine B6 (2mg), stéarate de magnésium, amidon de maïs, gélatine d'origine végétale (hypromellose).

PROPRIÉTÉS :

NEOVIMAG® PLUS est à base de 3 actifs synergiques : le Magnésium marin, la Vitamine B6 qui contribuent à réduire la fatigue nerveuse et la tension musculaire ainsi que la Mélisse aux propriétés apaisantes et anti-stress.

NEOVIMAG® PLUS permet de lutter efficacement contre le stress et l'anxiété.

CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule 2 fois par jour, ou suivre les recommandations d'un professionnel de la santé.

PRÉCAUTIONS :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas laisser les enfants accéder au produit.
- A conserver hors de portée des enfants.

Lot :

À consommer de préférence avant le :

Complément alimentaire

PPC : 84,50 DH

Fabriqué par

Distribué au

Autorisation du



SCA/MAv3

Docteur Balkis BABOU

Spécialiste des maladies

Cardio-Vasculaires

- Echodoppler cardiaque-couleur
- Holter tensionnel - Holter Rythmique
 - Epreuve d'effort
- Spécialiste de la cardiologie pédiatrique
- Traitement et suivi de l'hypertension artérielle et des dyslipidémies
- Cardio - Oncologue



الدكتورة بلقيس بابو

أخصائية أمراض القلب و الشريانين

- الفحص بالصدى بالألوان
- تخطيط القلب عند المجهود
- علاج أمراض القلب عند الأطفال والرضع
- علاج و تتبع أمراض الضغط الدموي و أمراض الكوليستيرول
- تسجيل الضغط الدموي و دقates القلب على المدى الطويل
- علاج أمراض القلب عند مرضى السرطان

Casablanca : الدار البيضاء في:

23/11/2013

Essoui Ri Jmia

- Gaj HSAIC
urée Ado



Ac uggue TG


Ct AST

AUT

Dr BABOU Balkis
Spécialiste des Maladies
Cardio-Vasculaires Adultes et Enfants
500 Av Driss El Harti 1^{er} Etage Ob. Lahjar
Cité Djemai, Préfecture d'Arrondissement Ben Msik
Tel.: 05 22 56 76 56 Urgence: 06 66 54 77 15

Laboratoire Anoual

Laboratoire de Biologie Médicale
Biologie Moléculaire
Biologie Spécialisée
Radio immuno-analyse
Diagnostic Prénatal



Mme Jmia ESSOUIRI

Né(e) le : 01-01-1938

Dossier N° : 2311270025

Date de l'examen : 27-11-2023

Prélevé le : 27-11-2023 09:15 en interne

Édité le : 28-11-2023

جَنْبَرُ الْأَنْوَاعِ

Docteur Jamal FEKKAK

Radio-biologiste

Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris

Diplômé de l'Université Paris VII

et de l'Institut Pasteur de Paris

Biologiste Qualiticien

DR : Dr Balkis BABOU

Adresse :

Page 1 / 1



ACCREDITATION
N° 8 3245
Porté disponible sur
www.coefrac.fr

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole [AC].

BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie à jeun [AC]

(Enzymatique HK/G6PDH - Cobas 6000® Roche)

1.28 g/l (0.74–1.09)

7.10 mmol/l (4.11–6.05)

Urée [AC]

(Cinétique Urease/GLDH - Cobas 6000® - Roche)

0.23 g/l (0.17–0.49)

3.83 mmol/l (2.76–8.08)

Créatinine [AC]

(Jaffé, Colorimétrique Cinétique - Cobas 6000® Roche)

7.4 mg/l (5.0–9.0)

65.5 µmol/l (44.3–79.7)

Acide Urique [AC]

(Colorimétrique enzymatique Uricase/PAP - Cobas 6000® Roche)

49 mg/l (24–57)

291.6 µmol/l (142.8–339.2)

Cholestérol total [AC]

(Colorimétrique Enzymatique - Cobas 6000® Roche)

2.26 g/l (<2.00)

5.85 mmol/l (<5.17)

Triglycérides [AC]

(GPO/PAP - Cobas 6000® Roche)

0.82 g/l (<1.50)

0.93 mmol/l (<1.70)

HbA1c

(Automate HLC-723G8 /HPLC)

6.3 % (4.0–6.0)

Changement d'automate à partir du 05/08/2023

ENZYMOLOGIE

Transaminases GOT (ASAT) [AC]

(IFCC, sans PYP - Cobas 6000® Roche)

12 UI/L (<32)

Transaminases GPT (ALAT) [AC]


(IFCC, sans PYP Cobas 6000® Roche)

6 UI/L (<33)



Laboratoire Anoual

Laboratoire de Biologie Médicale
 Biologie Moléculaire
 Biologie Spécialisée
 Radio immuno-analyse
 Diagnostic Prénatal



لَا نُوَالْ

Docteur Jamal FEKKAK

Radio-biologiste

Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris
 Diplômé de l'Université Paris VII
 et de l'Institut Pasteur de Paris
 Biologiste Qualiticien

FACTURE N° 2311270025

Mme Jmia ESSOUIRI

Demande N° 2311270025
 Date de l'examen : 27-11-2023
 Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PSAD	Prélèvement sang adulte	E25	E
	ALAT (transaminase TGP)	B50	B
	ASAT (transaminase TGO)	B50	B
	Cholestérol	B30	B
	Créatinine	B30	B
	HbA1c	B100	B
	Triglycérides	B50	B
	Urée	B30	B
	Glycémie à jeun	B30	B
	Acide Urique	B30	B

Total des B : 400

TOTAL DOSSIER : 545 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : cinq cent quarante-cinq dirhams DH

