

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W21-827515

### Maladie

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2761

### Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Société : (Signature)

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0627770362

### Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

### Autres

### Cadre réservé au Médecin

Dr. OUDRHIRI NAIMA  
Expert Assermenté  
Derm Inéri, Rue 29 N°3  
Casablanca Tél : 0522 62 02 35

Cachet du médecin :

Date de consultation : 23/11/2023

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 20 Nov. 2023 Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

### VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie

N° W21-827515

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

Authorisation CHD N° A-A-215/219

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/11/2011	0	1	15000	INP 091116028 Dr. OUDRHARI NAIMA Expert en Radiologie Dermatologie Casablanca Tel: 0523 29 N° 3

## **EXÉCUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien  
Doudia Bounissa  
Pharmacie Mosquée Riad  
Dr. Elshain ATTIR  
-2 Mosquée Riad Hay Riad Berrechid  
Fix : 0522336822

## AUXILIAIRES MEDICAUX

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODP.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	G
412	21433552
000	00000000
000	00000000
411	11433553
	T

### Création, remont, adjonction)

#### Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

INP : | | | | | | | | | |

## COEFFICIENT DES TRAVAUX

## MONTANTS DES SOINS

## DEBUT D'EXECUTION

FIN  
D'EXECUTION

## Coefficient des travaux

## MONTANTS DES SOINS

DATE DU  
DEVIS

DATE DE  
L'EXECUTION

Docteur Naïma OUDRHIRI  
MEDECINE GENERALE

Médecin Assermenté  
Expert près les Tribunaux

الدكتورة نعيمة وعيري

الطب العام

طبيبة محلفة  
خبيرة لدى المحاكم

Casablanca. le 23 11 2023 الدار البيضاء في

5500

M. TANANI Bouchra

1 Acl av. le

75

5530

دعاية 27

75

81 Rue 27

1000

دواء

3 Caffin

75

2800

361 دواد

41 Super for

5280

دواء

75

1.330,70

دواء

Dr. OUDRHIRI NAIMA  
Expert Assermenté  
Casablanca Tel: 0522.62.02.35  
Rue 29 N°3 Inani - Hay Mohammadi

الدعاية

صيدلية مسجية رياض  
Pharmacie Mosquée Riad

Dr : Siham TAMIR

Fl. 1 - 2 Mosquée Riad Hay Riad Berrechid  
Fl. 0 - 2 336522

# OEDES® 20 mg

## Microgranules gastrorésistants en gélule (Oméprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de ce médicament.

Elle contient  
votre maladie  
Si vous avez  
plus d'informations

1. Identification  
Forme pha  
OEDES® 2  
de 7, 14, 21

### 2. Composition du médicament

#### Principes actifs:

Oméprazole

EXCIPIENTS : q.s.p une gélule.

Excipient à effet notoire : Saccharose.

#### 3. Classe pharmaco-thérapeutique :

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

#### 4. Indications thérapeutiques

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :

##### Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

- un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

##### Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel  $\geq 10 \text{ kg}$  :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

##### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

### 5. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

### Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous:

#### Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitation acide.

Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

La recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est

la dose recommandée quotidienne usuelle est de

une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

Si votre œsophage a été endommagé, la dose recommandée quotidienne

est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines.

# SUPERFORM-GS®

Vitamines, minéraux et Oligo-éléments

Sans Sucre



LOT : L2200505  
EXP : 09.2024  
PPC  
79.00 Dhs

te notice avant d'utiliser ce  
riez avoir besoin de la relire.  
n, demander à votre médecin,

ans quel cas est-il utilisé ?  
s à connaître avant d'utiliser  
?

5. Comment conserver SUPERFORM ?

6. Présentation.

7. Composition et informations nutritionnelles.

## 1- Qu'est-ce que SUPERFORM et dans quel cas est-il utilisé ?

SUPERFORM contient des vitamines, minéraux et oligo-éléments essentiels en quantités équilibrées les unes par rapport aux autres. Les vitamines, sels minéraux et oligo-éléments sont des substances vitales non fabriquées par notre organisme et qui sont apportées principalement par l'alimentation.

Ces substances ne sont cependant pas toujours présentes en quantités suffisantes dans l'alimentation quotidienne.

SUPERFORM complète l'alimentation en apportant des quantités adéquates en vitamines sels minéraux et oligo-éléments et peut être utilisé en cas de fatigue et asthénie passagères ou chroniques ; convalescence à la suite d'une maladie ou d'une opération chirurgicale ; cures d'amaigrissement de longue durée ou des régimes spéciaux ou bien en cas d'efforts physiques ou intellectuels intenses.

## 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SUPERFORM ?

### Précautions et contre-indications :

Parler à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser SUPERFORM si vous :

Souffrez d'insuffisance rénale.

Êtes en situation d'hypervitaminose.

Utilisez d'autres produits ou compléments alimentaires.

DANS TOUS LES CAS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

### Grossesse et allaitement :

SUPERFORM ne doit pas être utilisé pendant la grossesse lorsque l'alimentation contient des produits riches en vitamine A tels que le foie, les produits laitiers, les œufs, la margarine, l'huile de table. SUPERFORM peut être utilisé au cours de l'allaitement.

DANS TOUS LES CAS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

# BREXIN® comprimés effervescents

Piroxicam bêta-cyclodextrine

59,13

1 comprimé

## Composition :

Piroxicam

(sous forme de piroxicam bêta-cyclodextrine)

Excipients (dont lactose et aspartam) q.s.p.

## Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïden du groupe des oxicams.

## Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans au :

Traitement symptomatique au long cours :

- des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante (ou syndromes apparentés, tels que syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter et rhumatisme psoriasique),

- de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.

Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des :

- rhumatismes ab-articulaires tels que péri-arthrites scapulo-humérales, tendinites, bursites et affections aiguës post-traumatiques de l'appareil locomoteur,

- arthroses,

- radiculalgies.

## Contre-indications :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de piroxicam ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution, insuffisance hépatocellulaire sévère, insuffisance rénale sévère.

Enfants (moins de 15 ans).

Phénylcétonurie du fait de la présence de l'aspartam.

Femme enceinte (à partir du 6<sup>ème</sup> mois).

En association avec les anticoagulants oraux, autres AINS.

## Effets indésirables :

Les plus fréquents sont les suivants :

Effets gastro-intestinaux comme : anorexie, pesanteurs épigastriques, nausées, vomissements, constipation, douleurs abdominales, flatulences, diarrhées, ulcères.

Réactions d'hypersensibilité : dermatologiques, respiratoires et générales.

Effets sur le système nerveux central : céphalées, somnolence et vertiges.

Réactions cutanéo-muqueuses : éruption, prurit, rares cas de photosensibilisation, stomatites.

Enfant de moins de 15 ans : exceptionnelles infections graves de la peau en cas de varicelle rapportées.

## Précautions d'emploi :

Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite chronique et / ou à une polyposie nasale, ont un risque de manifestation allergique lors de la prise d'aspirine et / ou d'AINS plus élevé que le reste de la population. L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme.

En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'une manifestation cutanée ou muqueuse, interrompre immédiatement le traitement.

La survenue de crise d'asthme chez certains sujets peut être liée à une allergie à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué.

Ce médicament sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades ayant des antécédents digestifs.

En cas de varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.

La prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les 5 premiers mois de la grossesse, et elle est contre-indiquée à partir du 6<sup>ème</sup> mois.

Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaité.

L'attention doit être attirée chez les conducteurs et utilisateurs de machines sur la possibilité de vertiges et de somnolence.

En cas de surdosage, procéder à un transfert immédiat en milieu hospitalier.

Enfant de moins de 15 ans : lors de la varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.

## Mode d'emploi et posologie :

Réservez à l'adulte. Se conformer à la prescription médicale.

Les comprimés effervescents doivent être dissous dans un verre d'eau.

Les comprimés doivent être pris au cours d'un des 3 repas.

## Formes et autres présentations :

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 et 20 comprimés effervescents

BREXIN® 20 mg - Boîte de 20 comprimés sécables

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 suppositoires

BREXIN® 20 mg - Boîte de 10 sachets

## Liste I (Tableau A)

A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

# ACLAV®

Amoxicilline + Acide clavulanique

LOT : 505  
PER : 065  
P.P.V : 29 H

## COMPOSITION ET PRESENTATIONS :

PRODUIT : COMPOSITION :	Aclav 1g/125mg -Boîte de 12 sachets -Boîte de 14 sachets -Boîte de 16 sachets -Boîte de 24 sachets	Aclav 500mg/62,5mg -Boîte de 12 sachets -Boîte de 16 sachets -Boîte de 24 sachets	Aclav Enfant 100mg/12,5mg/1ml Flacon de 60 ml	Aclav Nourrisson 100mg/1,5ml/1ml Flacon de 3ml
Amoxicilline trihydratée : quantité correspondant à l'amoxicilline anhydre	1g	500 mg	6 g	3 g
Clavulanate de potassium : quantité correspondant à l'acide clavulanique	125 mg	62,5 mg	750 mg	75 mg
Excipients	q.s.p 1 sachet	q.s.p 1 sachet	q.s.p 10,30 g de poudre	q.s.p 5,15 g de poudre

## PROPRIETES :

Antibiotiques antibactériens de la famille des bétalactamines, du groupe des aminopénicillines.

Aclav est une formulation associant l'amoxicilline et l'acide clavulanique puissant inhibiteur de bétalactamases.

## INDICATIONS :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes reconnus sensibles, notamment dans :

Les otites moyennes aiguës, otites récidivantes.

Les sinusites maxillaires aiguës et autres formes de sinusites.

Les angines récidivantes, amygdalites chroniques.

Les surinfections de bronchites aiguës du patient à risque.

Les exacerbations de bronchopneumopathies chroniques.

Les pneumopathies aiguës du patient à risque.

Les cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme et pyélonéphrites aiguës non compliquées dues à des germes sensibles.

Les infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibiotique actif sur les chlamydiae.

Les parodontites.

Les infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites.

TraITEMENT de relais de la voie injectable.

Infections respiratoires basses chez le nourrisson et l'enfant de moins de 5 ans.

Infections urinaires chez le nourrisson.

## CONTRE INDICATIONS :

-Absolues :

- Allergie aux antibiotiques du groupe des bétalactamines (pénicillines, céphalosporines)
- Mononucléose infectieuse.
- Antécédent d'atteinte hépatique liée à l'association amoxicilline -acide clavulanique.
- Phénylcétonurie (en raison de la présence de l'aspartam)

-Relatives :

Le méthotrexate

## POSOLOGIE :

Les Posologies sont exprimées en Amoxicilline

Adulte normorénal (poids  $\geq 40$  kg)

2 à 3g/jour en 2 à 3 prises selon la prescription médicale et l'infection concernée.

Adulte insuffisant rénal (poids  $\geq 40$  kg)

Clairance de la créatinine	Schéma posologique
Supérieur à 30 ml / min	pas d'adaptation nécessaire
Entre 10 et 30 ml / min	1 g / 125 mg toute les 12 à 24h
Inférieur à 10 ml / min	Pour les patients traités ou non par hémodialyse les conditions d'utilisation n'ont pas été établies.

Chez les patients âgés : pas d'adaptation posologique sauf si la clairance de la créatinine est  $\leq 30$  ml / min (même posologie chez l'insuffisant rénal)

A19033Fr7

# EFFIPRED®

(Prednisolone)

## PRESENTATIONS

Boîte de 30 comprimés effervescents à 5 mg

Boîte de 20 comprimés effervescents à 20 mg

PPU 00DH01  
EXP 02/2026  
LOT 20011

## COMPOSITION

- Comprimés effervescents à 5 mg	
Prednisolone (sous forme de métasulfobenzoate de sodium)	5 mg
Excipient qsp	1 comprimé effervescent
- Comprimés effervescents à 20 mg	
Prednisolone (sous forme de métasulfobenzoate de sodium)	20 mg
Excipient qsp	1 comprimé effervescent

## PROPRIETES

EFFIPRED® est un glucocorticoïde à usage systémique, utilisé principalement pour ses propriétés antiinflammatoire, antiallergique et immunodépressive.

## INDICATIONS

Affections rhumatisantes, respiratoires, ORL, ophtalmologiques, neurologiques, néphrologiques, néoplasiques, infectieuses, hématologiques, endocrinianes, digestives, dermatologiques, et dans les connectivites et collagénoses.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

- Se conformer strictement à la prescription du médecin.
- Prendre les comprimés dissous dans un verre d'eau au cours des repas, de préférence en une prise le matin.

## CONTRE-INDICATIONS

- Tout état infectieux non traité par antibiotiques ou antimycosiques.
- Certaines viroses en évolution (herpès, varicelle, zona, hépatite)
- États psychotiques encore non contrôlés par un traitement.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISE EN GARDE

### *En cas de traitement prolongé :*

- Observer un régime pauvre en sucres et enrichi en protéines et en calcium
- Réduire l'apport en sodium en tenant compte de la teneur en sodium du comprimé (43 mg de sodium par comprimé à 20 mg et 28,6 mg de sodium par comprimé à 5 mg).
- Ne jamais arrêter brutalement le traitement mais diminuer progressivement les doses en suivant la prescription de votre médecin.