

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| O Réclamation | : contact@mupras.com |
| O Prise en charge | : pec@mupras.com |
| O Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-806117

A 85170

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : 1103		Société : RAM	
<input type="checkbox"/> Actif <input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)		<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : BENTALHA FATIMA Née HIRIZI Med			
Date de naissance :			
Adresse : B2 706 36 complexe Med II Maârif extension Casablanca			
Tél. : 06 76 09 73 00		Total des frais engagés :	
Dhs			

Autorisation CNDF N° 7-A-A-215/2019	Cadre réservé au Médecin		
	Dr A. ZAROURY Ophtalmologiste Ophthalm Clinique de Casablanca 13, Rue des Papillons Oasis - Casa Tél. : 0522 25 71 71 (SLG) - Fax : 0522 25 11 15 INDE : 091140871		
Cachet du médecin :	Date de consultation :	Age:	
	27/10/23	BENTALHA FATIMA	
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	cataracte au niveau de l'œil gauche		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : **Casa** Le : **13/11/2023**

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
.....	INP : <input type="text"/>
.....
.....
.....

EXECUTION DES ORDONNANCES

Date	Montant de la Facture
31/10/23 16/10/23	PHARMACIE NAPOLEON Rue d'Oradou - Gare N°1 Oasis - Casablanca Tel: 05 22 25 08 84 58,00 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	B D	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Dr. EL KASRI Mohamed Adil

Anesthésiste réanimateur

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nice

Sur Rendez-vous

Casablanca le :

15/10/23



BILAN PRE OPERATOIRE

M..... Bentalpha fatima

NFS-PQ-VS

UREE GLYCEMIE CREATININE

GOT- GPT- GAMMA GT-HB1AC

CHOLESTEROL-TRIGLYCERIDES -AC URIQUE

BILAN D HEMOSTASE : TP TCK

Prière de nous faxer les résultats

Merci

مختبر بوزباعا لتحليلات الطبية
LABORATOIRE BOUZOUBAA
d'Analyses Médicales et Scientifiques
11 Bd. Zekrouni Rabat. Taxis Casablanca
Tél: 0522 27 19 20 / 0522 28 57 43

DR. M. A. EL KASRI
Anesthésiste Réanimateur
Ophtalmologie Clinique de Casablanca
13, Rue des Papillons Oasis - Casablanca
Tél: 0522 27 19 20 / Fax: 0522 25 11 15

Urgence 24/24

Sarl au Capital de 1 200 000,00 MAD - 13, Rue des Papillons - Oasis - Casablanca

Tél. (LG) : 05.22.25.71.71 - Fax : 05.22.25.11.15 Web : www.oct.ma

RC : 416933 - I.F : 1051442 - T.P : 34788018 - C.N.S.S. : 6448395 - I.C.E. : 002077199000057



Casablanca le : 27.10.23

ORDONNANCE MEDICALE

CONCERNANT M^e BEN YOUSSEF

- 35,- ⚡ TOBRADEX (collyre)
1 goutte 4 fois par jour
- 50,- ⚡ INDOCOLLYRE(collyre)
1goutte 4 fois par jour
- 45,- ⚡ CILOXAN (collyre)
1goutte 4 fois par jour
- 54,- ⚡ TOBRADEX (POMMADE)
1 App . le soir
- 104,- ⚡ PHYLARM
- 50,- ⚡ SPECTRUM250MG
1 CP .2fois par jour
- 15,- ⚡ COMPRESSES OPHT SERILES AUTO-ADHESIF

PHARMACIE NAPOLEON
Rue d'Oradour Glane N° 2
Oasis - Casablanca
Tel: 05 22 25 08 84

LOT 221578
EXP 10/2025
PPV 51.40DH

Urgence 24/24

Traitement oeil

jean

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATION

6 118001 070596

Laboratoires Sothema Bouskoura

Tobradex® 0,30,1% collyre en suspension, 5 ml

AMM N°: 524/ 18 DMP/ 21/ NTO

Boîte de 1 flacon.

PPV : 35,70 DH

406836 MA



TOBRADEX

Collyre en suspension

Tobramycine/Dexaméthasone

0,3/0,1%

Flacon de 5 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **TOBRADEX, collyre en suspension** et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **TOBRADEX, collyre en suspension** ?
- 3- Comment utiliser **TOBRADEX, collyre en suspension** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **TOBRADEX, collyre en suspension** ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE TOBRADEX, COLLYRE EN SUSPENSION ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

La suspension ophthalmique TOBRADEX contient les principes actifs tobramycine (antibiotique) et dexaméthasone (glucocorticoïde à action anti-inflammatoire) et s'utilise pour le traitement de certaines inflammations de l'œil accompagnées d'une infection oculaire bactérienne.

La suspension ophthalmique TOBRADEX n'est délivrée que sur ordonnance et doit être utilisée uniquement sur prescription du médecin.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER TOBRADEX COLLYRE EN SUSPENSION ?

N'utilisez jamais la suspension ophthalmique **TOBRADEX** en présence :

- d'une hypersensibilité (allergie) connue ou supposée à l'une ou l'autre des substances du médicament ;
- d'un glaucome ;
- d'une infection oculaire qui ne peut pas être traitée avec un antibiotique (par ex. certaines infections virales de la cornée ou de la conjonctive) ;
- d'une tuberculose de l'œil ;
- d'un ulcère ou d'une lésion de la cornée (y compris après l'extraction d'un corps étranger sans complications) ;
- d'une mycosse oculaire ou d'

INDOCOLLYRE® 0,1%

Indométacine collyre en solution

فم الدفعه
LOT /
FAB/
تاريخ الإنتاج
EXP/
تاريخ الانتهاء
NM



PPV: 58.00 DHS



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

- La substance active est l'indométhacine, (5 mg pour 5 ml).
 - Les autres composants sont les thiomersal, l'hydroxypropylbétacyclodextrine, l'arginine, solution diluée d'acide chlorhydrique 1M, l'eau purifiée a.s.p. 5 ml.

Liste des excipients à effet notoire : Thiomersal (0,5mg)

Détenteur de la DE/ de l'AMM :
LABORATOIRE CHAUVIN
416, rue Samuel Morse – CS 9953
34961 Montpellier Cedex 2
France

Distribué au Maroc par:
Zenith pharma
96, Zone Industrielle.
Tassila Inezgane.
Agadir Maroc

Nom et adresse du fabricant et conditionneur:

LABORATOIRE CHAUVIN

Z.I. Ripotier Haut

07200 AUBENAS – France

AMM France n° 341 953 89

DE Algérie n° 17/98/17J066/096

AMM Tunisie n° 5283121

1. QU'EST CE QU'INDOCOLLYRE® 0,1 % collyre en solution ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme d'un collyre en flacon de 5 ml ; la substance active est un anti-inflammatoire non stéroïdien / analgique utilisé par voie oculaire. Il est préconisé au cours de certaines interventions chirurgicales de l'œil et de leurs suites opératoires :

- inhibition du myosis (rétrécissement du diamètre de la pupille),
 - prévention des manifestations inflammatoires liées à la chirurgie de la cataracte et du segment antérieur de l'œil,
 - traitement des manifestations douloureuses liées à la kératectomie photoréfractive (chirurgie correctrice de la myopie).

INDOCOLLYRE® 0,1 %, collyre en solution contient du Thiomersal.

3. COMMENT UTILISER INDOCOLLYRE® 0,1 % collyre en solution?

A titre indicatif, la posologie chez l'adulte est de :

- inhibition du myosis per-opératoire: 4 gouttes la veille de l'intervention, 4 gouttes dans les 3 heures qui précèdent l'intervention
 - prévention des manifestations inflammatoires liées aux interventions chirurgicales de la cataracte et du segment antérieur de l'œil: 1 goutte, 4 à 6 fois par jour jusqu'à complète disparition de la symptomatologie en débutant le traitement 24 heures avant l'intervention;
 - traitement des manifestations douloureuses oculaires liées à la kératectomie photoréfractive au cours des premiers jours post-opératoires : 1 goutte 4 fois par jour.

Voie ophtalmique INSTILLATION OCULAIRE

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation
 - Eviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières
 - Instiller une goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil à traiter en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
 - Après l'instillation, fermez l'œil quelques secondes.
 - Puis, appuyez avec un doigt sur le coin de votre œil situé du côté du nez pendant 2 minutes. Cela permettra de réduire le passage des substances actives dans le reste de votre organisme.
 - L'œil fermé, essayez proprement l'excédent.
 - Rebouchez le flacon après chaque utilisation.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, installez les autres collyres 15 minutes d'intervalle.



6 118001 070176

CILOXAN 0,3% Collyre, flacon de 5 ml

A.M.M. N° 151 DMP/21/NRQ

Laboratoires SotHEMA

PPV : 45,90 DHS

Remboursable AMO

406434

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

CILOXAN® 0,3 % Collyre**Ciprofloxacin**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **CILOXAN collyre** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **CILOXAN collyre** ?
3. Comment utiliser **CILOXAN collyre** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **CILOXAN collyre** ?
6. Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QUE CILOXAN collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Le collyre Ciloxan contient le principe actif ciprofloxacin (un antibiotique) qui agit contre de nombreuses bactéries qui peuvent provoquer des infections oculaires. Ciloxan collyre est destiné

au traitement des conjonctivites, des blépharites ainsi que des ulcères cornéens d'origine bactérienne et s'utilise uniquement sur ordonnance médicale

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER CILOXAN collyre**Contre-indications :****Ne pas utiliser CILOXAN 0,3 %,**

allergique à la

pharmacien si vous souffrez d'autres maladies, êtes allergique ou prenez déjà des médicaments

770572 MA



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TOBRADEX®

Pommade ophtalmique

Tobramycine/Dexaméthasone

0,3/0,1%

Tube de 3,5 g

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

TOBRADEX®
POMMADe OPHTALMIQUE
0,3/0,1%
Boîte de 1 tube de 3,5 g PPV: 54,40 DH
Laboratoires Sothema, Bouskoura
AMM N° 455/18 DMP/ 21/ NRQ



6 118001 070602

690206 MA

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, d'allergies ou si vous prenez d'autres médicaments (même en automédication!)/vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou oculaire.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

L'utilisation de la pommade ophtalmique TOBRADEX est déconseillée pendant la grossesse.

L'utilisation de la pommade ophtalmique TOBRADEX est déconseillée pendant l'allaitement. Vous devez donc soit cesser d'allaiter, soit arrêter le traitement.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

La vue pouvant être provisoirement troublée juste après l'application de la pommade ophtalmique, il est recommandé d'attendre que le symptôme disparaisse avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine.

3- COMMENT UTILISER TOBRADEX, POMMADE OPHTALMIQUE ?

Posologie/Mode d'emploi :

Adultes :

La posologie du médicament doit être déterminée par le médecin individuellement pour chaque patient. Respectez dans tous les cas la dose fixée par votre médecin. Ni la

PhyLa

Solution ophtalmique sté
d'irrigation oculaire sans a

HE MEDIC
PPC

14.00 DHS

NOTICE D'INFORMATION PRODUIT

IDENTIFICATION ET DÉNOMINATION

PHYLARM

Solution ophtalmique stérile pour l'irrigation de la surface oculaire.

COMPOSITION

Chlorure de sodium.....0,090 g.

Borate de sodium.....0,002 g.

Acide borique.....0,027 g.

Eau purifiée q.s.p.....10 ml.

FORME ET CONTENU EN VOLUME

Il s'agit d'une solution ophtalmique stérile pour l'irrigation directe de la surface oculaire et des paupières.

La voie d'administration est oculaire externe.

PHYLARM est présenté en récipient unidose de 10 ml et de 2 ml.

MODE D'ACTION

PHYLARM est une solution ophtalmique stérile, isotonique et sans conservateur destinée au traitement symptomatique des irritations de la surface oculaire.

Les caractéristiques physico-chimiques de PHYLARM sont très proches de celles de la phase aqueuse du film lacrymal ce qui permet une très bonne efficacité et sécurité d'emploi :

- Le pH 7,4 physiologique de PHYLARM favorise l'action du lysozyme des larmes.

**OPHTALMO CLINIQUE
DE CASABLANCA**



مختبر العيون
للهار البيضاء

Maladies et Chirurgie des yeux - Laser - Angiographie - Lentilles de Contact



PT221025124311

Casablanca le :
16 octobre 2023

BEN TALHA FATIMA

58, ٥٨

INDOCOLLYRE 0.1 COLLYRE

1 goutte 2 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 15 jours

PHARMACIE MERSULTA
18. Avenue Mers Sultta
Casablanca
Tél: 05 22 22 25 44 / 05 22 22 86 96

SV

Dr A. ZAROURY
Ophtalmologiste
Ophtalmo Clinique de Casablanca
13, Rue des Papillons Oasis - Casablanca
Tél : 0522 25 71 71 (S.L.) - Fax : 0522 25 11 15

Urgence 24/24

Sarl au Capital de 1 200 000,00 MAD - 13, Rue des Papillons - Oasis - Casablanca
Tél. (LG) : 05.22.25.71.71 - Fax : 05.22.25.11.15 - Web : www.occ.ma
RC : 416933 - I.F : 1051442 - T.P : 34788018 - C.N.S.S. : 6448395 - I.C.E. : 00207719900005

INDOCOLLYRE® 0,1%

Indométaçine
collyre en solution



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

INDOCOLLYRE 0,1%

Collyre 5ml

ZENITH PHARMA

AMM N°153/19/D/PI/21/FR/ODNM



6118001270088

LOT/معبار H8956

FAB/ص 10-2022

EXP/效 03-2024

PPV: 5r

SHO/SC

- La substance active est l'indométaçine, (5 mg pour 5 ml).
- Les autres composants sont le thiomersal, l'hydroxypropylbétacy clodextrine, l'arginine, solution diluée d'acide chlorhydrique 1M, l'eau purifiée q.s.p. 5 ml.

Liste des excipients à effet notoire : Thiomersal (0,5mg)
Flacon de 5 ml.

Détenteur de la DE/ de l'AMM :
LABORATOIRE CHAUVIN
416, rue Samuel Morse – CS 99535
34961 Montpellier Cedex 2
France

Distribué au Maroc par:
Zenith pharma
96, Zone Industrielle.
Tassila Inezgane.
Agadir Maroc

Nom et adresse du fabricant et conditionneur:

LABORATOIRE CHAUVIN
Z.I. Ripotier Haut
07200 AUBENAS – France
AMM France n° 341 953 8 9
DE Algérie n° 17/98/17J066/096
AMM Tunisie n° 5283121

1. QU'EST CE QU'INDOCOLLYRE® 0,1 % collyre en solution ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme d'un collyre en flacon de 5 ml ; la substance active est un anti-inflammatoire non stéroïdien / antalgique utilisé par voie oculaire. Il est préconisé au cours de certaines interventions chirurgicales de l'œil et de leurs suites opératoires :

- inhibition du myosis (rétrécissement du diamètre de la pupille),
- prévention des manifestations inflammatoires liées à la chirurgie de la cataracte et du segment antérieur de l'œil,
- traitement des manifestations douloureuses liées à la kératectomie photoréfractive (chirurgie correctrice de la myopie)

INDOCOLLYRE® 0,1 %, collyre en solution contient du Thiomersal.

3. COMMENT UTILISER INDOCOLLYRE® 0,1 % collyre en solution?

A titre indicatif, la posologie chez l'adulte est de :

- inhibition du myosis per-opératoire : 4 gouttes la veille de l'intervention, 4 gouttes dans les 3 heures qui précèdent l'intervention
- prévention des manifestations inflammatoires liées aux interventions chirurgicales de la cataracte et du segment antérieur de l'œil : 1 goutte, 4 à 6 fois par jour jusqu'à complète disparition de la symptomatologie en débutant le traitement 24 heures avant l'intervention ;
- traitement des manifestations douloureuses oculaires liées à la kératectomie photoréfractive au cours des premiers jours post-opératoires : 1 goutte 4 fois par jour.

Voie ophtalmique. INSTILLATION OCULAIRE

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation
 - Eviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières
 - Instiller une goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil à traiter en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
 - Après l'instillation, fermez l'œil quelques secondes.
 - Puis, appuyez avec un doigt sur le coin de votre œil situé du côté du nez pendant 2 minutes. Cela permettra de réduire le passage des substances actives dans le reste de votre organisme.
 - L'œil fermé, essuyez proprement l'excédent.
 - Rebouchez le flacon après chaque utilisation.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, instillez les deux 15 minutes.



Maladies et Chirurgie des yeux - Laser - Angiographie - Lentilles de Contact



PT221025124311

Casablanca le :

31 octobre 2023

BEN TALHA FATIMA

58,00

INDOCOLLYRE 0.1 %



1 goutte 2 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 15 jours



58,00

Dr A. ZAROURY
Ophthalmologiste
Ophtalmo-Clinique de Casablanca
13, Rue des Papillons Oasis - Casa
Tél. : 0522 25 71 71 (SLG) - Fax : 0522 25 11 15

Urgence 24/24

Sarl au Capital de 1 200 000,00 MAD - 13, Rue des Papillons - Oasis - Casablanca

Tél. (LG) : 05.22.25.71.71 - Fax : 05.22.25.11.15 - Web : www.occ.ma

RC : 416933 - I.F : 1051442 - T.P : 34788018 - C.N.S.S. : 6448395 - I.C.E. : 00207719900057



مختبر بوزوبع للتحاليلات الطبية

LABORATOIRE BOUZOUBAA

d'analyses médicales et scientifiques

إفامة طرفاية 11 شارع الزرقطوني البيضاء - الهاتف : 05.22.27.19.20 - 05.22.26.57.43
 RESIDENCE TARFAYA : 11, BD ZERKOUNI - CASA - Tél. : 05.22.27.19.20 / 05.22.26.57.43
 Email : laboratoire.bouzoubaa@gmail.com Fax : 05.22.22.94.25

Casablanca le jeudi 19 octobre 2023 Madame BENTALHA FATIMA

FACTURE N°

23J188

Analyses :

Numération formule sanguine -----	B	80
Vitesse de sédimentation -----	B	30
Taux de Prothrombine (TP) -----	B	40
Temps de céphaline-kaolin -----	B	40
Glycémie (à jeûn) -----	B	30
Hémoglobine glycquée -----	B	100
Urée -----	B	30
Créatinine -----	B	30
Acide urique -----	B	30
Cholestérol total -----	B	30
Triglycérides -----	B	60
Gamma -G.T. -----	B	50
Transaminases SGOT -----	B	50
Transaminases SGPT -----	B	50

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER 891,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Huit Cent Quatre vingt Onze Dirhams

مختبر بوزوبع للتحاليلات الطبية
 LABORATOIRE BOUZOUBAA
 d'Analyses Médicales et Scientifiques
 11 Bd. Zerktouni Rabat. Tarfaya Casablanca
 Tel: 05.22.27.19.20 / 05.22.26.57.43

Abderrahim BOUZOUBAA

Pharmacien Biologiste

Ancien Interne des CHU de France

CES hématologie, bactériologie

Virologie, parasitologie, mycologie et pathologie médicale

R.C. : 195994 - C.N.S.S. : 1207291- Patente : 36300170

I.F. : 42000050 - ICE : 001553918000012

عبد الرحيم بوزوبع

صيدلي ببولوجي

داخلي سابقًا بمستشفيات فرنسا

اختصاصي في التحاليلات الطبية والعلمية : علم الدم، علم المناعة

علم الأحياء الدقيقة، علم الطفيلييات وعلم الأمراض الطبية



مختبر بوزوبع للتحاليل الطبية

LABORATOIRE BOUZOUBAA

d'analyses médicales et scientifiques

إقليم طرفاية II شارع الزقاطوني البيضاء - الهاتف : 05 22 27 19 20 - 05 22 26 57 43
 RESIDENCE TARFAYA : 11, BD ZERKTOUNI - CASA - Tél. : 05.22.27.19.20 / 05.22.26.57.43
 Email : laboratoire.bouzoubaa@gmail.com Fax : 05 22 22 94 25

Casablanca le : 19/10/23

Madame BENTALHA FATIMA

Du : 19/10/23

Docteur MED ADIL EL KASRI

Page : 1

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME

02/01/23

NUMERATION GLOBULAIRE

Globules blancs -----:	5 510	/mm ³	4000 - 10000	6020
Globules rouges ----- :	4,56	M/mm ³	4,2 - 5,2	3,98
Hémoglobine ----- :	13,2	g/100 ml	11,5 - 15	9,5
Hématocrite ----- :	38,7	%	35 - 45	29,5
- V.G.M. ----- :	85	μ ³	85 - 95	
- T.C.M.H. ----- :	29	pg	28 - 32	
- C.C.M.H. ----- :	34	%	31 - 36	
Plaquettes ----- :	212 000	/mm ³	150000 - 400000	251000

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles ----- :	51	%	Soit :	2 810	/mm ³	2000 - 7500
Polynucléaires Eosinophiles ----- :	4	%	Soit :	220	/mm ³	< 400
Polynucléaires Basophiles ----- :	0	%	Soit :	0	/mm ³	< 400
Lymphocytes ----- :	42	%	Soit :	2 314	/mm ³	1500 - 4000
Monocytes ----- :	3	%	Soit :	165	/mm ³	200 - 800

VITESSE DE SEDIMENTATION

27/10/22

1 ^{ère} heure ----- :	31	*	mm	< 10	50
<i>Valeurs normales:</i>					

-Pour les hommes: VS = âge en années/2

-Pour les femmes: VS = âge en années(+10)/2

Cette formule ne s'applique pas après 65 ans

2 ^{ème} heure ----- :	57	*	mm	< 30	90
--------------------------------	----	---	----	------	----

HEMOSTASE

Taux de Prothrombine ----- :	100	%	75 - 100	100
Temps de Céphaline-kaolin ----- :	24	sec	(Témoin : 26 sec)	27

Abderrahim BOUZOUBAA

Pharmacien Biologiste

Ancien Interne des CHU de France

CES hématologie, bactériologie

Virologie, parasitologie, mycologie et pathologie médicale

R.C. : 195994 - C.N.S.S. : 1207291- Patente : 36300170

I.F. : 42000050 - ICE : 001553918000012

Dr Abderrahim BOUZOUBAA Biologiste
مختبر بوزوبع للتحاليل الطبية

LABORATOIRE BOUZOUBAA
 d'Analyses Médicales et Scientifiques

11 Bd. Zerktouni Récif Tarfaya Casablanca

0522 27 16 20 / 0522 28 57 48

عبد الرحيم بوزوبع

صيدلي بيولوجي

داخلي سابقًا بمستشفيات فرنسا

إختصاصي في التحاليل الطبية والعلمية : علم الدم، علم الميكروبات،

علم الأحياء الدقيقة، علم الطفيلييات وعلم الأمراض الطبية