

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0038373

Optique *185763*  Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : *6930* Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : *IMEHLI MOHAMMED*

Date de naissance : *08/08/1961*

Adresse : *Houy Ait SRI Timou LILT Afouren*

AZILAL

Tél. *0666247075* Total des frais engagés : *2.66,10* Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : *14 NOV 2023*

Nom et prénom du malade : *IMEHLI Med* Age : *62 ans*

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : *D.N.D*

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exhaustivité des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *AFOUREN* Le : *14/11/2023*

Signature de l'adhérent(e) :

*AFOUREN*

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14 NOV 2023	Collerette		116,07	INPE: 121006159 INPE: 121006159 Dr. ELAIDIZINE Médecin Généraliste Bd Marché Verte Afrique Tél: 05 23 44 17 17

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL WIDJANE * HAY EL MACHA Cabinet dentaire Dr. EL AIDIZINE Tél: 05 23 44 17 17	14/11/2023	116,10

122112907

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**ODF PROTHESES DENTAIRES**

**DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE**

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

Dr. EL AIDI Zineb  
Médecine Générale  
Diplôme de la Faculte de  
Médecine et du Pharmacie  
Au Casablanca  
Ancien Médecin de Centre  
de Santé Afourer



الدكتورة العيدي زينب  
الطب العام  
خريجة كلية الطب والصيدلة  
بالدار البيضاء  
طبيبة سابقة بالمركز الصحي

أفورار

Dr. EL AIDI ZINEB  
Médecine Générale  
Bd Marché Verte Afourer  
Tél: 05 23 44 17 17  
Mohamed  
reçu 9 Beta

14 NOV 2023

12,90 X 9

FP RADIA CP

T = 116,10

1

1

SV

PH 2 mois

Dr. EL AIDI ZINEB  
Médecine Générale  
Bd Marché Verte Afourer  
Tél: 05 23 44 17 17

12,90



شارع المسيرة الخضراء الطابق الأول أفورار ، الهاتف : 05 23 44 17 17 - 06 75 83 42 90  
Avenue AL Massira El Khadra 1er étage Afourer, Tél : 05 23 44 17 17 - 06 75 83 42 90



## IPRADIA LP 500 mg,

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **IPRADIA LP 1000 mg.**

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

## Metformine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique effets indésirables.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

IPRADIA LP comprimé à libération prolongée contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

IPRADIA LP est utilisé conjointement avec un régime alimentaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice sont insuffisants pendant 3 à 6 mois.

l'exercice de permettre la glycémie de baisser.

la glycémie, le diabète, l'hypertension artérielle, de diabète. Le médicament de 45 ans, élevée après la grossesse. IPRADIA lorsque la glycémie

tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

Les personnes atteintes de dia suffisamment d'insuline par leu pas correctement à l'insuline accumulation de glucose dans nombre de problèmes graves que vous continuiez à prendre ne présentez pas de symptô corps plus sensible à l'insul normale dont votre corps utilis IPRADIALP est associé à un p de poids modeste.

IPRADIA LP comprimés à libération contrôlée sont donc différents de nombreux médicaments contenant de la metformine.

## 2. QUELLES SONT LES RISQUES AVANT DE PRENDRE IPR, prolongée?

Ne prenez jamais IPRADIA LP, c

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux autres composants mentionnés dans la rubrique 6 ; Une réaction allergique peut provoquer des démangeaisons ou un essoufflement.
  - Si vous avez des problèmes de santé.
  - Si vous souffrez d'une déterioration de votre état de santé.
  - Si vous avez un diabète non contrôlé, une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une acidose lactique (voir ci-dessous) ou une acidocétose (substances appelées « corps gras dans le sang ce qui peut conduire à la mort) qui peuvent conduire à la mort.
  - Si vous avez perdu trop d'eau suite à une diarrhée persistante pendant plusieurs jours. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent entraîner une acidose lactique (voir « Avertissements »).
  - Si vous avez une infection grave dans les poumons ou des bronches, ou une infection urinaire. Ces infections peuvent entraîner une déshydratation.

12,90

**Risque d'acidose lactique**



## IPRADIA LP 500 mg,

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **IPRADIA LP 1000 mg.**

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

## Metformine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique effets indésirables.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

IPRADIA LP comprimé à libération prolongée contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

IPRADIA LP est utilisé conjointement avec un régime alimentaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice sont insuffisants pendant 3 à 6 mois.

l'exercice de permettre la glycémie de baisser.

la glycémie, le diabète, l'hypertension artérielle, de diabète. Le médicament de 45 ans, élevée après la grossesse. IPRADIA lorsque la glycémie

tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

Les personnes atteintes de dia suffisamment d'insuline par leu pas correctement à l'insuline accumulation de glucose dans nombre de problèmes graves que vous continuiez à prendre ne présentez pas de symptô corps plus sensible à l'insul normale dont votre corps utilis IPRADIALP est associé à un p de poids modeste.

IPRADIA LP comprimés à libération contrôlée sont donc différents de nombreux médicaments contenant de la metformine.

## 2. QUELLES SONT LES AVANT DE PRENDRE IPR, prolongée?

Ne prenez jamais IPRADIA LP, c

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux autres composants mentionnés dans la rubrique 6 ; Une réaction allergique peut provoquer des démangeaisons ou un essoufflement.
  - Si vous avez des problèmes de santé.
  - Si vous souffrez d'une déterioration de votre état de santé.
  - Si vous avez un diabète non contrôlé, une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une acidose lactique (voir ci-dessous) ou une acidocétose (substances appelées « corps gras dans le sang ce qui peut conduire à la mort) qui peuvent conduire à la mort.
  - Si vous avez perdu trop d'eau suite à une diarrhée persistante pendant plusieurs jours. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent entraîner une acidose lactique (voir « Avertissements »).
  - Si vous avez une infection grave dans les poumons ou des bronches, ou une infection urinaire. Ces infections peuvent entraîner une déshydratation.

12,90

peuvent entraîner en d. et précautions. Un traitement a été récemment proposé pour ces problèmes. Il s'agit d'un médicament à base de sanguine d'acné (sanguine d'acné).

**Risque d'acidose lactique**  
IPRADIA LP peut provoquer



## IPRADIA LP 500 mg,

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **IPRADIA LP 1000 mg.**

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

## Metformine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique effets indésirables.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

IPRADIA LP comprimé à libération prolongée contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

IPRADIA LP est utilisé conjointement avec un régime alimentaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice sont insuffisants pendant 3 à 6 mois.

l'exercice de permettre la glycémie de baisser.

la glycémie, le diabète, l'hypertension artérielle, de diabète. Le médicament de 45 ans, élevée après la grossesse. IPRADIA lorsque la glycémie

tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

Les personnes atteintes de dia suffisamment d'insuline par leu pas correctement à l'insuline accumulation de glucose dans nombre de problèmes graves que vous continuiez à prendre ne présentez pas de symptô corps plus sensible à l'insul normale dont votre corps utilis IPRADIALP est associé à un p de poids modeste.

IPRADIA LP comprimés à libération contrôlée sont donc différents de nombreux médicaments contenant de la metformine.

## 2. QUELLES SONT LES AVANT DE PRENDRE IPR, prolongée?

Ne prenez jamais IPRADIA LP, c

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux autres composants mentionnés dans la rubrique 6 ; Une réaction allergique peut provoquer des démangeaisons ou un essoufflement.
  - Si vous avez des problèmes de santé.
  - Si vous souffrez d'une déterioration de votre état de santé.
  - Si vous avez un diabète non contrôlé, une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une acidose lactique (voir ci-dessous) ou une acidocétose (substances appelées « corps gras dans le sang ce qui peut conduire à la mort) qui peuvent conduire à la mort.
  - Si vous avez perdu trop d'eau suite à une diarrhée persistante pendant plusieurs jours. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent entraîner une acidose lactique (voir « Avertissements »).
  - Si vous avez une infection grave dans les poumons ou des bronches, ou une infection urinaire. Ces infections peuvent entraîner une déshydratation.

12,90

**Risque d'acidose lactique**



## IPRADIA LP 500 mg,

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **IPRADIA LP 1000 mg.**

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **Metformine chlorhydrate**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique effets indésirables.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

IPRADIA LP comprimé à libération prolongée contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

IPRADIA LP est utilisé conjointement avec un régime alimentaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice sont insuffisants pendant 3 à 6 mois.

l'exercice de permettre la glycémie de baisser.

la glycémie, le diabète, l'hypertension artérielle, de diabète. Le médicament de 45 ans, élevée après la grossesse. IPRADIA lorsque la glycémie

tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

Les personnes atteintes de dia suffisamment d'insuline par leu pas correctement à l'insuline accumulation de glucose dans nombre de problèmes graves que vous continuiez à prendre ne présentez pas de symptô corps plus sensible à l'insul normale dont votre corps utilis IPRADIALP est associé à un p de poids modeste.

IPRADIA LP comprimés à libération contrôlée sont donc différents de nombreux médicaments contenant de la metformine.

## 2. QUELLES SONT LES AVANT DE PRENDRE IPR, prolongée?

Ne prenez jamais IPRADIA LP, c

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux autres composants mentionnés dans la rubrique 6.
  - Une réaction allergique peut provoquer des démangeaisons ou un éssore.
  - Si vous avez des problèmes de santé.
  - Si vous souffrez d'une déterioration de votre état de santé.
  - Si vous avez un diabète non contrôlé, une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une acidose lactique (voir ci-dessous) ou une acidocétose (substances appelées « corps gras dans le sang ce qui peut conduire à la mort). Les symptômes comprennent une respiration rapide et profonde, une haleine qui présente une odeur fruitée.
  - Si vous avez perdu trop d'eau suite à une diarrhée persistante pendant plusieurs jours. Les problèmes de reins qui peuvent survenir sont liés à l'acidose lactique (voir « Avertissements »).
  - Si vous avez une infection grave dans les poumons ou des bronches, ou une infection urinaire. Ces infections peuvent entraîner une déterioration de votre état de santé.

12,90

Risque d'acidose lactique  
IPRADIA LP peut provoquer



## IPRADIA LP 500 mg,

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **IPRADIA LP 1000 mg.**

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

## Metformine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique effets indésirables.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

IPRADIA LP comprimé à libération prolongée contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

IPRADIA LP est utilisé conjointement avec un régime alimentaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice sont insuffisants pendant 3 à 6 mois.

l'exercice de permettre la glycémie de baisser.

la glycémie, le diabète, l'hypertension artérielle, de diabète. Le médicament de 45 ans, élevée après la grossesse. IPRADIA lorsque la glycémie

tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

Les personnes atteintes de dia suffisamment d'insuline par leu pas correctement à l'insuline accumulation de glucose dans nombre de problèmes graves que vous continuiez à prendre ne présentez pas de symptô corps plus sensible à l'insul normale dont votre corps utilis IPRADIA LP est associé à un p de poids modeste.

IPRADIA LP comprimés à libération contrôlée sont donc différents de nombreux médicaments contenant de la metformine.

## 2. QUELLES SONT LES RISQUES AVANT DE PRENDRE IPR, prolongée?

Ne prenez jamais IPRADIA LP, c

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux autres composants mentionnés dans la rubrique 6.
  - Une réaction allergique peut provoquer des démangeaisons ou un éssorement.
  - Si vous avez des problèmes de santé.
  - Si vous souffrez d'une déterioration de votre état de santé.
  - Si vous avez un diabète non contrôlé, une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une acidose lactique (voir ci-dessous) ou une acidocétose (substances appelées « corps gras dans le sang » qui peuvent conduire à la mort si elles sont trop élevées). Ces symptômes comprennent une respiration rapide et profonde, et une haleine qui présente une odeur fruitée.
  - Si vous avez perdu trop d'eau suite à une diarrhée persistante pendant plusieurs jours.
  - Si vous avez des problèmes de reins qui peuvent être causés par une acidose lactique (voir « Avertissements »).
  - Si vous avez une infection grave dans les poumons ou des bronches, ou une infection urinaire.

12,90

**Risque d'acidose lactique**  
IPRADIA LP peut provoquer



## IPRADIA LP 500 mg,

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **IPRADIA LP 1000 mg.**

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

### Metformine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique effets indésirables.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

IPRADIA LP comprimé à libération prolongée contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

IPRADIA LP est utilisé conjointement avec un régime alimentaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice sont insuffisants pendant 3 à 6 mois.

l'exercice de permettre la glycémie de baisser.

la glycémie, le diabète, l'hypertension artérielle, de diabète. Le médicament de 45 ans, élevée après la grossesse. IPRADIA lorsque la glycémie

tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

Les personnes atteintes de dia suffisamment d'insuline par leu pas correctement à l'insuline accumulation de glucose dans nombre de problèmes graves que vous continuiez à prendre ne présentez pas de symptô corps plus sensible à l'insul normale dont votre corps utilis IPRADIALP est associé à un p de poids modeste.

IPRADIA LP comprimés à libération contrôlée sont donc différents de nombreux médicaments contenant de la metformine.

## 2. QUELLES SONT LES RISQUES AVANT DE PRENDRE IPR, prolongée?

Ne prenez jamais IPRADIA LP, c

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux autres composants mentionnés dans la rubrique 6 ; Une réaction allergique peut provoquer des démangeaisons ou un essoufflement.
  - Si vous avez des problèmes de santé.
  - Si vous souffrez d'une déterioration de votre état de santé.
  - Si vous avez un diabète non contrôlé, une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une acidose lactique (voir ci-dessous) ou une acidocétose (substances appelées « corps gras dans le sang ce qui peut conduire à la mort) qui peuvent conduire à la mort.
  - Si vous avez perdu trop d'eau suite à une diarrhée persistante pendant plusieurs jours. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent entraîner une acidose lactique (voir « Avertissements »).
  - Si vous avez une infection grave dans les poumons ou des bronches, ou une infection urinaire. Ces infections peuvent entraîner une déshydratation.

12,90

Risque d'acidose lactique  
IPRADIA LP peut provoquer



## IPRADIA LP 500 mg,

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **IPRADIA LP 1000 mg.**

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

## Metformine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique effets indésirables.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

IPRADIA LP comprimé à libération prolongée contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

IPRADIA LP est utilisé conjointement avec un régime alimentaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice sont insuffisants pendant 3 à 6 mois.

l'exercice de permettre la glycémie de baisser.

la glycémie, le diabète, l'hypertension artérielle, de diabète. Le médicament de 45 ans, élevée après la grossesse. IPRADIA lorsque la glycémie

tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

Les personnes atteintes de dia suffisamment d'insuline par leu pas correctement à l'insuline accumulation de glucose dans nombre de problèmes graves que vous continuiez à prendre ne présentez pas de symptô corps plus sensible à l'insul normale dont votre corps utilis IPRADIALP est associé à un p de poids modeste.

IPRADIA LP comprimés à libération contrôlée sont donc différents de nombreux médicaments contenant de la metformine.

## 2. QUELLES SONT LES RISQUES AVANT DE PRENDRE IPR, prolongée?

Ne prenez jamais IPRADIA LP, c

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux autres composants mentionnés dans la rubrique 6 ; Une réaction allergique peut provoquer des démangeaisons ou un essoufflement.
  - Si vous avez des problèmes de santé.
  - Si vous souffrez d'une déterioration de votre état de santé.
  - Si vous avez un diabète non contrôlé, une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une acidose lactique (voir ci-dessous) ou une acidocétose (substances appelées « corps gras dans le sang ce qui peut conduire à la mort) qui peuvent conduire à la mort.
  - Si vous avez perdu trop d'eau suite à une diarrhée persistante pendant plusieurs jours. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent entraîner une acidose lactique (voir « Avertissements »).
  - Si vous avez une infection grave dans les poumons ou des bronches, ou une infection urinaire. Ces infections peuvent entraîner une déshydratation.

12,90

Risque d'acidose lactique  
IPRADIA LP peut provoquer



## IPRADIA LP 500 mg,

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

#### **IPRADIA LP 1000 mg.**

Comprimé à libération prolongée. Boîte de 30.

## Metformine chlorhydrate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique effets indésirables.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  3. Comment prendre IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
  5. Comment conserver IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ?
  6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE IPRADIA LP, comprimé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

IPRADIA LP comprimé à libération prolongée contient de la metformine. C'est un médicament utilisé pour traiter le diabète type II (non insulino-dépendant). Il appartient à la classe de médicaments appelés les biguanides.

IPRADIA LP est utilisé conjointement avec un régime alimentaire et de l'exercice pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les adultes en surpoids, lorsque le régime alimentaire et l'exercice sont insuffisants pendant 3 à 6 mois.

l'exercice de permettre la glycémie de baisser.

la glycémie, le diabète, l'hypertension artérielle, de diabète. Le médicament de 45 ans, élevée après la grossesse. IPRADIA lorsque la glycémie

tissus corporels de prendre le glucose du sang et de l'utiliser pour l'énergie ou pour le stockage pour une utilisation future.

Les personnes atteintes de dia suffisamment d'insuline par leu pas correctement à l'insuline accumulation de glucose dans nombre de problèmes graves que vous continuiez à prendre ne présentez pas de symptô corps plus sensible à l'insul normale dont votre corps utilis IPRADIALP est associé à un p de poids modeste.

IPRADIA LP comprimés à libération contrôlée sont donc différents de nombreux médicaments contenant de la metformine.

## 2. QUELLES SONT LES AVANT DE PRENDRE IPR, prolongée?

Ne prenez jamais IPRADIA LP, c

- Si vous êtes allergique (hypersensibilité) aux autres composants mentionnés dans la rubrique 6 ; Une réaction allergique peut provoquer des démangeaisons ou un essoufflement.
  - Si vous avez des problèmes de santé.
  - Si vous souffrez d'une déterioration de votre état de santé.
  - Si vous avez un diabète non contrôlé, une hyperglycémie sévère (taux élevé de sucre dans le sang), des nausées, des vomissements, une acidose lactique (voir ci-dessous) ou une acidocétose (substances appelées « corps gras dans le sang ce qui peut conduire à la mort) qui peuvent conduire à la mort.
  - Si vous avez perdu trop d'eau suite à une diarrhée persistante pendant plusieurs jours. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent entraîner une acidose lactique (voir « Avertissements »).
  - Si vous avez une infection grave dans les poumons ou des bronches, ou une infection urinaire. Ces infections peuvent entraîner une déshydratation.

12,90

peuvent entraîner en d. et précautions. Un traitement a été récemment proposé pour ces problèmes. Il s'agit d'un médicament à base de sanguine d'acné (sanguine d'acné).

**Risque d'acidose lactique**  
IPRADIA LP peut provoquer