

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

185701

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 320 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TAICH NINA veuve ALLAL Ahmed.

Date de naissance : 01/11/1944

Adresse : 35, Rue Allal Ben Abdellah - Casablanca

Tél. : 0662510510 Total des frais engagés : 29.19.15 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Maâti SABRI
Cardiologue
235, Bd. Ziraoui 1 Etage Appt. 1
Tél : 07 03 09 02 50

Date de consultation : 29.11.2023

Nom et prénom du malade : TAICH NINA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : H.T.A


Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exhaustivité des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 06/12/2023

Signature de l'adhérent(e) 



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29-11-23	Actes + ECG	300 X 14	4200	Docteur M. A. 235, Bd. Z. 2023 09 02 50

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AJAJMA Natalia Lamine Avenue... 29-11-23 Casablanca - Tel.: 05 22 20 28 67	29-11-23	2619,10

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CŒFFICIENT DES TRAVAUX
				
MONTANTS DES SOINS				
DEBUT D'EXECUTION				
FIN D'EXECUTION				
CŒFFICIENT DES TRAVAUX				
MONTANTS DES SOINS				
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				

O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE	
H	G
25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553
D	G
00000000	00000000

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr.MAATI SABRI

CARDIOLOGUE

SPECIALITE DES MALADES
CARDIO - VASCULAIRES
EX-CHEF DE SERVICE
DE CARDIOLOGUE - USIC

A LA POLYCLINIQUE CNSS ZIROU



الدكتور المعطى صبري

اخصائي في امراض القلب و الشرايين
رئيس مصلحة القلب و الشريين سابق
بمصحة الضمان الاجتماعي الزيراوي

PHARMACIE LA HAJAJMA
Avenue du Phare Casablanca Tel: 05 22 20 28 28
Casablanca le: 29/11/23

Mme TAF. C. 1

Min: 28

01 2 45

2800 X 1
Pharmacie La Hajajma
Avenue du Phare Casablanca
Tel: 05 22 20 28 28

LOT: 0469
PER: 10 2026
PPV: 46.00DH

ستيمو
ملاس السبتيرولين

46.70

141

2 جرعة

415

1340 X 3

650 X 50 50

46.00

141

5

50.70 X 5

141

5

27000 X 5

141

5

CoPlavix® 75

comprimés pelliculés

clopидogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

5 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
 3. Comment prendre CoPlavix
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
 5. Comment conserver CoPlavix
 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAYIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétysalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angoir instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

vous avez une maladie à
l'œsophage nasal.

- si vous souffrez d'une maladie
 - si vous souffrez d'une maladie
 - si vous êtes dans le 3ème tr...

Avertissements et précautions

Si l'une des situations me
vous devez en avertir v

- si vous avez un rhume
 - une maladie
 - un rhume
 - de la grippe
 - une grippe
 - une grippe
 - une grippe
 - une grippe

Pendant la prise de

- Vous devez avertir si une intervention abdominale, ou dans l'intestin
 - Vous devez aussi apparaître comme des personnes de fatigue extrême ou des yeux (jaunisse) (vo
 - Si vous vous coupez ou peut demander plus de temps d'action de votre médicament sanguins. Dans le cas de constater d'anormal. Cependant, si vous devez en avertir immédiatement "Effets indésirables éventuels".
 - Votre médecin pourra vous demander sanguins.

CoPlavix® 75

comprimés pelliculés

clopидogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

6 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
 3. Comment prendre CoPlavix
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
 5. Comment conserver CoPlavix
 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétysalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angoir instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPALVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

vous avez une maladie à
l'œsophage nasal.

- si vous souffrez d'une maladie
 - si vous souffrez d'une maladie
 - si vous êtes dans le 3ème tr...

Avertissements et précautions

Si l'une des situations me vous devez en avertir vous

- si vous avez un rhume
 - une maladie
 - un rhume
 - de la grippe
 - la grippe
 - la grippe
 - la grippe
 - la grippe

Pendant la prise de

- Vous devez avertir
 - si une intervention chirurgicale est nécessaire
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou dans l'intestin
 - Vous devez aussi avertir si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT qui apparaît comme des palpitations, ou de fatigue extrême importante, ou des yeux jaunis (jaunisse) (voir page 10).
 - Si vous vous coupez ou vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament anticoagulant sanguins. Dans le cas de coups (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous devez en avertir immédiatement votre médecin pour "Effets indésirables éventuels".
 - Votre médecin pourra vous demander de faire des tests sanguins.

CoPlavix® 75

comprimés pelliculés

clopидogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

6 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
 3. Comment prendre CoPlavix
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
 5. Comment conserver CoPlavix
 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétysalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angoir instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPALVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

vous avez une maladie à
l'œsophage nasal.
vous avez une maladie
légère tel qu'un ulcère à
l'œsophage.

- si vous souffrez d'une maladie
 - si vous souffrez d'une maladie
 - si vous êtes dans le 3ème tr...

Avertissements et précautions

Si l'une des situations me vous devez en avertir vous

- si vous avez un rhume
 - une maladie
 - un rhume
 - de la grippe
 - la grippe
 - la grippe
 - la grippe
 - la grippe

Pendant la prise de

- Vous devez avertir
 - si une intervention chirurgicale est nécessaire
 - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou dans l'intestin
 - Vous devez aussi avertir si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT qui apparaît comme des palpitations, ou de fatigue extrême importante, ou des yeux jaunis (jaunisse) (voir page 10).
 - Si vous vous coupez ou vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour l'action de votre médicament anticoagulant sanguins. Dans le cas de coups (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous devez en avertir immédiatement votre médecin pour "Effets indésirables éventuels".
 - Votre médecin pourra vous demander de faire des tests sanguins.

CoPlavix® 75

comprimés pelliculés

clopидogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

6 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
 3. Comment prendre CoPlavix
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
 5. Comment conserver CoPlavix
 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérosclérose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlaxix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

vous avez une maladie à
l'œsophage nasal.

- si vous souffrez d'une maladie
 - si vous souffrez d'une maladie
 - si vous êtes dans le 3ème tr...

Avertissements et précautions

Si l'une des situations me vous devez en avertir votre

- si vous avez un rhume
 - une maladie
 - un rhume
 - de la grippe
 - une grippe
 - une grippe
 - une grippe

Pendant la prise de

- Vous devez avertir
 - si une intervention
 - si vous souffrez d'abdominales, ou dans l'intestin
 - Vous devez aussi avertir si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT) qui apparaît comme des palpitations, ou de fatigue extrême importante, ou des yeux (jaunisse) (jaunissement)
 - Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour constater l'action de votre médicament sur les éléments sanguins. Dans le cas de coups (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous devez en avertir immédiatement "Effets indésirables éventuels".
 - Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.

CoPlavix® 75

comprimés pelliculés

clopидogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

5 118001 082018

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
 3. Comment prendre CoPlavix
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels
 5. Comment conserver CoPlavix
 6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE COPLAYIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétysalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angoir instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
 - si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

vous avez une maladie à
l'œsophage nasal.
vous avez une maladie
légère tel qu'un ulcère à
l'œsophage.

- si vous souffrez d'une maladie
 - si vous souffrez d'une maladie
 - si vous êtes dans le 3ème tr...

Avertissements et précautions

Si l'une des situations me
vous devez en avertir v

- si vous avez un rhume
 - une maladie
 - un rhume
 - de la grippe
 - une grippe
 - une fièvre
 - une toux
 - une grippe
 - une grippe

Pendant la prise de

- Vous devez avertir
 - si une intervention
 - si vous souffrez d'abdominales, ou dans l'intestin
 - Vous devez aussi avertir si vous présentez une maladie thrombotique ou PTT qui apparaît comme des palpitations, ou de fatigue extrême ou des yeux (jaunisse) (voir page 10).
 - Si vous vous coupez ou si vous saignez, vous pouvez demander plus de temps à l'action de votre médicament pour éviter les saignements. Dans le cas de coups (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous devez en avertir immédiatement votre médecin ("Effets indésirables éventuels").
 - Votre médecin pourra vous demander de faire des tests sanguins.

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم



6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables 8/30
PPV: 13,40 DH

7862160336

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتهاء قبلي استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أستئنة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك.

• وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة.

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 6 - محتويات العلبة و معلومات أخرى
- 1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

فترة الحمل.
الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يحتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تحتاجها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.
الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.
قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخدمة

الصنف
هذا الـ
دواء

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم



6 118001 102013
 Levothyrox® 50µg,
 Comprimés sécables 8/30
 PPV: 13,40 DH

7862160336

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتهاء قبلي استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أستئنة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك

• وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة.

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 6 - محتويات العلبة و معلومات أخرى
- 1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يحتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تحتاجها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعية الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخدمة

الصنف
هذا
دواء

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم



6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables 8/30
PPV: 13,40 DH

7862160336

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتهاء قبلي استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

• احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أستئنة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك.

• وصف لك هذا الدواء شخصيا. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

• إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضا على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة.

انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 6 - محتويات العلبة و معلومات أخرى
- 1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يحتاز قليلا جدا حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تحتاجها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخدمة

الصنف
هذا الـ
دواء

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL



Précaution de cette notice avant de prendre ce médicament

Informations importantes pour vous, demandez plus d'informations à votre médecin

Personnellement prescrit. Ne le donnez pas à un être nocif, même si les signes de leur maladie

devient grave ou si vous remarquez un effet

de cette notice, parlez-en à votre médecin ou à

comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?

Ans à connaitre avant de prendre ZYLORIC,

comprimés ?

Problèmes éventuels ?

Comprimés ?

U.S.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines.

ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

• En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.

• Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

• Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.

• Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

• Souffrez actuellement d'une crise de goutte.

• Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.

• Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent associées à d'autres symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, et symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers des vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez immédiatement votre médecin.

• Si vous souffrez de calculs rénaux, leur taille peut diminuer et ils passer dans les voies urinaires.

Autres médicaments et ZYLORIC, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pourriez prendre l'un des médicaments suivants :

• Aspirine

• Théophylline, utilisée pour des problèmes respiratoires

• Médicaments utilisés pour des convulsions (épilepsie), phénitoïne

• Vidarabine (anti-viral), utilisée pour traiter l'herpès ou la varicelle

• Didanosine, utilisée pour traiter une infection par le VIH

• Antibiotiques (ampicilline ou amoxicilline) →

• Médicaments utilisés pour traiter les Cancers

• Médicaments utilisés pour réduire la réponse immunologique (immunosuppresseurs, par exemple azathioprine ou mercaptopurine)

• Médicaments utilisés pour traiter le diabète

• Médicaments pour les problèmes cardiaques ou l'hypertension artérielle, comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine)

• Diurétiques (pour éliminer l'eau)

• Médicaments utilisés pour fluidifier le sang (anticoagulants), comme la warfarine

• Tout autre médicament utilisé pour traiter la goutte.

Veuillez avertir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, récemment pris tout autre médicament, notamment des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des médicaments à base de plantes.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte, planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, il est conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Liste des excipients à effet notable: Lactose.

Si votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucre, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après les repas.

Posologie

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour. Vous commencerez généralement avec une faible dose, qui sera augmentée progressivement.

Si vous êtes âgé(e) ou si votre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible ou vous demander d'espacer les prises du médicament. Si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par semaine, votre médecin pourra vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg devra être prise immédiatement après votre dialyse.

Utilisation chez les enfants (âgés de moins de 15 ans)

Les posologies habituelles sont comprises entre 100 à 400 mg par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après les repas.

كوفيرام® 5 ملغ/10 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين

كوفيرا®

بيراندوبريل أرج

2080

كوفيرام® 5 ملغ/5 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغ/5 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين / أملوديبين

اقرأ بدقّة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستناد إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة. فقد
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدللي بها في هذه النشرة (أنظر إلى مقطع 4 : «ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

زيادة غير متوقعة في الناتئ الخاقن لضغط الدم لـ كوفيرام حبة، العمل، الإرهاص والخمودة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين بأنك حامل أو كنت تخططين للحمل، فاطلبين نصيحة طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

العمل يجب أن تغيري طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو قد تصيغين) حاملاً.

عادة سوف يتضمن طبيبك بالتوقف عنأخذ كوفيرام حبة قبل حدوث العمل أو مجرد وقوفه حيث سيفض لك دواء آخر بدلاً عنه.

لتنضم بأذن كوفيرام حبة في بداية العمل، كما أنه قد يؤدي إلى إصوات وصيحة للجنين عند إستعماله بعد الشهور الثالث من العمل.

يوصى كوفيرام، حبة لعلاج إرتفاع الضغط الشرياني وأو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستتر (في حال تناقض أو الإصصار الدام الوراء للقلب).

أعلمي طبيبك إن كنت ترضعين أو على ششك الإرضاخ.

لا يوصى بإعطاء كوفيرام حبة للأمهات المرضعات، ويعمل طبيبك أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت تفضلين الإرضاخ خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سباق لأوانه (خدي).

قيادة السيارات أو العمل على الآليات:

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أي حالة يستعمل؟

2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبلأخذ كوفيرام، حبة؟

3. كيف يؤخذ كوفيرام، حبة؟

4. ما في الآثار الجانبية المحتملة؟

5. كيف يحافظ كوفيرام، حبة؟

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

7. ما هو كوفيرام، حبة وفي أي حالة يستعمل؟

الثانية العالمية الصيدلانية: مبادئ الممارسة المنشورة للأرجيفوتسين (IEC) وحاصر للكالسيوم.

كود C09BB04 : ATC : 0204

يوصى كوفيرام، حبة لارتفاع الضغط الشرياني وأو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستتر (في حال

تناقض أو الإصصار الدام الوراء للقلب)، أو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستتر (في حال تناقض أو الإصصار الدام الوراء للقلب).

فيما يلي المرض الذي يستخدمونه بيراندوبريل وـ أملوديبين بطريقة منفصلة أن يأخذوا كلا المادتين

في حبة واحدة من كوفيرام، حبة.

إن كوفيرام، حبة عبارة عن مزيج من مادتين فعاليتين: بيراندوبريل وأملوديبين.

إن بيراندوبريل ينشط الممارسة المنشورة للأرجيفوتسين (IEC)، وأملوديبين حاصر للكالسيوم (ينتفي

كوفيرام® 5 ملغ/10 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين

كوفيرا®

بيراندوبريل أرج

2080

كوفيرام® 5 ملغ/5 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغ/5 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين / أملوديبين

اقرأ بدقّة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستناد إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة. فقد
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدللي بها في هذه النشرة (أنظر إلى مقطع 4 : «ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

زيادة غير متوقعة في الناتئ الخاقن لضغط الدم لـ كوفيرام حبة، العمل، الإرهاص والخمودة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين بأنك حامل أو كنت تخططين للحمل، فاطلبى نصيحة طببك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

العمل يجب أن تغيري طببك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو قد تصيغين) حاملاً عادة سوف يتضمن طببك بالتوقف عنأخذ كوفيرام حبة قبل حدوث العمل أو مجرد وقوفه حيث

سيصف لك دواء آخر بدلاً عنه. لا ينصح بأخذ كوفيرام حبة في بداية العمل، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وعجمة للجنين عند إستعماله بعد الشهور الثالث من العمل.

الإرهاص يوصى كوفيرام، حبة لعلاج إرهاص الضغط الشرياني وأو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستتر (في حال تناقض أو الإصصار الدام الوراء للقلب).

أعلمى طببك إن كنت ترضعين على أو شكل الإرهاص لا يوصى بإعطاء كوفيرام حبة للثديات المرضعات، ويعمل طببك أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت تفضلين الإرهاص خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سابق لأوانه (خدع).

قيادة السيارات أو العمل على الآليات:

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أي حالة يستعمل؟

2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبلأخذ كوفيرام، حبة؟

3. كيف يؤخذ كوفيرام، حبة؟

4. ما في الآثار الجانبية المحتملة؟

5. كيف يحفظ كوفيرام، حبة؟

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

7. ما هو كوفيرام، حبة وفي أي حالة يستعمل؟

الثانية العالمية الصيدلانية: مبادئ الممارسة المنشورة للأرجيوتسين (IEC) وحاصر للكالسيوم.

كود C09BB04 : ATC : 0204

يوصى كوفيرام، حبة لعلاج إرهاص الضغط الشرياني وأو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستتر (في حال تناقض أو الإصصار الدام الوراء للقلب).

يمكنكم للمرضى الذين يستخدمون بيراندوبريل وأملوديبين بطريقة منفصلة أن يأخذوا كلا المادتين في حبة واحدة من كوفيرام، حبة.

إن كوفيرام، حبة عبارة عن مزيج من مادتين فعاليتين: بيراندوبريل وأملوديبين.

إن بيراندوبريل ينشط الممارسة المنشورة للأرجيوتسين (IEC) وأملوديبين حاصر للكالسيوم (ينتفي

كوفيرام® 5 ملغ/10 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين

كوفيرا®

بيراندوبريل أرج

2080

كوفيرام® 5 ملغ/5 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين / أملوديبين

كوفيرام® 10 ملغ/5 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجينين / أملوديبين

اقرأ بدقّة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستناد إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة. فقد
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدللي بها في هذه النشرة (أنظر إلى مقطع 4 : «ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

زيادة غير متوقعة في الناتئ الخاقن لضغط الدم لـ كوفيرام حبة، العمل، الإرهاص والخمودة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين بأنك حامل أو كنت تخططين للحمل، فاطلبى نصيحة طببك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

العمل يجب أن تغيري طببك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو قد تصيغين) حاملاً.

عادة سوف يتضمن طببك بالتوقف عنأخذ كوفيرام حبة قبل حدوث العمل أو مجرد وقوفه حيث سيفض لك دواء آخر بدلاً عنه.

لتنضم بأذن كوفيرام حبة في بداية العمل، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وعجمة للجنين عند إستعماله بعد الشهور الثالث من العمل.

يوصى كوفيرام، حبة لعلاج إرتفاع الضغط الشرياني وأو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستتر (في حال تناقض أو الإصصار الدام الوراء للقلب).

أعلمى طببك إن كنت ترضعين أو على ششك الإرضاخ.

لا يوصى بإعطاء كوفيرام حبة للأمهات المرضعات، ويعمل طببك أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت تفضلين الإرضاخ خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سباق لأوانه (خدي).

قيادة السيارات أو العمل على الآليات:

في هذه النشرة:
1. ما هو كوفيرام، حبة وفي أي حالة يستعمل؟

2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبلأخذ كوفيرام، حبة؟
3. كيف يؤخذ كوفيرام، حبة؟

4. ما في الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحافظ كوفيرام، حبة؟

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

7. ما هو كوفيرام، حبة وفي أي حالة يستعمل؟
الثانية العالمية الصيدلانية: مبادئ الممارسة المنشورة للأرجيفوتسين (IEC) وحاصر للكالسيوم.

كود C09BB04 : ATC : 111

يوصى كوفيرام، حبة لارتفاع الضغط الشرياني وأو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستتر (في حال تناقض أو الإصصار الدام الوراء للقلب).

يمكنكم للمرضى الذين يستخدمون بيراندوبريل وـ أملوديبين بطريقة منفصلة أن يأخذوا كلا المادتين في حبة واحدة من كوفيرام، حبة.

إن كوفيرام، حبة عبارة عن مزيج من مادتين فعاليتين: بيراندوبريل وأملوديبين.

إن بيراندوبريل يحتوي على الممارسة المنشورة للأرجيفوتسين (IEC) وأملوديبين حاصر للكالسيوم (بنفيني

كوفيرام® 5 ملغ/10 ملغ حبات

كوفيرام® 5 ملغ / 5 حبات

کوفیرا

كوفيرام® 10 ملغ / 5 ملغ حبات

اقرأ بدقّة هذه النّشّة قبل أن تأخذ هذا الدّواء. لأنّها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لستند إليها من جديد.
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل الطبيب أو الصيدلاني.
 - لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد يمرر.
 - إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المراد بها في هذه النشرة (انظر إلى مقطوع 4: «ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟»)

زيادة غير متوقعة في التأثير الخافض لضغط الدم لكونفرايم جبة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين بأنك حامل أو كنت تخططين للحمل، فاطلبني نصيحة طبّيّك أو

الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

يجب أن تحمي طبسك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو قد تصرين) حاملاً.

عادةً سوف ينصحك طبيبك بالتوقف عن أخذ كوفيرام حية قبل حدوث الحمل أو مجرد وقوعه حيث

سيحق لك دواه آخر بديلًا عنه.

يعد الشهر الثالث من العمل.

الإرتفاع

لقد اثبتت أن الملوّذين يفترّزون في حليب الأم بكميات ضئيلة.
أعلم، طبعك أن كتّب تعضعين أو على شكل الإضاء.

لا يومي ياعطا، كوفيرام جبة للأمهات المرضعات، ويمكن لطبيبك أن يختار لك علاجا آخر إذا كنت تفضلين

الإرضاخ خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سابق لأوانه (خديج).

في هذه النشرة:
١. ما هي كفران حمة وآئية حلة مستحبة؟

2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبلأخذ كوفيرام، حبة؟

3. كيف يُؤخذ كوفيرام، جبة؟

٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
٥. كيف يحفظ كوفيرام، حبة؟

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

کود C09BB04 : ATC

يوصي كوفيرام، جبة لعلاج إرتفاع الضغط الشرياني وأو لعلاج أمراض الشريان التاجي المستتر (في حال انتشار المرض إلى الشريان التاجي)

في مكان المرض الذين يستخدمون البراندوبيريل والأمودوبين بطريقة منفصلة لأن يأخذوا كلاً للهادئين

في حبة واحدة من كوفيرام، حبة.

إن البراندوبيل منفتح للخدمة المحمولة المترافق (IEC)، الأداء المترافق، الكفاءة، والمتانة.