

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

O Réclamation	: contact@mupras.com
O Prise en charge	: pec@mupras.com
O Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W21-774739

couvier



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule : *1149*

Société : *R.A.M*

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : *BAN (2020) / TOURETT*

Date de naissance : *24/10/1969*

Adresse : *163 VSOUR ASNI 2 DASSIRAS, DARRAKHET*

Tél. : *06653751056364031*

Total des frais engagés : *1160,108 Dhs*

Cadre réservé au Médecin

Dr Bouchra LALAMI ep. CHERAI
Pneumologue Allergologue
Diplômée de la Faculté de Rulus
55, Bd. Zerktouni Guéliz Marrakech
Tél. 05 24 93 23 20

Date de consultation : *25/10/2023*

Nom et prénom du malade : *BAN (2020) TOURETT* Age : *24/10/1969*

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : *géné Rep + U.L. Té*

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *Marocain* Date : *25/10/2023*

Signature de l'adhérent(e) : *[Signature]*

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/23	CS	200 dl	AFN 400 dl	INP : 391161363 Dr. M. A. ALAM, C.P.A. Diplômé de l'Université de Montréal 55, bd. Zerkalo, 1000, B.C. Tél. : 05 34 34 34

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie Centrale SARL A 6, Bd. Montaigne V - Marrakech Tél.: 0524 41 01 01</i>	25.10.23	560,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

D. LALAMI BOUCHRA

Spécialiste des Maladies du Poumon
 Appareil Respiratoire, Tuberculeuse
 Maladies Allergiques (Asthme)
 Syndrome d'apnées du Sommeil
 Diplômée de Pneumologie à la Faculté
 de Médecine de Reims (France)
 Allergologie à Reims
 Diplômée d'Allergologie Professionnelle à Paris
 Ex-Médecin Attachée du C.H.U de Reims

الدكتورة العلمي بشرى

اختصاصية في أمراض الصدر

الجهاز التنفسى (داء السل)

أمراض الحساسية (الضيقية)

أمراض التنفس أثناء النوم

دبلوم في الجهاز التنفسى ودبلوم في أمراض الحساسية

بكلية رانس (فرنسا)

طبية ملحة سابقا بالمستشفى الجامعي برانس

Marrakech, Le

25/11/93

مراكش، في :

Banquet Yousra

80,10 - Xyggall 11

31,20 - Bronchial 21

194,90 - Bronchotee 11

125,80 - Aspirine tétra (x 1) 50,0 11

10,30 - Difluparac 50,0 11

100,0 - Ketotifen 11

15,30 - vit 10

560,10 - 05 24 43 23 30 - مراكش - الهاتف : 55
 55, Bd. Zerkouni, 1er Etage à droite - Guéliz - Marrakech - Tél : 05 24 43 23 20

الدكتورة العلمي بشرى
 ماركة المطبوعة
 166, Bd. Mohammed V - Marrakech
 Ste. Pharmacie Centrale SARL AU
 Tel. 05 24 43 23 20

LALAMI BOUCHRA
 Allergologue - Pneumologue
 Diplômée de la Faculté de Reims
 55, Bd. Zerkouni Guéliz - Marrakech
 Tél. 05 24 43 23 20

Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents

VITA C 1000®,

VITA C 1000®, S

Veuillez lire a
elle contient
Vous devez t
les informati
pharmacien.
- Gardez cette
- Adressez-vo
- Si vous ress
à votre pha
mentionné da
- Vous devez
amélioration

Vita C 1000®

PPV 15DH30
EXP 01/2026
LOT 32046 3

tubes de 10)
Boîte de 10

re ce médicament car
ant scrupuleusement
e médecins ou votre
élire.
u information.
à votre médecin ou
et indésirable non
e ressentez aucune

Que contient

1. Qu'est-ce que
SUCRE Comprimés
2. Quelles sont les
Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre
SANS SUCRE Comprimés
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000®
SANS SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires

et VITA C 1000® SANS
utilisés ?
prendre VITA C 1000®
SANS SUCRE Comprimés
effervescents ou VITA C 1000®

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01.

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

- Ne prenez Jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

- Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

• VITA C 1000® comprimés effervescents

* Si votre fatigue
s'accompagne
ou de votre ph

* En raison d'u
la vitamine C e

* Prendre en ce
comme les mè
(risque de surdose)

* La vitamine C
d'hémochromatose
fer, adressez-v
l'objet de précise

* La vitamine C
glucose-6-phosphate
rouges), car de
favorisent le r

* La vitamine C
notamment de
médecin si des

• VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents

* Ce médicament
prendre en co
sodium.

* En raison de l
chez les patie
malabsorption
(maladies héréd

* Ce médicament
dont il faut ter
sucré ou de dia

* Ce médicament
peut provoquer

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

* Ce médicament
prendre en co
sodium.

* Ce médicament
L'aspartam con
personnes atte
caractérisée pa

* Ce médicament
peut provoquer

• Enfants « et ad Sans objet.

- Prises d'autre
Informer votre
pourriez prendr
Ce médicament
contiennent. Ne
conseillées.

- Aliments et bo
Prendre en co
enrichis et des c

- Utilisation p
Si vous êtes en
planifiez une gr
de prendre ce m

Grossesse

Par mesure de p
pendant la gros

Allaitement

La vitamine C p
sur les effets de
Il est préférable

KETUM® 2.5%

Veuillez lire attentivement la notice. Elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous la aurez toujours à portée de main.
- Si vous avez d'autres questions, consultez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a-t-il causé des effets indésirables ? Il pourrait lui être nocif, n'oubliez pas de le faire savoir à votre pharmacien.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice n'a pas été mentionné, il peut être nouveau ou inconnu.

1. Qu'est ce que KETUM® 2.5% ?
2. Quelles sont les informations importantes à connaître ?
3. Comment utiliser KETUM® 2.5% ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?



Pharmaceutical Institute
R.S. 2020 OUIMAZZA Région Rabat

PPV : 100 DH 00

prendre ce médicament car elle

ns à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à d'autre personnes, il est destiné aux personnes qui ont des douleurs dentaires auxquelles les médicaments de vente libre ne suffisent pas. Si vous avez des effets indésirables, contactez votre pharmacien.

2.5% gel ?

Doliprane

PARACETAMOL

compr.

COMPOSITION

- Paracétamol
- Excipient

Boîte de 20 comprimés

PROPRIÉTÉS

Ce médicament est un analgésique et un antitussif.

INDICATIONS

Ce médicament est indiqué dans les maladies avec douleur de tête, états grippaux, douleurs dentaires, chez l'adulte et l'enfant à partir de 27 kg.

PPV 100H30
PER 01/26
LOT M171



CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas :

- d'allergie connue au paracétamol
- maladie grave du foie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour les enfants (jusqu'à 8 ans environ).
- Compte-tenu des posologies recommandées d'aspirine et de paracétamol.

Avant de prendre du paracétamol, il est recommandé de consulter un médecin en cas de maladie grave des reins.

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou si les symptômes s'aggravent. Ne pas continuer le traitement sans avis de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, IL FAUT SIGNALER SYMPTÔMES TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN

Ce médicament contient du paracétamol, il ne faut pas le prendre avec d'autres médicaments contenant du paracétamol, car il peut entraîner des dommages aux reins.

GROSSESSE ET
Doliprane 500 mg

POSOLOGIE

Réserve à l'adulte et aux enfants de 12 ans et plus.

Adulte et enfant de 12 ans et plus : La posologie usuelle est de 500 mg à 1000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

Enfant de 6 à 11 ans : La posologie est de 250 mg à 500 mg par jour, en 2 à 3 prises.

Enfant de 3 à 5 ans : La posologie est de 125 mg à 250 mg par jour, en 2 à 3 prises.

Enfant de moins de 3 ans : La posologie est de 62,5 mg à 125 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur modérée : La posologie est de 250 mg à 500 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur importante : La posologie est de 500 mg à 1000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1000 mg à 2000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2000 mg à 4000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4000 mg à 8000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 8000 mg à 16000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 16000 mg à 32000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 32000 mg à 64000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 64000 mg à 128000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 128000 mg à 256000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 256000 mg à 512000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 512000 mg à 1024000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1024000 mg à 2048000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2048000 mg à 4096000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4096000 mg à 8192000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 8192000 mg à 16384000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 16384000 mg à 32768000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 32768000 mg à 65536000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 65536000 mg à 131072000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 131072000 mg à 262144000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 262144000 mg à 524288000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 524288000 mg à 1048576000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1048576000 mg à 2097152000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2097152000 mg à 4194304000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4194304000 mg à 8388608000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 8388608000 mg à 16777216000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 16777216000 mg à 33554432000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 33554432000 mg à 67108864000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 67108864000 mg à 134217728000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 134217728000 mg à 268435456000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 268435456000 mg à 536870912000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 536870912000 mg à 1073741824000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1073741824000 mg à 2147483648000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2147483648000 mg à 4294967296000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4294967296000 mg à 8589934592000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 8589934592000 mg à 17179869184000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 17179869184000 mg à 34359738368000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 34359738368000 mg à 68719476736000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 68719476736000 mg à 137438953472000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 137438953472000 mg à 274877906944000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 274877906944000 mg à 549755813888000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 549755813888000 mg à 1099511627760000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1099511627760000 mg à 2199023255520000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2199023255520000 mg à 4398046511040000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4398046511040000 mg à 8796093022080000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 8796093022080000 mg à 17592186044160000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 17592186044160000 mg à 35184372088320000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 35184372088320000 mg à 70368744176640000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 70368744176640000 mg à 140737488353280000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 140737488353280000 mg à 281474976706560000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 281474976706560000 mg à 562949953413120000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 562949953413120000 mg à 1125899906826240000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1125899906826240000 mg à 2251799813652480000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2251799813652480000 mg à 4503599627304960000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4503599627304960000 mg à 9007199254609920000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 9007199254609920000 mg à 18014398509219840000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 18014398509219840000 mg à 36028797018439680000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 36028797018439680000 mg à 72057594036879360000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 72057594036879360000 mg à 144115188073758720000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 144115188073758720000 mg à 288230376147517440000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 288230376147517440000 mg à 576460752295034880000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 576460752295034880000 mg à 1152921504590069760000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1152921504590069760000 mg à 2305843009180139520000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2305843009180139520000 mg à 4611686018360279040000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4611686018360279040000 mg à 9223372036720558080000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 9223372036720558080000 mg à 18446744073441116160000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 18446744073441116160000 mg à 36893488146882232320000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 36893488146882232320000 mg à 73786976293764464640000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 73786976293764464640000 mg à 147573952587528929280000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 147573952587528929280000 mg à 295147905175057858560000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 295147905175057858560000 mg à 590295810350115717120000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 590295810350115717120000 mg à 1180591620700231434240000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1180591620700231434240000 mg à 2361183241400462868480000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2361183241400462868480000 mg à 4722366482800925736960000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4722366482800925736960000 mg à 9444732965601851473920000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 9444732965601851473920000 mg à 18889465931203702947840000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 18889465931203702947840000 mg à 37778931862407405895680000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 37778931862407405895680000 mg à 75557863724814811791360000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 75557863724814811791360000 mg à 151115727449629623582720000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 151115727449629623582720000 mg à 302231454899259247165440000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 302231454899259247165440000 mg à 604462909798518494330880000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 604462909798518494330880000 mg à 1208925819597036988661760000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1208925819597036988661760000 mg à 2417851639194073977323520000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2417851639194073977323520000 mg à 4835703278388147954647040000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4835703278388147954647040000 mg à 9671406556776295909294080000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 9671406556776295909294080000 mg à 19342813113552591818588160000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 19342813113552591818588160000 mg à 38685626227105183637176320000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 38685626227105183637176320000 mg à 77371252454210367274352640000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 77371252454210367274352640000 mg à 154742504908420734548705280000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 154742504908420734548705280000 mg à 309485009816841469097410560000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 309485009816841469097410560000 mg à 618970019633682938194821120000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 618970019633682938194821120000 mg à 1237940039267365876389642240000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1237940039267365876389642240000 mg à 2475880078534731752779284480000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2475880078534731752779284480000 mg à 4951760157069463505558568960000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 4951760157069463505558568960000 mg à 9903520314138927011117137920000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 9903520314138927011117137920000 mg à 19807040628277854022234275840000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 19807040628277854022234275840000 mg à 39614081256555708044468551680000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 39614081256555708044468551680000 mg à 79228162513111416088937103360000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 79228162513111416088937103360000 mg à 158456325226222832177874206720000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 158456325226222832177874206720000 mg à 316912650452445664355748413440000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 316912650452445664355748413440000 mg à 633825300904891328711496826880000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 633825300904891328711496826880000 mg à 1267650601809782657422993653760000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1267650601809782657422993653760000 mg à 2535301203619565314845987307520000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2535301203619565314845987307520000 mg à 5070602407239130629691974615040000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 5070602407239130629691974615040000 mg à 1014120481447826125938394923080000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 1014120481447826125938394923080000 mg à 2028240962895652251876789846160000 mg par jour, en 2 à 3 prises.

En cas de douleur très importante : La posologie est de 2028240962895652251876789846160000 mg à 4056481925791304503753579692320000 mg par

481 885195


**Suspensi
en serin**
**Vaccin
(inacti
Saison**
VaxigripTetra®

120640V8MGWV0

NS



07-2024

X3F573M

01082023

03661798003390

P/UTG

MADE

LOT

EXP

**iner, vous ou
ur vous.**
e pharmacien ou
à votre enfant. Ne
table, parlez-en à
s'applique aussi à
ce. Voir rubrique 4.
Un événissement
toute injection ave
ère si vous ou votr
Comme pour tou
les personnes vac
Les enfants âgés
grossesse peuvent
Si, pour quelque
dans les quelques
En effet, des résu
patients qui avaie
Enfants
L'utilisation de Va
de 6 mois.
Autres médicame
Informez, votre m
récemment pris ou
• VaxigripTetra p
des membres de
La réponse à
immunosuppre
ou la radiothé
Grossesse et allai
Si vous êtes ence
conseil à votre m
VaxigripTetra peut
VaxigripTetra peut
Votre médecin/pha
VaxigripTetra.
Conduite de véh
VaxigripTetra n'a
véhicules et à utili
VaxigripTetra co
Ce médicament co
de sodium (23 mg)
et « sans sodium »

2. Quelles sont

Pour être certain
est important d'in
dessous vous con
comprenez pas, de

N'utilisez jamais

- Si vous ou votre
- aux substanc
- à l'un des au
- à tout const
œufs (ovalbu
l'octoxinol-9, 1
- Si vous ou votre
ou une maladi

Avertissements e

Adressez-vous à vo
VaxigripTetra.

Avant la vaccination

- souffrez d'une
médicaments a
- souffrez de trou

Votre médecin déci

Un événissement

toute injection ave

ère si vous ou votr

Comme pour tou

les personnes vac

Les enfants âgés

grossesse peuvent

Si, pour quelque

dans les quelques

En effet, des résu

patients qui avaie

Enfants

L'utilisation de Va

de 6 mois.

Autres médicame

Informez, votre m

récemment pris ou

• VaxigripTetra p

des membres de

La réponse à

immunosuppre

ou la radiothé

Grossesse et allai

Si vous êtes ence

conseil à votre m

VaxigripTetra peut

VaxigripTetra peut

Votre médecin/pha

VaxigripTetra.

Conduite de véh

VaxigripTetra n'a

véhicules et à utili

VaxigripTetra co

Ce médicament co

de sodium (23 mg)

et « sans sodium »

Veuillez lire attentivement c otre enfant, car elle contie

- Gardez cette notice. Vous p
- Si vous avez d'autres ques
otre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été
le donnez pas à d'autres p
- Si vous ou votre enfant i
otre médecin, votre pha
tout effet indésirable qui

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra
2. Quelles sont les informati
3. Comment utiliser Vaxigri
4. Quels sont les effets indé
5. Comment conserver Vax
6. Contenu de l'emballage

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra

VaxigripTetra est un vaccin
enfant à partir de l'âge de 6
de la grippe.

Lorsqu'une personne reço
défense naturelle de l'organisme) développe sa propre protection (anticorps) contre la maladie. Lorsqu'il est administré au cours de la grossesse, le vaccin aide à protéger la femme enceinte mais aide aussi à protéger son (ses) enfant(s), à partir de la naissance jusqu'à près de 6 mois d'âge grâce à la transmission de la protection de la mère à l'enfant pendant la grossesse (voir également les rubriques 2 et 3). Aucun des composants du vaccin ne peut causer la grippe.

VaxigripTetra doit être utilisé selon les recommandations officielles.

La grippe est une maladie qui peut se propager rapidement et qui est causée par différentes souches qui peuvent changer tous les ans. En raison du changement potentiel des souches circulant chaque année et de la durée de protection prévue du vaccin, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans. Le plus grand risque de contracter la grippe se situe pendant les mois les plus froids, entre octobre et mars. Si vous ou votre enfant n'avez pas été vacciné durant l'automne, il est encore possible de l'être jusqu'au printemps car vous ou votre enfant courrez le risque de contracter la grippe jusqu'à cette période. Votre médecin pourra vous recommander le meilleur moment pour vous faire vacciner.

VaxigripTetra est destiné à vous protéger, ou à protéger votre enfant, contre les quatre souches de virus contenues dans le vaccin, environ 2 à 3 semaines après l'injection. De plus, si vous ou votre enfant êtes exposé tout de suite avant ou après la vaccination, vous ou votre enfant pouvez encore déclarer la maladie, la période d'incubation de la grippe étant de quelques jours.

Le vaccin ne vous protégera pas, vous ou votre enfant, des rhumes, même si certains des symptômes ressemblent à ceux de la grippe.

NOTICE

1. Dénomination du médicament :

BRONCOTEC 12 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule en boîte de 60.

DCI : Fumoterol

حفظ بعيداً عن متناول الأطفال

يجب قراءة هذه النشرة قبل الاستعمال.

PPV : 197 DH 90

Médicament autorisé N° 163/16 DMP/21/NRQ

Ité de cette notice
Gardez cette notice.

Si vous avez un doute,
votre médecin ou à votre

ent prescrit. Ne le
même en cas de
nocif.

grave ou si vous
onné dans cette
pharmacien.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترم المقادير الموصولة

Uniquement sur ordonnance (Liste I)

يصرف فقط بموجب وصفة طبية - لانحة 1

substance active par
umarate de formoterol :

49x92x82

close.

CB1260-1019

à ou le type d'activité :
scepteurs par voie inhalée.
(R: Système Respiratoire).

4. Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un bêta-2-mimétique. C'est un bronchodilatateur (il augmente le calibre des bronches) à action de longue durée qui s'administre par voie inhalée.

- Il est préconisé en traitement de fond continu de l'asthme, en association avec un traitement anti-inflammatoire (corticoïde par voie inhalée). Le traitement anti-inflammatoire associé ne doit pas être interrompu sans avis médical, même en cas d'amélioration très nette des symptômes.

Ce médicament n'est pas le traitement de la crise d'asthme

- Il peut également vous être prescrit en traitement préventif de l'asthme déclenché par l'effort.
- BRONCOTEC peut également être utilisé pour soulager les symptômes respiratoires (essoufflement, toux, sifflements) des patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) nécessitant un traitement de longue durée par bronchodilatateurs.

FLUIDIFIANT des voies respiratoires



ADULTE

prendre ce médicament.
ndez plus d'informations à
onnez jamais à quelqu'un
ez un effet indésirable non
tre pharmacien.

LOT M1830
PER 05/26
FVA 210H20

rouge cochenille A,
inzoate de propyle,
e, hypoglucidique
100 ml

sodium, rouge cochenille A.

Carboacétine 5%

BRONCHATHIOL®

sur évacuation par la toux.

s d'affections respiratoires
s crachant les sécrétions

Pour les enfants de moins de 15 ans : utiliser BRONCHATHIOL® Enfant.

- À prendre de préférence en dehors des repas.

- La durée de traitement doit être brève et ne pas excéder 5 jours.

CONTRE-INDICATIONS

La forme adulte est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 15 ans.

EFFETS INDESIRABLES

A fortes doses, on peut parfois constater l'apparition de phénomènes digestifs : gastralgies, nausées, diarrhées.

Mises en garde spéciales et Précautions d'emploi :

Faites attention avec BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

À prendre de préférence en dehors des repas.

La durée de traitement doit être brève et ne pas excéder 5 jours.

Les toux productives, qui représentent un élément fondamental de la défense broncho-pulmonaire, sont à respecter.

L'association de mucocomodificateurs bronchiques avec des antitussifs et/ou des substances asséchant les sécrétions (atropiniques) est irrationnelle.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Ce médicament contient un agent azoïque le rouge cochenille A (E124) et peut provoquer des réactions allergiques.

Précautions d'emploi

La prudence est recommandée chez les sujets atteints d'ulcères gastroduodénaux.
PRÉNEZ L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez,

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien

- Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
- Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

- Il est possible d'allaiter votre enfant en cas de traitement par ce médicament.

- Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage accidentel, ARRÉTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN

- COMMENT CONSERVER BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Date de péremption

Ne pas utiliser BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

- Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

BRONCHATHIOL®

Carboacétine 5%



Fabriqué par bottu s.a.
Sous licence MELISANA PHARMA
82, Allée des Casuarinas - Ain Séba - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

Imp AJDR
06/19 - 101012

Notice : Informations de l'utilisateur



XYZALL® 5 mg, comprimé pelliculé

Dichlorhydrate de lévocétirizine

Boîtes de 14 ou de 28

Adultes et enfants à partir de 6 ans

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez
- Si vous
- Ce mé
- d'autres p
- sont ident
- Si vous
- ou votre p
- pas menti

Que conti

1. Qu'est-c
2. Quelles
- comprimé
3. Commer
4. Quels so
5. Commer
6. Contenu

1. QU'EST- CAS EST-IL

Classe phan
de la pipéraz
Le dichlorhy

XYZALL est un médicament utilisé dans le traitement de l'allergie.

XYZALL est indiqué pour le traitement des symptômes associés à :

- la rhinite allergique (incluant la rhinite allergique persistante) ;
- des démangeaisons et rougeurs (urticaire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au dichlorhydrate de lévocétirizine, à la cétirizine, à l'hydroxyzine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre XYZALL.

Si vous êtes susceptible de ne pas pouvoir vider votre vessie (en raison d'une lésion de la moelle épinière ou d'une augmentation du volume de la prostate), veuillez demander conseil à votre médecin.

Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous présentez des risques de convulsions, demandez conseil à votre médecin, l'utilisation de XYZALL peut provoquer une aggravation des crises.

Si vous avez prévu de faire des tests d'allergie, demandez à votre médecin si vous devez arrêter de prendre XYZALL pendant plusieurs jours avant le test. Ce médicament peut affecter les résultats de vos tests d'allergie.

Enfants
XYZAL
la forme
Autres

Informa
pris ou
XYZAL
l'alcool

La prud
agissan
Chez le
le cerv

importa
XYZAL

Grosse

Si vous

planifie

Condui

Certain

ment, f

conduir

réagiss

mis en

capacit

XYZAL

L'utilisa

intoléra

malabs

3. COM

Veillez à

de votr

pharma

La dos

compr

Utilisa

Insuffis

Chez le

adapté

Chez le

la dose

Les pa

XYZAL

Les pa

le médi

Chez le

hépatiq

la gravit

Chez le

la dose

Patients

Il n'y a

normale

Utilisa

XYZAL

Comme

Voie ora

Le com

28 comprimés pelliculés

Dichlorhydrate de Lévocétirizine

XYZALL 5 mg

LOT 230023 2

EXP 12 2026

PPV 80 10

quel cas est-il utilisé ?
prendre XYZALL 5 mg.

ET DANS QUELS

systémique, dérivés

substance active de XYZALL.

Cabinet D'allergologie et de Pneumologie

DOCTEUR LALAMI BOUCHRA

Spécialiste des Maladies du Poumon
Appareil Respiratoire, Tuberculose
Maladies Allergiques (Asthme)
Syndrome d'apnées du Sommeil
Diplômée de Pneumologie à la Faculté
de Médecine de Reims (France)
Allergologie à Reims
Diplômée d'Allergologie Professionnelle à Paris
Ex-Médecin Attachée du C.H.U de Reims

الدكتورة العلمي بشرى

اختصاصية في أمراض الصدر

الجهاز التنفسى (داء الأنف)

أمراض الحساسية (الضيقية)

أمراض التنفس أثناء النوم

دبلوم في الجهاز التنفسى ودبلوم في أمراض الحساسية

بكلية رانس (فرنسا)

طبيبة ملحقة سابقاً بالمستشفى الجامعي برايس

Marrakech, Le : 25/10/23 مراكش، في :

facture / 8 000 dh
F.H 000 dh

Dr Bouchra LALAMI EP. CHERAI
Pneumologue Allergologue
Diplômée de la Faculté de Reims
55, Bd. Zerkouni Guéliz Marrakech
Tél: 05 24 43 23 20

05 24 43 23 30 ، شارع الزرقطوني الطابق الأول على اليمين جليز - مراكش - الهاتف :
55, Bd. Zerkouni, 1er Etage à droite - Guéliz - Marrakech - Tél : 05 24 43 23 20

Cabinet d'Allergologie et de Pneumologie

Dr LALAMI BOUCHRA
55, Bd Zerkouni, Entrée C, 1er étage à droite Guéliz
TEL. 0524 43 23 20 / GSM. 06 61 08 42 45


BANQOUR, TOURIA

ID-Nr: 000000004809

Remarques:

162 cm, 68 kg, fém. *24.10.1949 =74ans
mesuré le 25.10.2023 à 09:17 h

Courbe Débit-Volume



Paramètre	Valeur	%Théor.	Théor.	Unité
CVF	2.47	105	2.36	l
VEMS	2.01	103	1.95	l
VEMS/CV			75	%
VEMS/CVF	81	108	75	%
DEP	6.98	125	5.58	l/s
DEM75	6.52	131	4.97	l/s
DEM50	2.29	70	3.28	l/s
DEM25	0.72	75	0.96	l/s
DEMM25-75	1.90	78	2.43	l/s

Commentaires:

©2006 ZAN® Meßgeräte GmbH R.F.A. Tel: +49 9736 8181-0

Mesure
réalisée à: 25.10.2023/09:17
BTPS 25/1013/20 [°C/mbar/%]

✓ VER ✓
VER SO %
Bouchra LALAMI sp. Chirurg.
pneumologue. Allergologue
diplômée de la Faculté de Reims
55, Bd Zerkouni Guéliz, Marakech
05 24 43 23 20

et D'allergologie et de Pneumologie

CHRA

Le Poumon

Tuberculose

et l'Asthme

et du Sommeil

Pneumologie à la Faculté

de Reims (France)

Pneumologie à Reims

Diplômée de l'Institut Professionnel à Paris

Ex-Médecin Attachée du C.H.U de Reims

الدكتورة العلمي بشرى

اختصاصية في أمراض الصدر

الجهاز التنفسى (داء السل)

أمراض الحساسية (الضيق)

أمراض التنفس أثناء النوم

دبلوم في الجهاز التنفسى ودبلوم في أمراض الحساسية

بكلية رانس (فرنسا)

طبيبة ملحقة سابقاً بالمستشفى الجامعي برانس

Marrakech, Le : مراكش، في :