

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 34212 Société : A87038  
 Actif  Pensionné(e)  Autre :  
 Nom & Prénom : TARGA Soumisa  
 Date de naissance : 25.08.66  
 Adresse : 388 lot ALAYOUNE CASA  
 Tél. : 06.61.11.3802 Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin


Cachet du médecin :   
 Dr. **Najib BERRADA**  
 SPECIALISTE  
 GYNECOLOGIE - ACCOUCHEMENT  
 Angle Rue d'Alger et  
 2, Rue Abou Bakr Al Bakri  
 Tél. : 022 47 12 97 / 98 - CASABLANCA

Date de consultation : 03/10/2023  
 Nom et prénom du malade : TARGA Soumisa  
 Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant  
 Nature de la maladie : Affection gynécologique  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le ...../...../2023

Signature de l'adhérent(e) : 



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/10/23	N		200,00	Dr. N. D. C. GYNÉCOLOGISTE d'Angleterre 8, Rue Aboud Kader Al Bahrani CASABLANCA 37198

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 KAIMOUNI Alhymouni Lise Tél: 05 32 30 29 32 Fax: 05 32 30 29 33	03/10/2003	162,10

#### ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
03/10/23	03/10/23	300,00	300,00
03/10/23	03/10/23	400,00	400,00
24/10/23	Am + Ra	900,-	900,-

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	21433552 00000000		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	D 00000000	00000000		MONTANTS DES SOINS
	B 35533411	11433553		DATE DU DEVIS
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

Docteur Najib BERRADA

Gynécologue - Obstétricien

الدكتور نجيب براة

اختصاصي

أمراض النساء والتوليد - جراحة النساء والثدي  
الجراحة بالمنظار الداخلي - عقم الزوجين  
المساعدة الطبية على الإنجاب - الفحص بالصدى

03/10/2023

MME TARGA SOUMIA

98,00

1. BLISSEL 50µG GEL TRAITEMENT INITIAL

1 dose / jour, le soir, 10 JOURS  
19,50 x 9

2. UVEDOSE 100 000UI

1 Ampoule / mois, 2 MOIS  
25,10

3. FUMAFER 200

1 cp x jour, 1 MOIS



169,10

N. Réf. 10/10/2023

Dr. Najib BERRADA  
SPECIALISTE  
GYNECOLOGIE ACCOUCHEMENT  
Ans 3 Rue d'Alger et  
2. Rue Abou Bakr Al Baklani  
Tél 47.12.97.198 CASABLANCA

زاوية زنقة الجزائر و2، زنقة أبي بكر البقلاني الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 47 12 97 / 98  
Angle Rue d'Alger et 2, Rue Abou Bakr Al Baklani Casablanca - Tél : 05 22 47 12 97 / 98

# Blissel® 50 µg/g, Gel vaginal

## D-C1: ESTRIOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Sommaire :

1. Qu'est-ce que BLISSEL et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
3. Comment utiliser BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver BLISSEL 50 microgrammes/g, gel vaginal
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE BLISSEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

#### Classe pharmacothérapeutique :

Blissel appartient à un groupe de médicaments appelés traitement hormonal substitutif (THS) vaginal (local).

Il est utilisé pour soulager les symptômes de la ménopause au niveau du vagin, comme la sécheresse ou l'irritation. En termes médicaux, on parle d'atrophie vaginale. Elle est causée par une baisse du taux d'œstrogènes dans l'organisme. Ce phénomène se produit naturellement après la ménopause.

Blissel fonctionne en remplaçant les œstrogènes qui sont normalement produits par les ovaires des femmes. Il est inséré dans votre vagin, de sorte que l'hormone est libérée là où elle est nécessaire. Cela peut soulager l'inconfort dans le vagin.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT D'UTILISER BLISSEL

#### Antécédents médicaux et contrôles réguliers.

L'utilisation d'un THS (Traitement Substitutif Hormonal) entraîne des risques qui doivent être considérés avant de commencer ou de poursuivre ce type de traitement.

Avant de commencer la TSH, votre médecin doit vous poser des questions sur votre histoire médicale personnelle et familiale. Il peut aussi décider de procéder à un examen physique. Celui-ci peut inclure un examen de vos seins et/ou un examen interne, si nécessaire.

Une fois la thérapie substitutive hormonale commencée, consultez régulièrement votre médecin (au moins une fois par an).

Pendant ces contrôles, votre médecin pourra discuter avec vous sur les bénéfices et les risques liés à la continuation de la thérapie hormonale substitutive.

Faites un dépistage régulier du cancer du sein, comme le recommande votre médecin.

#### N'utilisez pas Blissel

Si l'un des points suivants s'applique à vous. Si vous n'êtes pas sûr de l'un des points ci-dessous, parlez-en à votre médecin avant de prendre Blissel.

• Si vous avez, si vous avez eu ou si vous suspectez avoir une **tumeur du sein** ;

• Si vous avez ou vous suspectez avoir une **tumeur sensible aux œstrogènes**, comme la tumeur du revêtement de l'utérus (endomètre) ;

• Si vous avez un **saignement vaginal imprévisible** ;

• Si vous avez un **épaississement excessif revêtant le utérus** (hyperplasie endométriale) et cancer de la paroi de l'utérus (cancer de l'endomètre).

La prise de comprimés de THS à base d'œstrogènes uniquement pendant une longue période peut augmenter le risque de développer un cancer de la muqueuse utérine (l'endomètre).

Il n'est pas certain qu'il existe un risque similaire lorsque Blissel est utilisé pour des traitements répétés ou de longue durée (plus d'un an). Cependant, il a été démontré que Blissel a une très faible absorption dans le sang, l'ajout d'un progestatif n'est pas nécessaire.

Si vous avez des saignements ou des pertes de sang, il n'y a habituellement pas lieu de s'inquiéter, mais vous devriez prendre rendez-vous avec votre médecin.

Si vous avez ou si vous avez eu récemment des maladies causées par des coagulations des artères, comme une **attaque cardiaque**, un **ictus** ou une **angine de poitrine** ;

• Si vous avez eu dans le passé une **maladie hépatique** et votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ;

• Si vous avez une maladie rare du sang d'une maladie héréditaire) ;

• Si vous êtes **allergique** (hypersensible) à l'un des autres composants de ce médicament (v. Si n'importe laquelle de ces conditions apparaissent pendant que vous prenez Blissel, interrompez la consultation avec votre médecin).

#### Avertissement et précautions

Ce médicament est administré par insertion vaginale. Cela peut causer une gêne ou une irritation ou une atrophie vaginale sévère (amincissement vaginale).

Veuillez informer votre médecin si vous avez des troubles/maladies suivant(s) qui, dans de rares cas, peuvent s'aggraver lors d'un traitement avec BLISSEL. Si tel est le cas, vous devez consulter votre médecin contrôles :

- Un taux très élevé de graisses dans le sang (triglycérides)
- Croissance de la muqueuse utérine à l'extérieur de l'utérus ou antécédents de croissance excessive de la muqueuse utérine (hyperplasie endométriale) ;

- Fibromes dans l'utérus ;
- Tension artérielle élevée ;

- Diabète ;
- Calculs biliaires ;

- Migraine ou forts maux de tête ;
- Maladie rare du système immunitaire appelée lupus érythémateux disséminé (LED) ;

- Epilepsie (crises) ;
- Asthme ;

- Une maladie affectant le tympan et l'audition (otosclérose) ;
- Rétention d'eau due à des problèmes cardiaques ou rénaux ;

- Risque accru de développer des caillots sanguins (voir "Caillots sanguins dans une veine (thrombose)") ;
- Un risque accru de développer un cancer sensible aux œstrogènes (comme avoir une mère, une sœur ou une grand-mère qui a eu un cancer du sein) ;

- Un trouble du foie, tel qu'une tumeur bénigne du foie ;
- Angiodéme héréditaire et acquis.

#### Contactez immédiatement votre médecin si vous avez :

- Ictère (yeux et peau peuvent devenir jaunes) ou problèmes de la fonction hépatique,
- augmentation soudaine de la tension artérielle,
- apparition de migraines ou de forts maux de tête pour la première fois,
- vous tombez enceinte,
- apparition d'un trouble mentionné dans la partie « N'utilisez pas Blissel ».

- Si vous remarquez des signes d'un caillot sanguin, tels que :
  - Un gonflement douloureux et une rougeur des jambes ;
  - Une douleur soudaine à la poitrine ; difficulté à respirer ;

Pour plus d'informations, voir "Caillots de sang dans une veine (thrombose)". Dans les cas ci-dessus, votre médecin pourra décider d'arrêter le traitement et de vous indiquer une alternative.

Remarque : BLISSEL n'est pas un contraceptif. Si l'il s'est écoulé moins 12 mois depuis vos dernières règles, ou si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez avoir besoin d'une contraception complémentaire pour éviter une grossesse. Demandez conseil à votre médecin.

#### THS et cancer

**Développement exacerbé de la muqueuse utérine (hyperplasie endométriale) et cancer de la paroi de l'utérus (cancer de l'endomètre).** La prise de comprimés de THS à base d'œstrogènes uniquement pendant une longue période peut augmenter le risque de développer un cancer de la muqueuse utérine (l'endomètre).

Il n'est pas certain qu'il existe un risque similaire lorsque Blissel est utilisé pour des traitements répétés ou de longue durée (plus d'un an). Cependant, il a été démontré que Blissel a une très faible absorption dans le sang, l'ajout d'un progestatif n'est pas nécessaire.

Si vous avez des saignements ou des pertes de sang, il n'y a habituellement pas lieu de s'inquiéter, mais vous devriez prendre rendez-vous avec votre médecin.

Si vous avez des saignements ou des pertes de sang, il n'y a habituellement pas lieu de s'inquiéter, mais vous devriez prendre rendez-vous avec votre médecin. Cela pourrait être le signe que votre endomètre s'est épaisse.

Les risques ci-après s'appliquent à l'hormonal substitutif (THS) qui circule généralement local au niveau de la peau.

**Tableau II** Il est préférable de consulter un médecin si vous avez des symptômes ou des réactions indésirables avec des doses élevées dans le sang (comme l'anomalie de la muqueuse utérine). Les certains types de caillots sanguins peuvent également causer des symptômes, comme l'augmentation de la pression dans les veines.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.


Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.

Les symptômes suivants sont également possibles : les risques de cancer du sein peuvent être augmentés par le THS. Par ailleurs, il existe un risque de cancer de l'ovaire avec l'utilisation d'un THS. Par conséquent, il est recommandé de faire un dépistage régulier chez les femmes qui utilisent un THS.


#### Les instructions suivantes indiquent comment utiliser le gel.

L'image ci-dessous montre les différents éléments du tube et de l'applicateur (piston et canule).



1 Retirez le bouchon du tube, retournez-le et percez l'opercule à l'aide de la pointe située à l'arrière du bouchon.

Ne pas utiliser si l'opercule est cassé.



2 Prenez une canule ainsi que le piston. Insérez le piston blanc à l'intérieur de la canule. Attachez la canule sur le goulot du tube.

# FUMAFER® 66mg, boîte de 100 comprimés

## Fumarate ferreux

### Pour les médicaments non soumis à prescription médical :

<Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Il contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après (nombre de jours).

1- Que contient cette notice :

- 2- Qu'est-ce que FUMAFER, comprimé et dans quel cas est-il utilisé?
- 3- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FUMAFER, comprimé?
- 4- Comment utiliser FUMAFER, comprimé?
- 5- Quels sont les effets indésirables éventuels?
- 6- Comment conserver FUMAFER, comprimé?
- 7- Informations Supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE FUMAFER COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antianémique, fumarate de fer par voie orale (code ATC : B03AA02 ; B : sang et organes hématopoïétiques).

#### Indications thérapeutiques :

- Anémie par carence martiale.
- Traitement préventif de la carence martiale de la femme enceinte.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FUMAFER, comprimé ?

#### Liste des informations nécessaires à connaître avant la prise du médicament

##### Contre indication :

##### Ne prenez jamais Fumafer, comprimé dans les cas suivants :

- Surcharge martiale, en particulier anémie normo ou hypersidérémique telle que thalassémie, anémie réfractaire, anémie par insuffisance médullaire.
- Allergie à la substance active ou à l'un des composants.

##### Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Fumafer, comprimé, EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

##### Mise en garde :

- L'hyposidérémie associée aux syndromes inflammatoires n'est pas sensible au traitement martial.
- Le traitement martial doit, dans la mesure du possible, être associé au traitement étiologique.

##### Précautions d'emploi :

- La prévention de la carence martiale du nourrisson repose sur l'introduction précoce d'une alimentation diversifiée.
- La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer.
- Un contrôle de l'efficacité est utile après 3 mois de traitement : il doit porter sur la correction de l'anémie (Hb, VGM) et sur la restauration des stocks de fer (fer sérique et saturation de la sidérophilin).

##### Interactions avec d'autres médicaments :

Nécessitant des précautions d'emploi :

- Cyclines (voie orale) : diminution de l'absorption complexe. Prendre les sels de fer à distance.
- Diphosphonates (voie orale) : diminution de l'absorption. Prendre les sels de fer à distance des diphosphonates.
- Fluoroquinolones : diminution de la bioavailability et par un effet non spécifique sur l'absorption.

Prendre les sels de fer à distance des fluoroquinolones.

• Antibiotiques : diminution de l'absorption.

• Antibiotiques à pénicillamine : diminution de l'absorption.

• Oxydes de magnésium : diminution de l'absorption.

• Antacides : diminution de l'absorption.

• Fer à distance de l'absorption.

• Antacides : diminution de l'absorption.

• Fer à distance de l'absorption.

# Uvédose 100 000 U.I.

Solution buvable en ampoule

Cholécalciférol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, il s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ?
3. Comment prendre UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A11CC05  
Vitamine D.

Ce médicament est indiqué dans le traitement et/ou la prophylaxie de la carence en vitamine D.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ?

Ne prenez jamais UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez un excès de calcium dans le sang ou les urines, ou des calculs rénaux.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Avertisements et précautions

### Mises en garde

Afin d'éviter tout surdosage, tenir compte des doses totales de vitamine D en cas d'association avec un traitement contenant déjà cette vitamine ou en cas d'utilisation de lait supplémenté en vitamine D.

**Maphar**  
Bd Aïkizia N° 6. QI.  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
UVEDOSE 100 000 UI/2 ml  
SOL BUV

P.P.V : 19,50 DH

 5 113001 185030

En cas d'admini  
vitamine D, il est  
dans le sang et les

### Précautions particulières d'emploi

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Autres médicaments et UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

### Grossesse et allaitement

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement. Toutefois, cette supplémentation ne remplace pas l'administration de vitamine D chez le nouveau-né. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

## 3. COMMENT PRENDRE UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ?

### Posologie

#### Carence vitaminique chez l'enfant :

##### Prévention du rachitisme

La mise en œuvre est impérative chez tous les nourrissons et les jeunes enfants, dans les conditions actuelles de vie en raison de :

- l'exposition insuffisante au soleil,
- la faible teneur des aliments en vitamine D.

Une ampoule tous les trois mois jusqu'à la 5ème année. Cette dose peut être doublée si l'enfant est peu exposé au soleil ou si sa peau est très pigmentée.

Ne pas dépasser 10 à 15 mg par an (soit 4 à 6 ampoules par an).



# Uvédose 100 000 U.I.

Solution buvable en ampoule

Cholécalciférol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, il s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que **UVEDOSE 100 000 UI**, solution buvable en ampoule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **UVEDOSE 100 000 UI**, solution buvable en ampoule ?
3. Comment prendre **UVEDOSE 100 000 UI**, solution buvable en ampoule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **UVEDOSE 100 000 UI**, solution buvable en ampoule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A11CC05  
Vitamine D.

Ce médicament est indiqué dans le traitement et/ou la prophylaxie de la carence en vitamine D.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ?

Ne prenez jamais **UVEDOSE 100 000 UI**, solution buvable en ampoule :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez un excès de calcium dans le sang ou les urines, ou des calculs rénaux.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Avertisements et précautions

### Mises en garde

Afin d'éviter tout surdosage, tenir compte des doses totales de vitamine D en cas d'association avec un traitement contenant déjà cette vitamine ou en cas d'utilisation de lait supplémenté en vitamine D.

**Maphar**  
Bd Aïkizia N° 6. QI.  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
UVEDOSE 100 000 UI/2 ml  
SOL BUV  
P.P.V : 19,50 DH

5 113001 185030

En cas d'admini  
vitamine D, il est  
dans le sang et les

### Précautions particulières d'emploi

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Autres médicaments et UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

### Grossesse et allaitement

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement. Toutefois, cette supplémentation ne remplace pas l'administration de vitamine D chez le nouveau-né. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

## 3. COMMENT PRENDRE UVEDOSE 100 000 UI, solution buvable en ampoule ?

### Posologie

#### Carence vitaminique chez l'enfant :

##### Prévention du rachitisme

La mise en œuvre est impérative chez tous les nourrissons et les jeunes enfants, dans les conditions actuelles de vie en raison de :

- l'exposition insuffisante au soleil,
- la faible teneur des aliments en vitamine D.

Une ampoule tous les trois mois jusqu'à la 5ème année. Cette dose peut être doublée si l'enfant est peu exposé au soleil ou si sa peau est très pigmentée.

Ne pas dépasser 10 à 15 mg par an (soit 4 à 6 ampoules par an).



**Docteur Najib BERRADA**  
**Gynécologue - Obstétricien**

Chirurgie gynécologique - Accouchement  
Stérilité du couple (P.M.A)  
Cœliochirurgie - Colposcopie - Hystéroskopie  
Maladies du sein - Echographie 3 - 4D

**الدكتور نجيب برادة**

**اختصاصي**

أمراض النساء والتوليد - جراحة النساء والثدي  
الجراحة بالمنظار الداخلي - عقم الزوجين  
المساعدة الطبية على الإنجاب - الفحص بالصدى

03/10/2023


**MME TARGA SOUMIA**

57 ans IIP Sans ATCD Ex RAS Mastodynne

- MAMMO-TOMOSYNTHÈSE

± éch. ?

N. Béchir AMRAI



Date de l'examen : ..... 24.10.2023.....

NOM: ..... TARGA SOUTIA .....

Date de naissance ou Age : ..... 57 ANS .....

Médecin traitant : .....

Date des dernières règles : ..... / .....

Nbre d'enfants : ..... 2 .....

Ménopause :      Oui            Non     

Traitements hormonaux (traitement de la ménopause)   Oui  ... .....

ATCD personnel du maladie du sein : ..... RAS .....

ATCD FM de cancer du sein : Non       Oui

Degré de parentés : .....

Mammographie antérieure : non  oui  date : .....

### **Réserve aux médecins**

Clinique :      Nodule       Autre :

                  Mastodynies

                  Ecoulement

Mammo remarque .....

.....

Fin du traitement ..... / / .....

Dr. Houriya AMRANI MIKOU  
Dr. Naïma BENJELLOUN DEBBAGH  
Dr. Wafae MSEFER FAROUQI  
Dr. Yasmina TAHIRI ZIATI  
Dr. Abderrahim ADIL

Mammographie Numérisée / Tomosynthèse - Sénologie Interventionnelle -  
Echographie / Doppler Couleur - Ostéodensitométrie  
Radiologie Conventionnelle - Radiologie Interventionnelle - Rachis Entier - Gonométrie  
I.R.M. 1.5 Tesla - Scanner Spiralé - Dentascanner

Casablanca, le 24/10/2023

FACTURE N° : FA:00 10089/23  
Nom : TARGA SOUMIA

Arrêtée la présente facture à la somme de : 900,00 Dhs

**NEUF CENTS DHS**

Pour le(s) examen(s) suivant(e) :

MAMMO-TOMOSYNTHÈSE	600,00 Dhs
ECHOGRAPHIE MAMMAIRE	300,00 Dhs

Total de 900,00 Dhs

Mode de règlement ESPECES

ATTIJARI WAFABANK /007780000357900000015342

INPE : 090000324

Centre de Radiodiagnostic  
Roudani - Maârif  
400, Bd Brahim Roudani - Casablanca  
Tél: 0522 25 22 96 / 0522 25 13 02 / 0522 25 13 04 / 0522 25 13 07 - Fax : 0522 23 50 68  
e-mail: r.roudani@hotmail.com

CENTRE DE RADIODIAGNOSTIC ROUDANI, S.A.R.L. au capital de 2.300.000 DH

400, Bd Brahim Roudani 1<sup>er</sup> étage - Maârif, 20100 Casablanca - E-mail : roudani.crr@gmail.com / www.crr.ma  
Tél.: 0522 23 50 70 / 06 60 73 95 97 / 0522 25 22 96 / 0522 25 13 02 / 0522 25 13 04 / 0522 25 13 07 - Fax : 0522 23 50 68  
RC : 500035 - CNSS : 2097443 - TP : 35700736 - IF : 01000601 - ICE : 001719187000040

**Docteur Najib BERRADA**  
**Gynécologue - Obstétricien**

Chirurgie gynécologique - Accouchement  
Stérilité du couple (P.M.A)  
Cœliochirurgie - Colposcopie - Hystéroscopie  
Maladies du sein - Echographie 3 - 4D

**الدكتور نجيب برادة**

**اختصاصي**

أمراض النساء والتوليد - جراحة النساء والثدي  
الجراحة بالمنظار الداخلي - عقم الزوجين  
المساعدة الطبية على الإنجاب - الفحص بالصدى

## RESULTAT ECHOGRAPHIQUE

Nom et Prénom: Soumia Targa

Renseignements cliniques : Algies pelviennes

Compte rendu échographique :

Utérus de taille normale

De contours réguliers

Ligne de vacuité vue.

D'échostructure homogène.

Annexes : RAS

## CONCLUSION

Echographie pelvienne normale

Casablanca le 03/10/23

N. BERRADA  
Dr. Najib BERRADA  
Gynécologue - Accouchement

Docteur Najib BERRADA

Gynécologue - Obstétricien

الدكتور نجيب برادة

اختصاصي

أمراض النساء والتوليد - جراحة النساء والثدي

المرأة بالمنظار الداخلي - غم الزوجين


المساعدة الطبية على الإنجاب - الفحص بالصدى

03/10/23

Mme: Targa Soumnia

Reçu la somme de 300 DH pour  
scho pélvien et 400 DH pour

Maman



# Docteur Najib BERRADA

Gynécologue - Obstétricien

Chirurgie gynécologique - Accouchement

Stérilité du couple (P.M.A)

Cœliochirurgie - Colposcopie - Hystéroscopie

Maladies du sein - Echographie 3 - 4D

الدكتور نجيب براة

الختصاصي

أمراض النساء والتوليد - جراحة النساء والثدي

جراحة بالمنظار الداخلي - عقم الزوجين

المساعدة الطبية على الإنجاب - الفحص بالصدى

## ECHOGRAPHIE MAMMAIRE

Nom : Soumia Targa

Renseignements cliniques : Mastodynies

Trame fibro-glandulaire mammaire globalement hyperéchogène de répartition harmonieuse au niveau des différents quadrants sans lésion tissulaire suspecte.

Absence d'atténuation des échos en profondeur.

Revêtement cutané et graisse adjacente sans particularité.

### CONCLUSION :

Echographie mammaire sans anomalie notable.

Casablanca le 0310/23

N. Béchir

Dr. Najib BERRADA  
GYNÉCOLOGIE - SPECIALISTE  
Angle Rue d'Alger et  
Rue Abou Bakr Al Baklani Casablanca  
Tél : 05 22 47 12 97 // 98

زاوية زنقة الجزائر 2، زنقة أبو بكر البقلاني الدارالبيضاء - الهاتف: 05 22 47 12 97 // 98  
Angle Rue d'Alger et 2, Rue Abou Bakr Al Baklani Casablanca - Tél : 05 22 47 12 97 // 98

Casablanca, Le 24/10/2023

Patient  
Médecin traitant  
Examen(s) réalisé(s)

TARGA SOUMIA  
DR BERRADA NAJIB  
MAMMO-TOMOSYNTHÈSE + ECHOGRAPHIE MAMMAIRE

**RC : 57 A / 2 P / Sans antécédents personnels ou familiaux de néoplasie mammaire ou de l'ovaire.**

**Bilan de dépistage.**

**Technique :** Examen réalisé par un appareil numérique direct type Hologic Selenia Dimensions avec tomosynthèse.

Deux incidences : faces et obliques + cliché comprimé localisé sur la zone médio-mammaire droite.

**Résultat :**

**Mammo-tomosynthèse :**

Seins de volume symétrique.

Trame conjonctivo-glandulaire dense et hétérogène : type C.

Présence d'une micro-opacité se projetant sur l'U.Q. Ext du sein gauche, d'allure parfaitement bénigne, présentant une composante graisseuse, compatible avec un ganglion normal.

Absence de masse ou de distorsion architecturale notable en regard des deux plages mammaires.

Absence de regroupement suspect de microcalcifications.

Le balayage en tomosynthèse ne détecte pas d'anomalie particulière.

Les revêtements cutanés et les mamelons sont normaux.

Les prolongements axillaires sont libres.

On note quelques ganglions axillaires liposcléreux sans valeur pathologique.

**Echographie mammaire :**

Elle ne montre aucun nodule suspect ou image atténuante.

Absence d'adénopathie axillaire.

**Conclusion :**

**Bilan sénologique de dépistage ne montrant pas d'anomalie suspecte au niveau des deux seins.**

**Examen classé ACR 1 à droite, ACR 2 à gauche de la classification BI-RADS.**

En vous remerciant de votre confiance

Dr. Houria AMRANI MIKOU



# CENTRE DE RADIODIAGNOSTIC ROUDANI

400, Bd. Brahim Roudani, 1<sup>ère</sup> étage, Maârif - 20100 - Casablanca  
Tél.: 05 22 25 22 96 / 05 22 23 50 70 / 05 22 25 13 02/07  
06 60 73 95 97 - Fax: 05 22 23 50 68  
Web : [www.crr.ma](http://www.crr.ma)

Dr. Houriya AMRANI MIKOU

Dr. Wafae MSEFER FAROUQI

Dr. Naîma BENJELLOUN DEBBAGH

Dr. Yasmina TAHIRI ZIATI

Dr. Abderrahim ADIL

Nom et prénom :

**TARGA SOUMIA**

Type d'examen :

**MAMMO-ECHO**

Date d'examen :

**25/10/2023**

I.R.M. 1.5 Tesla

Radiologie Numérisée

Scanner Spirale

Mammographie Numérisée

Tomosynthèse


Sénologie Interventionnelle


Echographie / Doppler Couleur

Echographie Fœtale 3D 4D

Ostéodensitométrie

Rachis entier





TARGA SOUMIA

## CENTRE DE RADIODIAGNOSTIC ROUDANI

400, Bd. Brahim Roudani - 1<sup>ère</sup> étage - Maârif

20 100 - Casablanca

Tél.: 05 22 25 22 96 / 05 22 23 50 70 / 05 22 25 13 02

05 22 25 13 04 / 05 22 25 13 07 / 06 60 73 95 97

Fax: 05 22 23 50 68

Web : [www.crr.ma](http://www.crr.ma)

E-mail : [cr.roudani@hotmail.fr](mailto:cr.roudani@hotmail.fr)





*Dans un souci de respect environnemental, nos épreuves radiologiques sont tirées sur papier.*

Document généré par :  
VisionPRINT®  0120

**binarios**  
Expert en informatique médicale

**BINARIOS S.A.R.L.**

Lot 84, zone industrielle Ouled Saleh, Province Nouaceur, Casablanca, Maroc.  
Tél.: +212 (0) 522 592 004 / +212 (0) 660 489 786 - Fax: +212 (0) 522 592 951  
E-mail: [contact@binarios-it.com](mailto:contact@binarios-it.com) - Site web : [www.binarios-it.com](http://www.binarios-it.com)



Voluson  
(36) P8

TARGA SOUMIA

E8C-RS/GYN  
8.9cm/1.2/27Hz

MI 0.4  
TIs 0.2

DR BERRADA NAJIB

03.10.2023 1:20:20 PM

Gyn 1

10.00 - 4.00

100 $\mu$

Gn 2

C6 / M7

P4 / E1

SRI II 4

Lt. Ovary

Rt. Ovary

Voluson  
P8

Voluson  
P8

Voluson  
(36) P8

TARGA SOUMIA

E8C-RS/GYN  
8.9cm/1.2/27Hz

MI 0.4  
TIs 0.2

DR BERRADA NAJIB

03.10.2023 1:19:00 PM

Gyn 1

10.00 - 4.00

100 $\mu$

Gn 2

C6 / M7

P4 / E1

SRI II 4

UH-H

Voluson  
P8

UH-H 0.36cm