

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)
- Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)
- Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge  
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

**Déclaration de Maladie**  
M23-000549

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10705 Société : RAM  
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :  
Nom & Prénom : HILAL SANAA 188391  
Date de naissance :  
Adresse : SMILAL @ Royalairmaroc.com  
Tél. : 0664860909 Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :


Dr. BENCHAKROUN. Y  
Professeur d'ORL et de  
Chirurgie Cervicofaciale  
Spécialiste  
Nez - Gorge - Oreille  
N° P 091197149

Date de consultation : 1/12/23  
Nom et prénom du malade : Le jeune Hachami Mohamed Reda  
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☒ Enfant  
Nature de la maladie : Cancer Tumorale de l'os du nez gauche  
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :  
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :  
Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° A-A-215 / 2019



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1/12/23		620PL		

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la facture
	5-12-23	287.90

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	04/12/23	DATELOR	200.00
	05/12/2023	p 5.45	600.00

# AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX																
				MONTANTS DES SOINS																
				DEBUT D'EXECUTION																
				FIN D'EXECUTION																
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																			
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		G		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																			
	25533412	21433552																		
	00000000	00000000																		
	D																			
	00000000	00000000																		
	35533411	11433553																		
	B																			
	G																			
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS																
			DATE DU DEVIS																	
			DATE DE L'EXECUTION																	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

clinique  
mers  
sultan



مصحة  
مرس  
السلطان

M<sup>r</sup> Hachami Mohamed  
Taha

55,000

PHARMACIE MOUSTAFEE HASSAN  
116, Bd. Souf Joud Quartier C  
Casablanca - Tél: 0522 20 44 23

12/ Bromylase y

2cp/1 ————— x 7,

52,800

20/ Oede 20mg

2cp/1 ————— x 7,

170,000

30/ Cefuo 200mg

2cp/1 ————— x 8,

**URGENCES 24H/24H**

64, شارع عمر الادريسي (قرب حديقة مردوخ) - الدار البيضاء - الفاكس 05 22 26 79 42

64, Bd Omar El Idrissi ( en face du jardin Murdoch ) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42

الهاتف : 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05

E-mail : [cliniquemersultan@gmail.com](mailto:cliniquemersultan@gmail.com) - [cms@cliniquemerssultan.com](mailto:cms@cliniquemerssultan.com)

[www.cliniquemersultan.com](http://www.cliniquemersultan.com) / ICE : 001728360000010



no. 10

10/ Parantaly 500

20/10 273

287.90



~~Dr. BENCHAKROUN. Y  
Professeur d'Anatomie de  
Chirurgie Spéciale  
Nez - Gorge - Oreille  
991 57 149~~

~~Dr. BENCHAKROUN. Y  
Professeur d'ORL et de  
Chirurgie Spéciale  
Nez - Gorge - Oreille  
991 57 149~~

# BIOMYLASE®

## Comprimés pelliculés ; Boîte de 24

## Sirop ; Flacon de 125 ml

### Alpha-amylase

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Comprimé :	Pour 1 Cp enrobé
Alpha-amylase *Soit 2142.9 Unités Pharmacopée Européenne par Comprimé. Excipients	3000 U CEIP* q.s.p.....1 Cp
Sirop :	Pour 1 ml de sirop
Alpha-amylase *Soit 142.86 Unités Pharmacopée Européenne par ml de sirop. Excipients	200 U CEIP* q.s.p.....1 ml

#### EXCIPENT A EFFET NOTOIRE

**Comprimé :** Saccharose et Jaune orangé S (E110).

**Sirop :** Saccharose, Glycérol, Parahydroxybenzoate de propyle sodique (E217), Parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219).

#### Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament appartient à la classe des enzymes à visée anti-inflammatoire.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?

#### Posologie

##### • Comprimé :

**Adulte :** 1 Comprimé, 3 fois par jour au cours des repas.

##### • Sirop :

**Adulte :** 1 cuillère à soupe (15 ml), 3 fois par jour.

**Enfant de plus de 3 ans (plus de 15 kg) :** 2 cuillérées à

**Nourrisson et enfant de 6 mois à 3 ans (7 kg à 15 kg) :**

#### Mode et voie d'administration

Voie orale.

Avaler les comprimés, sans les croquer, avec un verre

#### Durée du traitement

Pour les comprimés : Ne prolongez pas le traitement

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis

**DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT**

**Ne prenez jamais BIOMYLASE :**

• En cas d'antécédents d'allergie à l'alpha-amylase ou à l'un des excipients (le cas du sirop).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, BIOMYLASE peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

55,00

# OEDES® 20 mg

## Microgranules gastro-résistants en gélule

### (Oméprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.  
Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

#### 1. Identification du médicament:

##### Forme pharmaceutique et présentation:

OEDES® 20 mg, Microgranules gastro-résistants en gélules, boîtes de 7, 14, 28 et 56

##### 2. Composition du médicament:

###### Principe actif:

Oméprazole ..... 20 mg

###### EXCIPIENTS : q.s.p. une gélule.

Excipient à effet notoire : Saccharose.

##### 3. Classe pharmaco-thérapeutique:

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

##### 4. Indications thérapeutiques

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes:

###### Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

- un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

###### Chez les enfants :

- Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel  $\geq 10$  kg :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

- Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

##### 5. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

###### Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous :

###### Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitation acide.

Le traitement de l'ulcère gastro-œsophagien a été légèrement

gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.

Toujours remuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.

Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne pas les mâcher ni les croquer.

###### 6. Contre-indications :

###### Ne prenez jamais OEDES® 20 mg, gélule :

- si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OEDES® 20 mg,

- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).

- si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

- si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OEDES® 20 mg.

###### 7. Effets indésirables :

Come tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez remarquer un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES® 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

- Rougeurs de la peau avec des bulles ou un desquamement. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Maux de tête.

- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulences.

- Nausées ou vomissements.

- Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents (sur 100)

- Gonflement des pieds et de

- Troubles du sommeil (insomnie)

- Elourdissements, fourmillements

- Vertiges.

- Modifications des résultats

- Eruptions cutanées, urticaire

- Malaise général, manque

- Effets indésirables rares, (sur 1000)

- Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des échymoses ou faciliter la survenue d'infections.

- Réactions allergiques, parfois très graves incluant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de la fièvre, une respiration sifflante.

- Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.

- Agitation, confusion ou dépression.

- Troubles du goût.

- Vous avez des selles noires (teintées de sang).

- Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'oméprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

- Si l'un des effets indésirables ci-dessus survient, arrêtez de prendre le médicament et contactez immédiatement votre médecin.

- Vous devez effectuer un examen sanguin spécifique (Chromogranine A).

Si vous prenez OEDES® 20 mg au long-cours (durée supérieure à un an), votre médecin vous surveillera probablement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et événements nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier au niveau des zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que possible, car vous devrez peut-être arrêter votre traitement avec OEDES® 20 mg. N'oubliez pas de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

Enfants :

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que celui-ci ne soit pas recommandé. Ne donner pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou < 10 kg.

###### Mentions relatives aux excipients à effet notoire :

En raison de la présence de Saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

###### 9. Interactions avec d'autres médicaments :

###### Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. OEDES® 20 mg peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur OEDES® 20 mg.

Vous ne devez pas prendre OEDES® 20 mg si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

• Rifampicine (utilisé pour traiter la tuberculose) ;

• Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) ;

• Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe) ;

• Milépéritus (*Hypericum perforatum*) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée) ;

• Clistazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente) ;

• Saquinavir (utilisé pour traiter l'infection VIH) ;

• Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)) ;

• Eriofoline (utilisé dans le traitement du cancer) ;

• Mithridate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose)

LOT 211539  
EXP 05/2024  
PPV 52.80DH



## CEFICO® 200 mg,

comprimé pelliculé - boîtes de 8 et de 16  
(Céfixime trihydraté)

## CEFICO® 100 mg/5 ml,

poudre pour suspension buvable en flacon avec  
une seringue mesure en poids de l'enfant

Boîte d'un flacon de 30 ml et Boîte d'un flacon de 60 ml.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 1. Composition du médicament

#### **CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :**

Céfixime (DCI) trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....200,00 mg

Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Stéarate de magnésium, OPADRAY Y-1-7000 (Hydroxypropylméthylcellulose, dioxyde de titane et polyéthylène glycol 400).....q.s.p. 1 comprimé pelliculé.

#### **CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :**

Céfixime (DCI) trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....100,00 mg

Excipients : Saccharose, Gomme arabique, Arôme strawberry, Benzoate de sodium.....q.s.p 5 ml de suspension reconstituée.

Excipients à effet notoire : Saccharose

### 2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

— Ce médicament est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines, du groupe des céphalosporines de 3ème génération, groupe proche de celui des pénicillines.

### 3. Indications thérapeutiques :

#### **• CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de :

- Certaines infections urogénitales,
- Otitis et sinusites aiguës,
- Infections bronchiques et pulmonaires.

#### **• CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :**

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois dans le traitement des :

- Certaines infections urinaires,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otitis moyennes aiguës.

### 4. Posologie :

Mode d'administration : Voie orale.

#### **• CEFICO 200 mg, comprimés pelliculés :**

La présentation CEFICO, comprimé à 200 mg est pris 12 ans et chez l'adulte.

#### **Chez l'adulte :**

A titre indicatif, la posologie usuelle est de deux comprimés par jour.

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique, mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

#### **• CEFICO 100 mg/5ml, poudre pour suspension buvable en flacon :**

La présentation CEFICO 100 mg/5 ml, est préconisée chez l'enfant de 6 mois à 12 ans. A titre indicatif, la posologie de CEFICO chez l'enfant de plus de 6 mois est de 8 mg par kilo et par jour, en deux prises, à 12 heures d'intervalle.

La suspension buvable est à reconstituer par addition d'eau jusqu'au trait de jauge pour l'obtention du volume total (30 ml ou 60 ml) et à agiter avant emploi.

La dose par prise est indiquée, en fonction du poids de l'enfant, sur le piston de la

LOT 230653

EXP 03 25

PPV 170.00 DH

CEFICO

# PARANTAL®

(Paracétamol)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS :

- Solution buvable dosée à 3 %, flacon de 90 ml, avec seringue doseuse graduée en kg de poids.
- Comprimés adultes et enfants (à partir de 27 kg) dosés à 500 mg
- Comprimés effervescents adultes et enfants (à partir de 50 kg) dosés à 1 g
- Comprimés effervescents adultes et enfants (à partir de 27 kg) dosés à 500 mg
- Granulés adultes et enfants (à partir de 27 kg) dosés à 500 mg
- Granulés enfants dosés à 300 mg
- Granulés nourissons et enfants dosés à 150 mg
- Granulés nourissons dosés à 80 mg
- Suppositoires adultes et enfants (à partir de 50 kg) dosés à 650 mg
- Suppositoires enfants dosés à 300 mg
- Suppositoires enfants dosés à 250 mg
- Suppositoires nourissons dosés à 125 mg

## COMPOSITION :

- Solution buvable à 3%	
Paracétamol	3,00 g
Excipient	qsp 100 ml
- Comprimés adultes et enfants (à partir de 27 kg) à 500 mg	
Paracétamol	500 mg
Excipient	qsp 1 comprimé
- Comprimés effervescents adultes et enfants (à partir de 50 kg) à 1 g	
Paracétamol	1 g
Excipient	qsp 1 comprimé effervescent
- Comprimés effervescents adultes et enfants (à partir de 27 kg) à 500 mg	
Paracétamol	500 mg
Excipient	qsp 1 comprimé effervescent
- Granulés adultes et enfants (à partir de 27 kg) à 500 mg	
Paracétamol	500 mg
Excipient	qsp 1 sachet
- Granulés enfants à 300 mg	
Paracétamol	300 mg
Excipient	qsp 1 sachet
- Granulés nourissons et enfants à 150 mg	
Paracétamol	150 mg
- Granulés nourissons à 80 mg	
Paracétamol	80 mg
Excipient (commun aux granulés enfants et nourissons)	qsp 1 sachet
- Suppositoires adultes et enfants (à partir de 50 kg) à 650 mg	
Paracétamol	650 mg
- Suppositoires enfants à 300 mg	
Paracétamol	300 mg
- Suppositoires enfants à 250 mg	
Paracétamol	250 mg
- Suppositoires nourissons à 125 mg	
Paracétamol	125 mg
Excipient (commun aux suppositoires)	qsp 1 suppositoire

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Autres analgésiques et antipyrétiques

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient du paracétamol, il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

La présentation à 1 g peut être prescrite par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Insuffisance hépatocellulaire.
- Accidents allergiques antérieurs au paracétamol ou aux autres constituants.
- Inflammation récente anale ou rectale ou saignement récent du rectum (suppositoire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

### Mises en garde spéciales :

- En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.
- La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin et le dosage de la glyémie.
- En cas de découverte d'une hépatite virale aiguë, il convient d'arrêter le traitement.
- Les granulés pour suspension buvable contiennent du saccharose. En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrose-isomaltase.
- Les granulés pour suspension buvable contiennent du sodium. Le sodium est inférieur à 1 mmol (23 mg) par sachet.
- Prendre en compte la teneur en sodium du comprimé effervescent.
- Le comprimé non effervescent contient du lactose. En raison de la présence de lactose, ce médicament ne peut être administré en cas de déficience congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrose-isomaltase.
- En raison de la présence de sorbitol dans les comprimés effervescents, ce médicament ne peut être administré en cas de déficience congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrose-isomaltase.
- La solution buvable contient du parahydroxybenzoate et peut provoquer des effets indésirables.
- Avec les suppositoires, il y a un risque d'irritation locale, d'augmentation de la température rectale et de constipation.

### est élevé et la posologie est forte.

### Précautions d'emploi :

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, consultez votre médecin.
- Traitement sans avis de votre médecin.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, ou d'abus d'alcool.
- Avant de débuter un traitement par ce médicament, ventilez votre médecin si vous (ou votre enfant) prenez d'autres médicaments.
- En cas de problèmes de nutrition (maïnutrition) ou de déshydratation.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un autre traitement.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

À titre informatif : le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'au cours de l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

Comprimés effervescents à 500 mg adultes et enfants (à partir de 27 kg)

: sorbitol, sodium environ 395 mg/comprimé

PARANTAL® 20 COMPRIMES

PPU 10DH10

EXP 06/2025  
LOT 26058 3

galactosémie

galactosémie

administration

continuer le

paracétamol.

TOUT AUTRE



Dr Benchakroun Youssef  
Professeur d'O.R.L  
et chirurgie cervico - facial  
Spécialiste : Nez - Gorge- Oreille

الدكتور يوسف بنشقرود  
أستاذ بكلية الطب  
إختصاصي في أمراض  
الأنف، الأذن و الحنجرة

Casablanca, le :

01 DEC 2023

Le jeune Hachani Mohamed  
Taha

Rx pulmonaire

Centre de Radiologie El Oufia  
Bd. Oum Rabii - Rue 50 N°2  
Casablanca - 20220  
Tél: 05 22 93 04 93

Dr. BENCHAKROUN Y.  
Professeur d'O.R.L et de  
Chirurgie Cervicofaciale  
Nez - Spécialiste  
Gorge - Oreille  
05 22 86 38 76  
06 66 82 41 70

Dr. Abdelmajid RIFKI

Anatomo-cytopathologiste  
Diplômé de l'Académie de Lyon  
Ex. enseignant à la Faculté  
de Médecine de Casablanca



Pr. Soumaya ZAMIATI

Anatomo-cytopathologiste  
Ex. enseignante à la Faculté  
de Médecine de Casablanca

مختبر التشريح الدقيق ابن النفيس

CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ENNAFIS

23/12/23 1038

57/12/23

## DEMANDE D'EXAMEN ANATOMOPATHOLOGIQUE

De la part du Docteur : Dr. BEN CHARROUN

Nom et prénom : MOHAMMED TANA HACHAM Age : 2007

Date du prélèvement : 57/12/23 Réf. antérieure : .....

Siège et nature du prélèvement : 1

Renseignements cliniques : .....

Tumeur nodulaire de l'oreille

sur nez gauche

partie supérieure indiquée par 1 fil

- partie inférieure indiquée par 2 fil

Cytologie : Analyse histologique

- Frottis : Vagin ☐ Exocol ☐ Endocol ☐ Endometre ☐

- Date des dernières règles : .....

- Autres : Ponction ☐ Liquide ☐

- Traitements éventuels : .....

Date :

Signature :

07/12/2023



**Dr. Abdelmajid RIFKI**

Anatomo-cytopathologiste  
Diplômé de l'Académie de Lyon  
Ex. enseignant à la Faculté  
de Médecine de Casablanca



مختبر التشريح الدقيق ابن النفيس

CENTRE DE PATHOLOGIE IBN ENNAFIS

**Pr. Soumaya ZAMIATI**

Anatomo-cytopathologiste  
Ex. enseignante à la Faculté  
de Médecine de Casablanca

## FACTURE

REF : FA23005386

Date de facturation	15 / 12 / 2023
Médecin traitant	Pr. Y. BENCHAKROUN
Patient	Mr Mohamed Taha HACHAMI
Demande référence	H234AR1038
Demande-reçu le	05/12/2023

A Payer	600,00	Dhs
coefficient-P	545	
Mode de règlement	Espèce	

Arrêtée la présente facture à la somme de : SIX CENTS DIRHAMS

Dr. A. RIFKI

CENTRE DE PATHOLOGIE  
IBN ENNAFIS  
Dr. Abdelmajid RIFKI  
11, rue Lieutenant BERGE  
Tél : 05 22 20 23 02 - Casablanca

ICE 001808260000087 IF 41707227 INPE 9120584 INPE du Laboratoire 093002954



Reçu le : **05/12/2023**

Edité le : **07/12/2023**

Âge : **16 ans**

Notre réf. : **H234AR1038**

Prescripteur : **Pr. Y. BENCHAKROUN**

Patient(e) : **Mr Mohamed Taha HACHAMI**

Organe : **Peau**

(Tumeur noirâtre de l'aile gauche du nez - partie supérieure : 1 fil et partie interne : 2 fils)

## COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

Pièce de biopsie exérèse d'un lambeau cutané de 0,9x0,7x0,2cm orienté par des fils (1 fil sur la partie supérieure et 2 fils sur la partie interne. Il est centré par une lésion nodulaire noirâtre de 0,5x0,4x0,1cm incluse en totalité.

Les limites latérales passent entre 0,1cm (limites interne et externe) et 0,2cm (limites supérieure et inférieure). La limite profonde passe à 0,1cm.

**L'examen microscopique** montre sous un épiderme acanthosique papillomlateux ortho-kératosique avec hyperpigmentation de la couche basale, une prolifération tumorale naevo-cellulaire dermique faite de thèques naeviques coalescentes ou séparées par des bandes fibreuses englobant les annexes pilo-sébacées. Les cellules naeviques ont un cytoplasme peu abondant basophile ou éosinophile et un noyau arrondi ou ovoïde muni d'une chromatine peu dense et de quelques irrégularités de nature dystrophique. La pigmentation mélanique est modérée, elle est intra et extra-cellulaire. Il existe des lésions de folliculite sous naevique.

Les limites d'exérèse latérales et profonde passent en zone saine.

### Conclusion

- Naevus naevocellulaire dermique d'exérèse complète.
- Absence de malignité.

CENTRE DE PATHOLOGIE  
IBN ENNAFIS  
Dr Abdelmajid RIFKI  
11, rue Lieutenant Berge  
20 23 02 - Casablanca

**Dr A. RIFKI**



# CENTRE DE RADIOLOGIE EL OULFA

Docteur Fatiha LASRI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spcialisé-Nancy II.

Ex médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam.

Docteur Bouchaib ELMDARI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spcialisé-Nancy II

Ex médecin attaché au CHU Ibn Rochd

Casablanca, le 04/12/2023

## FACTURE N°12322/2023

NOM & PRENOM: HACHAME MOHAMED TAHA

EXAMEN	MONTANT
RX. THORAX FACE	200 DH
TOTAL	200 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :DEUX CENTS DH TTC

Centre de Radiologie El Oulfa  
Bd. Oum Rabii - Rue 50 N°2  
Casablanca 20220  
Tél: 0522 93 04 93

Dr Z. HOUARDI  
Médecin Radiologue

Bd. Oued Oum Rabii – Rue 50, N°2- Oulfa – 20220 Casablanca  
Tél. : 0522 93 04 93 / 05 22 93 05 93 / 05 22 93 32 99 – Fax 0522 93 563Capital: 100 000, 00  
Dhs - RC: SCP – TP: 37989156 – IF: 4049398 – ICE: 001581917000057  
E-mail: [radiologie-oulfa@.com](mailto:radiologie-oulfa@.com)

**Docteur Fatiha LASRI**  
Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité – Nancy II
- Ex Médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam

**Dr Bouchaïb EL MDARI**  
Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité – Nancy II
- Ex-Médecin attaché au CHU Ibn Rochd

- Scanner Spirale Corps Entier
- Dentascanner – Panoramique Dentaire
- Echographie Générale

- Echographie-Doppler Couleur
- Echographie Ostéo Articulaire
- Radiologie Numérisée

- Ostéodensitométrie
- Mammographie Numérisée
- Radiographie Rachis Entier
- Radio – Photo

Casablanca , le 04/12/2023

PATIENT : **HACHAME MOHAMED TAHA**  
MEDECIN TRAITANT : **DR. BENCHAKROUN youssef**  
EXAMEN(S) REALISE(S) : **RX. THORAX FACE**

**RADIOLOGIE  
EL OULFA**

- Syndrome bronchique.
- Absence de foyer parenchymateux évolutif.
- Culs de sac pleuraux libres.
- Silhouette médiastino-cardiaque sans particularité.

**Conclusion :**

- Syndrome bronchique.
- Image thoracique ne révélant pas d'anomalie par ailleurs.

Confraternellement  
**DR. ELOUARDI ZINEB**

I.S

Centre de Radiologie El Oulfa  
Bd. Oum Rabii - Rue 50 N°2  
Casablanca - 20220  
Tél : 05 22 93 04 93

**Dr Z. ELOUARDI**  
Médecin Radiologue