

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-0026411

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **12008**

Société : **ROYAL AIR MAROC**

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **KABLY**

HAFJAR

Date de naissance :

28/10/1977

Adresse :

81 Bd du 11 Janvier, esc gauche 3^e étg

FPP+ No 6

Tél. : **0661388687**

Total des frais engagés : **894,30** Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr Amine HAMAD
Spécialiste
En Chirurgie Générale
80, Rue Omar Riffi - Casablanca
Tél. : 05 22 26 59 74

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cachet du médecin :

Date de consultation : **03/12/2024**

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même Conjoint

Age : **46ANS**

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : **/ /**

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/11/24	62	1	20000	Docteur Amine HAMAD Spécialiste En Chirurgie Générale 80, Rue Omar Ritti - Casablanca Tél.: 05 22 26 59 74
03/11/24	K30	1	40000	Docteur Amine HAMAD Spécialiste En Chirurgie Générale 80, Rue Omar Ritti - Casablanca Tél.: 05 22 26 59 74

EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>SACHEZ QU'AU CASABLANCA IL SUIT CASABLANCA 05 22 26 59 00 05 22 26 59 74</i>	03/11/24	294.30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Amine HAMAD

Spécialiste en Chirurgie Générale

Chirurgie Digestive - Endocrinienne

Et Chirurgie Gynécologique

Diplômé de la Faculté de Médecine

de Toulouse - France

للدكتور أمين حماد

اختصاصي في الجراحة العامة

جراحة الجهاز الهضمي - الغدد

و الجراحة النسائية

خريج كلية الطب بتولوز فرنسا

Casablanca, le

03.01.2024

الدار البيضاء في

Dr Amine HAMAD
Spécialiste en Chirurgie Générale
Chirurgie Digestive - Endocrinienne
Et Chirurgie Gynécologique
Diplômé de la Faculté de Médecine
de Toulouse - France

Pharmacie HAMAD
326, rue Omer Rifi Casablanca
Télé : 05 22 20 99 95 - 05 22 26 59 74
Fax : 05 22 20 99 95

1) KABLY Hafar
2) Aslafh 500mg S.V. gel. 28g - 8g
3) Zetx 28g - 8g
4) Specchim S.V. 500mg Cey.
5) Cetacine S.V. 28g - 8g
6) Fucidine S.V. 28g - 8g
7) Maffic 1 Table
8) Deltapant S.V. 28g - 8g
9) Beladine Solutions 2 fl. v.
10) Nettoyage 28g / 8g

Dr Amine HAMAD
Spécialiste en Chirurgie Générale
En Chirurgie Gynécologique
80, Rue Omer Rifi Casablanca
Tel.: 05 22 26 59 74

80, Rue Hadj Omar rifi - CASABLANCA

80, زنقة الحاج عمر الريفي - الدار البيضاء

Fax : 05 22 20 99 95 Tél : 05 22 26 03 06 الفاكس : 05 22 20 99 95

ASTAPH®

(Flucloxacilline)

Composition :

- Formes orales

Gélules à 500 mg :

Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

Excipient qsp..... 1 gélule.

Poudre pour suspension buvable à 250 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sou)

Poudre pour suspension buva

Flucloxacilline(DCl) 125 mg (sou

- Formes injectables :

Injectable à 250 mg :

Flacon de poudre contenant Flu

+ ampoule de 3ml d'eau P.P.I.

Injectable à 500mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3%.

Injectable à 1 g :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 1 g (sous forme de sel sodique monohydraté)

+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3%.

Propriétés :

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines semi-synthétiques du groupe M, résistant à la pénicillinase staphylococcique. La flucloxacilline est un bactéricide.

Le spectre d'activité : Staphylococcus auréus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogènes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium spp, Bacillus anthracis, Neisseria spp.

Indications :

Infections à germes sensibles :

- infections de la peau et des tissus mous;
- infections ostéo-articulaires;
- infections des voies respiratoires;
- infections de la sphère ORL;
- Septicémie, entérocolite, ostéomyelite, méningite et endocardite à staphylocoques.

Contre-indications :

Allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines).

Mises en garde et précautions d'emploi :

- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines M. leur administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- En cas d'insuffisance rénale, il est inutile de réduire la posologie habituelle de la forme orale.
- Nouveau-né : administrer avec prudence au nouveau-né en raison du risque d'hyperbilirubinémie par compétition de fixation sur les protéines sériques (ictère nucléaire).

Grossesse et allaitement :

Grossesse : la flucloxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte.

Allaitement : La flucloxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une suspension de l'allaitement doit être envisagée.

Effets indésirables :

- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.
- Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT), exceptionnellement hépatites icteriques.
- Réactions hématologiques réversibles : anémies, thrombopénies, leucopénies.



Fucidine® 2% pommade

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

♦ IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DENOMINATION

FUCIDINE® 2%, pommade

COMPOSITION QUALITATIVE / QUANTITATIVE

COMPOSITION	Centésimale
Fusidate de sodium	2 g
Excipients q.s.p.	100 g

Excipients : alcool cétilyque, lanoline, vaseline, paraffine liquide.

FORME PHARMACEUTIQUE

Pommade, Tube de 15 g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTI-INFECTIEUX

Antibiotiques-antibactériens / antibiotiques actifs sur la synthèse des protéines

(D : Dermatologie).

♦ DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est antibiotique.

Ce médicament est préconisé dans les infections cutanées dues à des germes staphylococques et streptocoques.

♦ ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'acide fusidique ou à l'un des excipients,
- infections mammaires lors de l'allaitement en raison du risque d'absorption du produit par le nouveau-né.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La pommade doit pas être appliquée sur l'oeil.
- Ne pas utiliser la pommade sur de trop grandes surfaces, en particulier chez le nourrisson.
- Ne pas utiliser la pommade sur les lésions suintantes macérées, ni dans les pis, ni sur les ulcères de jambe.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICALEMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSieurs MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas d'allaitement, ne pas appliquer sur le sein.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Lanoline, alcool cétilyque, et butylhydroxytoluène.

♦ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSÉOLOGIE

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée, application locale avec ou sans pansement. Eviter l'application en couche épaisse.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Une ou deux applications par jour après nettoyage de la surface infectée.

DUREE DU TRAITEMENT

Limiter le traitement à une semaine, à titre indicatif.

♦ EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

Dans certains cas, il est possible que survienne un eczème allergique avec parfois des lésions éloignées du lieu de traitement :

il faut IMMÉDIATEMENT ARRÊTER LE TRAITEMENT et avertir votre médecin.

En fonction de l'absorption du produit à travers la peau, en particulier chez le nourrisson, la possibilité d'effets non souhaités au niveau du foie ne peut être exclue.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

♦ CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

♦ CONDITION DE DÉLIVRANCE :

CE MÉDICAMENT EST INSCRIT EN LISTE I

VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DÉLIVRER QUE SUR ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS

- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MÉDICAL.

- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

Fabriqué par  POLYMÉDIC sous licence Léo Pharma.

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane - Maroc

Dr. T. BELABDA : Pharmacien Responsable

ابواب من دار
مترهـ

11139, 78

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

Comprimé

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose e K30, amidon de maïs prégelatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est prescrit pour soulager de la douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants :
allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIERES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



ASTAPH®

(Flucloxacilline)

Composition :

- Formes orales

Gélules à 500 mg :

Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

Excipient qsp..... 1 gélule.

Poudre pour suspension buvable à 250 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) par cuillère-mesure de 5ml.

Poudre pour suspension buvable à 125 mg/5ml :

Flucloxacilline(DCl) 125 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

- Formes injectab^{le}s :

Injectable à 250 mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 250 mg

+ ampoule de 3ml d'eau P.P.I.

Injectable à 500mg :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)

+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3%.

Injectable à 1 g :

Flacon de poudre contenant Flucloxacilline(DCl) 1 g (sous forme de sel sodique monohydraté)

+ ampoule de 5ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzylique à 3%.

Propriétés :

Antibiotique de la famille des bêta-lactamines semi-synthétiques du groupe M, résistant à la pénicillinase staphylococcique. La flucloxacilline est un bactéricide.

Le spectre d'activité : Staphylococcus auréus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogènes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium spp, Bacillus anthracis, Neisseria spp.

Indications :

Infections à germes sensibles :

- infections de la peau et des tissus mous;
- infections ostéo-articulaires;
- infections des voies respiratoires;
- infections de la sphère ORL;
- Septicémie, entérocolite, ostéomyelite, méningite et endocardite à staphylocoques.

Contre-indications :

Allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines et céphalosporines).

Mises en garde et précautions d'emploi :

- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines M. Leurs administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- En cas d'insuffisance rénale, il est inutile de réduire la posologie habituelle de la forme orale.
- Nouveau-né : administrer avec prudence au nouveau-né en raison du risque d'hyperbilirubinémie par compétition de fixation sur les protéines sériques (ictère nucléaire).

Grossesse et allaitement :

Grossesse : la flucloxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte.

Allaitement : La flucloxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une suspension de l'allaitement doit être envisagée.

Effets indésirables :

- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.
- Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT), exceptionnellement hépatites icteriques.
- Réactions hématologiques réversibles : anémies, thrombopénies, leucopénies.

Docteur Amine HAMAD

Spécialiste en Chirurgie Générale

Chirurgie Digestive - Endocrinienne

Et Chirurgie Gynécologique

Diplômé de la Faculté de Médecine

de Toulouse - France

للدكتور أمين حماد

اختصاصي في الجراحة العامة

جراحة الجهاز الهضمي - الغدد

والجراحة النسائية

خريج كلية الطب بتولوز فرنسا

Casablanca, le

٠٤.٠١.٢٠٢٤

الدار البيضاء في

Compte rendu opératoire

Sous Anesthésie locale :

- Mme KABBY Hajar en position ventrale.

- Incision de 2 Centimètres dans la Région Scapulaire gauche, d'1 Evolution ABCP Collège. - Géreffe +++
hémorragie ++

- Drainage et dressage

Pendant l'opératoire
Conclusion : Infection mammaire
d'A 100% sur les deux

دكتور أمين حماد
Docteur Amine HAMAD
Spécialiste
En Chirurgie Générale
80, Rue Omar Riffi - Casablanca

80, زنقة الحاج عمر الريفي - الدار البيضاء

Fax : 05 22 20 99 95 : Tél : 05 22 20 06 62 80 26 03 المحمول : 05 22 20 99 95 : الفاكس

Docteur Amine HAMAD

Spécialiste en Chirurgie Générale

Chirurgie Digestive - Endocrinienne

Et Chirurgie Gynécologique

Diplômé de la Faculté de Médecine

de Toulouse - France

الدكتور أمين حماد

اختصاصي في الجراحة العامة

جراحة الجهاز الهضمي - الغدد

و الجراحة النسائية

خريج كلية الطب بتولوز فرنسا

Casablanca, le

04.01.2024

الدار البيضاء في

KABL Hafar

Rue d'Hossegor

je soussigné, M HAMAD Amine
Certifié devant moi la somme
de quatre cent (400) Dirhams
comme honoraire pour cette
chirurgie Côte (K20) à la
nomenclature (ABESCHADS)

Haut Débit pour Service
et Maladie

الدكتور أمين حماد
Docteur Amine HAMAD
Spécialiste
En Chirurgie Générale
80, Rue Hadj Omar Rifi - Casablanca
Tél.: 05 22 20 99 95