

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº W19-550495

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule:

7654

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

MOULOUA HAMID

AB9024

Date de naissance :

01-01-1966

Adresse :

Tél. :

0668304712 Total des frais engagés : 103267 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Mouloud HAMID

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous ce sceau à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	19-12-23	663,00

ANALYSES - RADIographies			
Cachet et signature du patient et de l'analyste	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Mr. GUY LAROCHE N° 50 N° 2 Laboratoire et du Radiologue Tél. 05 22 93	12/11/93	NOTHWA 13 130	091036137

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	C	N M	I V	
<i>18/10/97</i>	<i>18/10/97</i>	<i>(20)</i>	<i>(66)</i>			<i>126.-00</i>

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES					
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.					
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.					
SOINS DENTAIRES 	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>	
CŒFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>					
MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>					
DEBUT D'EXÉCUTION <input type="text"/>					
FIN D'EXÉCUTION <input type="text"/>					
O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES 	DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE				
	$\begin{array}{r l} H & 25533412 \quad 21433552 \\ \hline D & 00000000 \quad 00000000 \\ & 00000000 \quad 00000000 \\ & 35533411 \quad 11433553 \end{array}$		CŒFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>		
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
					DATE DU DEVIS <input type="text"/>
					DATE DE L'EXÉCUTION <input type="text"/>
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION				

12/12/2023

خريج كلية الطب بآميان (فرنسا)
طبيب داخلي سابقاً بمستشفيات فرنسا
أمراض الرئة، المساسية، الصبيحة (الريو) والسل
فحص الرضعية التنفسية-تحليل المساسية
الفحص بالأشعة التنفسية القصبي.

MOULOUDI HAMID

Diplômé de la Faculté de Médecine
d'Amiens FRANCE - Ancien Interné
des Hôpitaux de France

Maladies Respiratoires, Tuberculose
Asthme, Allergie Respiratoire
Exploration Fonctionnelle Respiratoire
Test cutané Allergique
Radiographie Pulmonaire - Bronchoscopie

٤٥,٠٠
Lorix 10



١٢,٦ comprimé par jour
Serflux250



2 inhalations le matin et le soir, pendant 1 Mois
Eumoxol Solution buvable à 0,3% : Fl 250 ml

Chaque Jour(s), 1 cuillère le matin, à midi et le
soir, pendant 10 Jours

٩٩,٠٠ Isolone 5



2 comprimés le matin, pendant 6 Jours

٩٥,٠٠ Zolus 20 mg



1 comprimé le soir, pendant 14 Jours

٨١,٠٠ Gentamycine 80



1 IM/IV/SC le matin, pendant 6 Jours

١١١,٥٩ Leflox 500



1 comprimé le matin, pendant 10 Jours

ORDONNANCE

Lorix®

loratadine 10 mg

COMPOSITION

N°: 389/19/DMP/21/NRQ
LOT: 22066 PER: 04/2025
PPV: 40,00 DH

..... 10 mg
..... 1 comprimé
maïs, Stéarate de magnésium.

IQUE

misé dans le traitement symptomatique de la rhinite allergique et

CONTRE - INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- antécédent d'hypersensibilité à l'un des composants de ce médicament
- enfant de moins de 12 ans

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- LORIX® doit être utilisé avec précaution chez l'insuffisant hépatique sévère.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament n'est pas recommandé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.
- L'administration de LORIX® doit être interrompue au moins 48 heures avant de pratiquer des tests cutanés pour le diagnostic de l'allergie car les antihistaminiques peuvent inhiber ou réduire la réponse cutanée.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

וְעַתָּה תִּשְׁמַח בְּבֵית יְהוָה אֱלֹהֵינוּ כִּי כָּל-עַמּוֹד

କାହାର ପାଇଁ ଏହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କାହିଁ କାହିଁ

ପ୍ରକାଶିତ | ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ

תְּמִימָנִים וְשֻׁבְעִים וְלַבְנִים וְגַם נְזֵרִים בְּמִזְרָחָה וְבְמִזְרָחָה

- १) इन्हीं के अनुसार विद्युत का उत्पन्न होने की स्थिति में विद्युत की गुणवत्ता अपेक्षित नहीं होती।
 - २) इन्हीं के अनुसार विद्युत का उत्पन्न होने की स्थिति में विद्युत की गुणवत्ता अपेक्षित होती है।
 - ३) इन्हीं के अनुसार विद्युत का उत्पन्न होने की स्थिति में विद्युत की गुणवत्ता अपेक्षित नहीं होती।
 - ४) इन्हीं के अनुसार विद्युत का उत्पन्न होने की स्थिति में विद्युत की गुणवत्ता अपेक्षित होती है।

• ଏହା କାହାର ପାଇଁ ଆମ୍ବାର ଦେଖିଲାମି ଏହାର କାହାର ପାଇଁ ଆମ୍ବାର ଦେଖିଲାମି

ପାତା ଦେଇ ମୁହଁରାନ୍ତିର (କ୍ଷେତ୍ର) ଲାଗି ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଏଇବେ କିମ୍ବା ଏହାରେ

କାହାର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତି କାହାର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତି କାହାର ପାଦରେ ଯାଏନ୍ତି

፭. አቶ ብሔርጂ ደንብ
፮. ማርመራ ገዢ አቶ ብሔርጂ

Digitized by srujanika@gmail.com

၁။ မြန်မာရှိသူများ၏ အကျဉ်းချုပ်များ၊ ၂။ မြန်မာရှိသူများ၏ အကျဉ်းချုပ်များ၊

卷之三

• ፳፻፲፭ የኢትዮ

SERFLUX 25µg/250µg

PPV :169,60 DH

አዲስ አበባ/ ቴርክክሩ/ የዕለታዊ ሪፖርት

1

બેન્ફિક્શન કોર્પોરેશન લિમિટેડ
નાની 25/250, વેસ્ટ રોડ 25/50

၁၂၆

EUMOXOL®

Ambroxol chlorhydrate

Formes et présentations :

Solution buvable à 0,3% : Flacon de 125 ml et flacon de 250 ml

Composition :

Ambroxol chlorhydrate

0,3 g
100 ml

LOT : 1790
PER : 01 - 26
P.P.V: 32 DH 60

olytiques et expectorantes.
ction bronchique et favorise

Eumoxol®

Ambroxol

Sirop 0,3%

Flacon de 250 ml

avec production anormale
ites aiguës et chroniques,
es aiguës des broncho-

ol chlorhydrate

mineurs à type de nausées,
tion de la posologie.

Dans ces cas de réactions cutanomuqueuses à type d'urticaire, de rash, de prurit, d'urticaire, des manifestations anaphylactoïdes avec survenue de choc et œdème de Quincke qui ont été d'évolution favorable dans les cas rapportés. Dans ces cas, le traitement devra impérativement être interrompu.

Mises en garde et précautions d'emploi :

L'association d'un mucocomodificateur bronchique avec un antitussif et/ou des substances asséchant les sécrétions (atropiniques) est irrationnelle. Grossesse/Allaitement : En cas de grossesse ou d'allaitement, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

Posologie et mode d'emploi :

Selon prescription médicale.

Adulte :

La posologie moyenne de chlorhydrate d'ambroxol est de 90 mg par jour en 2 prises, soit 1 cuillère à soupe (15 ml), 2 fois par jour.

Enfant :

2 à 5 ans : 1/2 cuillerée à café 3 fois par jour

Plus de 5 ans : 1 cuillerée à café 3 fois par jour

Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants.

**Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur
le conditionnement extérieur.**



ISOLONE



Prédnisolone

LOT 230400
EXP 01 2028
CPPV 22 00

imés sous plaquette thermoformée.
imés sous plaquette thermoformée.
imés sous plaquette thermoformée.

ISOLONE 20 mg	: Prédnisolone	50 mg
	Excipient Q.S.P	1 comprimé.
ISOLONE 10 mg	: Prédnisolone	20 mg
	Excipient Q.S.P	1 comprimé.
ISOLONE 10 mg	: Prédnisolone	5 mg
	Excipient Q.S.P	1 comprimé.
ISOLONE 10 mg	: Prédnisolone	10 mg
	Excipient Q.S.P	1 ml

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

ISOLONE est une hormone corticosurrénale synthétique dont l'effet est 4 fois plus fort que celui du cortisol physiologique.

ISOLONE est utilisé pour son effet anti-inflammatoire dans les affections ou maladies suivantes :

- POLYARTHRITE CHRONIQUE
- RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU
- ASTHME BRONCHIQUE ET BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES.
- AFFECTIONS ALLERGIQUES TELLE QUE DERMATOSE DE CONTACT.
- URTICAIRIES GEANTS.
- NEURODERMATHOSE.

CONTRE-INDICATIONS

ISOLONE ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- INFECTIONS A BACTERIES OU CHAMPIGNONS LORSQU'ELLES NE SONT PAS TRAITÉES PAR ANTIBIOTIQUE OU ANTIMYCOSIQUE.
- MALADIES DUES A DES VIRUS (HERPES, ZONA, VARICELLE, HEPATITES...)
- GOUTTE.
- ULCÈRE DIGESTIF EN EVOLUTION ET SANS TRAITEMENT.
- CERTAINS TROUBLES MENTAUX.
- CERTAINES CIRRHOSSES.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISE EN GARDE

- il est conseillé de suivre un régime riche en protéine et en calcium et pauvre en sucre.
- Prévenir votre médecin de toute maladie, surtout en cas d'hypertension artérielle, de diabète, d'ostéoporose, d'ulcère digestif (estomac, intestin, colon) récent ou ancien, d'insuffisance rénale.

ZOLUS® 20 mg

-Oméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Pour d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

LOT : 4125
PER : 10-25
P.P.V : 95 DH 40

Normalement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres si les signes de leur maladie sont identiques effet indésirable, parlez-en à votre médecin à tout effet indésirable qui ne serait pas

les gastro-résistants en gélule et dans quels

- Quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Comment prendre ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons - code ATC : A02BC01

ZOLUS contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures,
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique),
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère,
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). ZOLUS peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS,
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$

Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule :

Si vous êtes allergique à l'omeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzaprazole, rabéprazole, ésoméprazole).

Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas ZOLUS. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ZOLUS.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ZOLUS.

ZOLUS peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre ZOLUS ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez

informez immédiatement votre médecin.

- Vous perdez du poids.
- Vous avez des crampes.
- Vous vomissez.
- Vous avez des diarrées.
- Vous souffrez d'une faible augmentation de la tension artérielle.
- Si vous avez de la fièvre.
- S'il vous est difficile de faire des toilettes.
- Vous devez faire des toilettes trop souvent.

Si vous prenez ZOLUS, surveillera probablement vos symptômes et évoquera avec votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons pendant une période supérieure à 8 semaines peut entraîner des douleurs dans la hanche, du poignet ou de l'épaule, d'ostéoporose ou d'ostéoporose.

Si vous avez une éruption cutanée, prévenez votre médecin. Il peut traiter avec un autre médicament si l'effet indésirable tel que l'urticaire.

Enfants

Certains enfants peuvent développer des effets indésirables à long terme bien que les effets indésirables soient rares.

Autres médicaments

Informez votre médecin si vous prenez tout autre médicament.

Achetez sans ordonnance des médicaments et conservez-les dans un endroit sûr.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament pour traiter une affection autre que celle pour laquelle il a été prescrit.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez les médicaments suivants :

- Kétoconazole (utilisé pour traiter les infections fongiques).
- Digoxine (utilisé pour traiter certaines maladies cardiaques).
- Diazépam (utilisé pour traiter les crises convulsives et les malaises musculaires).
- Phénytoïne (utilisée pour traiter certaines maladies nerveuses et musculaires).
- Médicaments anti-vitamines K (utilisés pour empêcher l'arrêt de l'hémorragie).
- Rifampicine (utilisée pour traiter certaines maladies bactériennes).
- Atazanavir (utilisé pour traiter le VIH).
- Tacrolimus (utilisé pour empêcher l'organisme de rejeter un greffon).
- Millepertuis (utilisé pour traiter l'insomnie modérée).
- Cilostazol (utilisé pour traiter la maladie d'angine de poitrine).
- Saquinavir (utilisé pour traiter le VIH).
- Clopidogrel (utilisé pour empêcher les malades cardiaques de faire des malades cardiaques).
- Erlotinib (utilisé pour traiter certains types de cancer).
- Méthotrexate (utilisé pour traiter certains types de cancer).

Si votre médecin vous prescrit ZOLUS, il est important que vous prenez ce médicament temporairement.

ZOLUS 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule.

Voir rubrique 3.

Grossesse, allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte, contactez votre médecin.

L'oméprazole peut influencer sur l'enfant.

Votre médecin peut vous donner des renseignements supplémentaires.

Gentamyc

COMPOSITIONS

Gentamicine (DCI) sulfate

2 ml

40 mg

ou 80 mg

LOT 213A

EXP 05/25

PPV 81DH40

- Boîte unitaire.
- Boîte unitaire et
- Boîte unitaire et
- Boîte unitaire et

TIQUE

des aminoglycosides.

TANT

Zone industrielle, Casablanca, Maroc, Route Régionale N°
(ex R.S 111) Km 12.400 Ain Harrouda 28630 Mohammedia

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Les indications sont limitées aux infections à bacilles Gram négatifs. La gentamicine, associée à un autre

Leflox PHARMA 5®

Lévofoxacine

500 mg comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes

LOT : 5946

PER : 07 - 26

P.P.V. : 11 DH 00

besoin de la relire.
Rappelez votre médecin, ou

ent prescrit. Ne le donnez

pas à une autre personne, même si les

signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Leflox PHARMA 5® 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Leflox PHARMA 5® 500 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Leflox PHARMA 5® 500 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Leflox PHARMA 5® 500 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE Leflox PHARMA 5® 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antibiotiques de la famille des quinolones, fluorquinolones.

Leflox PHARMA 5® contient une substance active appelée la lévofoxacine. Elle appartient à un groupe de médicaments appelés antibiotiques. La lévofoxacine est un antibiotique de type «quinolone». Elle agit en tuant les bactéries responsables d'infections dans votre organisme.

Leflox PHARMA 5® peut être utilisé pour traiter les infections des :

- Sinus
- Poumons, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires chroniques ou une pneumonie.
- Voies urinaires, notamment au niveau de vos reins ou votre vessie.

irréversibles. Il s'agit notamment de douleurs dans les tendons, les muscles et les articulations des membres supérieurs et inférieurs, de difficultés à marcher, de sensations anormales telles que des fourmillements, des picotements, des chatouillements, un engourdissement ou une sensation de brûlure (paresthesies), de troubles sensoriels incluant des troubles de la vue, du goût¹, de l'odorat et de l'audition, d'une dépression, de troubles de la mémoire, d'une fatigue intense et de troubles sévères du sommeil. Si vous présentez l'un de ces effets indésirables après avoir pris ce médicament, contactez immédiatement votre médecin avant de poursuivre le traitement. Vous décidez avec votre médecin de la poursuite de votre traitement en envisageant également le recours à un antibiotique d'une autre famille.

Autres médicaments et Leflox PHARMA 5® 500 mg, comprimé pelliculé : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Ceci car Leflox PHARMA 5® peut affecter le mode d'action d'autres médicaments. De même, certains médicaments peuvent influer sur l'effet de Leflox PHARMA 5®.

En particulier, prévenez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants car ils peuvent augmenter le risque que vous présentiez des effets indésirables, lorsqu'ils sont pris avec Leflox PHARMA 5® :

- Corticoïdes, parfois appelés stéroïdes, utilisés contre l'inflammation. Vous avez plus de risques de développer une inflammation et/ou une rupture de vos tendons.
- Warfarine, utilisée pour fluidifier le sang. Vous pouvez présenter plus de risques de saignements. Votre médecin vous fera faire des contrôles sanguins réguliers pour vérifier la qualité de la coagulation de votre sang.
- Théophylline, utilisée pour les problèmes respiratoires. Vous avez plus de risques de faire une crise d'épilepsie (convulsions) si vous la prenez avec Leflox PHARMA 5®.

• Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fenbufène, le kétoprofène, l'indométabacine. Vous avez plus de risques de faire une crise d'épilepsie (convulsions) s'ils sont pris avec Leflox PHARMA 5®.

- Ciclosporine, utilisée après les transplantations d'organes. Vous pouvez avoir plus de risques de présenter les effets indésirables de la ciclosporine.
- Médicaments connus pour pouvoir modifier le rythme cardiaque.

Ceci comprend les médicaments utilisés pour les anomalies du rythme cardiaque, les maladies cardiaques et les maladies vasculaires.

indésirables graves suivants - vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical en urgence :

Rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000)

• Diarrhée liquide pouvant contenir du sang, éventuellement avec des crampes d'estomac et une température élevée. Elle peut être le signe d'un problème intestinal sévère.

• Douleur et inflammation de vos tendons ou ligaments, pouvant entraîner une rupture. Le tendon d'Achille est le plus souvent affecté.

• Crises d'épilepsie (convulsions).

• Impressions visuelles ou auditives non réelles (hallucinations, paranoïa), modification de votre opinion et de vos pensées (réactions psychotiques) avec un risque de pensées suicidaires et de passage à l'acte.

• Sensation de dépression, problèmes mentaux (agitation), rêves anormaux ou cauchemars.

• Éruption généralisée, température du corps élevée, augmentation des taux d'enzymes hépatiques, anomalies des analyses sanguines (éosinophilie), élargissement des ganglions lymphatiques et atteinte d'autres organes du corps (réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques, aussi appelée DRESS ou syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse). Voir aussi la rubrique 2.

• Syndrome associé à une altération de l'excrétion d'eau et à de faibles taux de sodium (syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique [SIADH]).

• Baisse du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) ou baisse du taux de sucre dans le sang entraînant un coma (coma hypoglycémique). Ceci est important pour les personnes diabétiques.

Très rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10 000)

• Brûlures, picotements, douleur ou engourdissement. Ils peuvent être les signes de ce que l'on appelle une «neuropathie».

Inconnu (fréquence ne pouvant être estimée au vu des données disponibles)

• Éruptions cutanées graves, incluant le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique. Elles peuvent se présenter sur le buste sous la forme de taches rougeâtres en forme de cible ou de plaques circulaires comportant souvent des cloques en leur centre, décollement de la peau, ulcérations de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et des yeux, et peuvent être précédées de fièvre et de symptômes pseudo-grippaux. Voir aussi la rubrique 2.

• Perte d'appétit, jaunissement de la peau et des yeux, urines foncées, diarrhée foncée et/ou étouffement (dyspnée). Ce sont

Leflox PHARMA[®]

Lévofoxacine

500 mg comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement

avant de prendre ce médicament.

soin de la relire.

ez votre médecin, ou

LOT : 5946
PER : 07 - 26
P.P.V : 11 DH 00

prescrit. Ne le donnez

à d'autres personnes.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que Leflox PHARMA 5[®] 500 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Leflox PHARMA 5[®] 500 mg, comprimé pelliculé ?
- Comment prendre Leflox PHARMA 5[®] 500 mg, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Leflox PHARMA 5[®] 500 mg, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE Leflox PHARMA 5[®] 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antibiotiques de la famille des quinolones, fluoroquinolones.

Leflox PHARMA 5[®] contient une substance active appelée la lévofoxacine. Elle appartient à un groupe de médicaments appelés antibiotiques. La lévofoxacine est un antibiotique de type «quinolone». Elle agit en tuant les bactéries responsables d'infections dans votre organisme.

Leflox PHARMA 5[®] peut être utilisé pour traiter les infections des :

- Sinus
- Poumons, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires chroniques ou une pneumonie.
- Voies urinaires, notamment au niveau de vos reins ou votre vessie.

irréversibles. Il s'agit notamment de douleurs dans les tendons, les muscles et les articulations des membres supérieurs et inférieurs, de difficultés à marcher, de sensations anormales telles que des fourmillements, des picotements, des chatouilllements, un engourdissement ou une sensation de brûlure (paresthesies), de troubles sensoriels incluant des troubles de la vue, du goût, de l'odorat et de l'audition, d'une dépression, de troubles de la mémoire, d'une fatigue intense et de troubles sévères du sommeil. Si vous présentez l'un de ces effets indésirables après avoir pris ce médicament, contactez immédiatement votre médecin avant de poursuivre le traitement. Vous décidez avec votre médecin de la poursuite de votre traitement en envisageant également le recours à un antibiotique d'une autre famille.

Autres médicaments et Leflox PHARMA 5[®] 500 mg, comprimé pelliculé : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Ceci car Leflox PHARMA 5[®] peut affecter le mode d'action d'autres médicaments. De même, certains médicaments peuvent influer sur l'effet de Leflox PHARMA 5[®].

En particulier, prévenez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants car ils peuvent augmenter le risque que vous présentez des effets indésirables, lorsqu'ils sont pris avec Leflox PHARMA 5[®] :

- Corticoïdes, parfois appelés stéroïdes, utilisés contre l'inflammation. Vous avez plus de risques de développer une inflammation et/ou une rupture de vos tendons.
- Warfarine, utilisée pour fluidifier le sang. Vous pouvez présenter plus de risques de saignements. Votre médecin vous fera faire des contrôles sanguins réguliers pour vérifier la qualité de la coagulation de votre sang.
- Théophylline, utilisée pour les problèmes respiratoires. Vous avez plus de risques de faire une crise d'épilepsie (convulsions) si vous la prenez avec Leflox PHARMA 5[®].
- Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fenbufène, le kétoprofène, l'indométabacine. Vous avez plus de risques de faire une crise d'épilepsie (convulsions) s'ils sont pris avec Leflox PHARMA 5[®].
- Ciclosporine, utilisée après les transplantations d'organes. Vous pouvez avoir plus de risques de présenter les effets indésirables de la ciclosporine.
- Médicaments connus pour pouvoir modifier le rythme cardiaque. Ceci comprend les médicaments utilisés pour les anomalies du rythme cardiaque (antiarythmiques tels que quinidiné,

indésirables graves suivants - vous pouvez avoir besoin d'un traitement médical en urgence :

Rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000)

• Diarrhée liquide pouvant contenir du sang, éventuellement avec des crampes d'estomac et une température élevée. Elle peut être le signe d'un problème intestinal sévère.

• Douleur et inflammation de vos tendons ou ligaments, pouvant entraîner une rupture. Le tendon d'Achille est le plus souvent affecté.

• Crises d'épilepsie (convulsions).

• Impressions visuelles ou auditives non réelles (hallucinations, paranoïa), modification de votre opinion et de vos pensées (réactions psychotiques) avec un risque de pensées suicidaires et de passage à l'acte.

• Sensation de dépression, problèmes mentaux (agitation), rêves anormaux ou cauchemars.

• Éruption généralisée, température du corps élevée, augmentation des taux d'enzymes hépatiques, anomalies des analyses sanguines (éosinophilie), élargissement des ganglions lymphatiques et atteinte d'autres organes du corps (réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques, aussi appelée DRESS ou syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse). Voir aussi la rubrique 2.

• Syndrome associé à une altération de l'excrétion d'eau et à de faibles taux de sodium (syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique [SIADH]).

• Baisse du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie) ou baisse du taux de sucre dans le sang entraînant un coma (coma hypoglycémique). Ceci est important pour les personnes diabétiques.

Très rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10 000)

• Brûlures, picotements, douleur ou engourdissement. Ils peuvent être les signes de ce que l'on appelle une «neuropathie».

Inconnu (fréquence ne pouvant être estimée au vu des données disponibles)

• Éruptions cutanées graves, incluant le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrose épidermique toxique. Elles peuvent se présenter sur le buste sous la forme de taches rougeâtres en forme de cible ou de plaques circulaires comportant souvent des cloques en leur centre, décollement de la peau, ulcérations de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et des yeux, et peuvent être précédées de fièvre et de symptômes pseudo-grippaux. Voir aussi la rubrique 2.

• Perte d'appétit, jaunissement de la peau et des yeux, urines foncées, démangeaisons ou estomac sensible (abdomen). Ce sont des symptômes de problèmes au niveau du foie notamment.

7654

Le : 12/11/23

Bilan Biologique

med. 12/11/23

Nom/Prenom : MOUSSA
HAMOUD

Age : _____ Sexe : H F

SANG :

- Groupe
- Rhésue
- NFS / plaquettes
- VS
- CRP
- Cholestérol total, HDL, LDL
- Triglycérides
- Uricémie et urate
- Véritéurie et bilirubine totale
- HbA1c
- Ferritine
- Vitamine D
- Electrophorèse sanguine
- Urée
- Acide urique
- Crétatine
- DFG
- ASAT
- ALAT
- Phosphatases alcalines
- Gamma GT
- Electrophorèse des protéines
- TSH us
- T3, T4

URINE :

- Diurèse des 24h
- Protéinurie des 24h
- Crétatine des 24h
- ECBU et antibiogramme
- Ionogramme urinaire

SELLES :

- Coprologie des selles
- Parasitologie des selles

BILAN ALLERGOLOGIQUE :

- IgE totales
- IgE spécifiques :
.....

Autres :

pas de bilan social

*Centre de Radiologie et Gufta
Baboum Radi - Rue 5000
Casablanca - 20220
Tel: 0522 93 04 73*



CENTRE DE RADIOLOGIE EL OULFA

Docteur Fatiha LASRI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spcialisé-Nancy II.

Ex médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam.

Docteur Bouchaib ELMDARI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spcialisé-Nancy II

Ex médecin attaché au CHU Ibn Rochd

Casablanca, le 12/12/2023

FACTURE N°12728/2023

NOM & PRENOM: MOULOUDI HAMID

EXAMEN	MONTANT
RX. THORAX FACE	200 DH
TOTAL	200 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :DEUX CENTS DH TTC



Bd. Oued Oum Rabii – Rue 50, N°2- Oulfa – 20220 Casablanca
Tél. : 0522 93 04 93 / 05 22 93 05 93 / 05 22 93 32 99 – Fax 0522 93 563 Capital: 100 000, 00
Dhs - RC: SCP – TP: 37989156 – IF: 4049398 – ICE: 001581917000057
E-mail: radiologie-oulfa@com

Docteur Fatiha LASRI
Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité – Nancy II
- Ex Médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam

- Scanner Spirale Corps Entier
- Dentascanner - Panoramique Dentaire
- Echographie Générale

- Echographie-Doppler Couleur
- Echographie Ostéo Articulaire
- Radiologie Numérisée

Dr Bouchaïb EL MDARI
Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité – Nancy II
- Ex-Médecin attaché au CHU Ibn Rochd

- Ostéodensitométrie
- Mammographie Numérisée
- Radiographie Rachis Entier
- Radio - Photo

Casablanca , le 12/12/2023

PATIENT

: MOULOUDI HAMID

MEDECIN TRAITANT

: DR. CHADLI ABDELAZIZ

EXAMEN(S) REALISE(S)

: RX. THORAX FACE

RADIOLOGIE EL OULFA

- Absence de foyer parenchymateux évolutif.
- Culs de sac pleuraux libres.
- Silhouette médiastino-cardiaque sans particularité.
- Cardiomégalie avec RCT à 0.54.

Conclusion :

- Cardiomégalie : A confronter au bilan cardiaque.

Confraternellement

DR. ELMDARI BOUCHAIB

N.C*

Bouchaïb EL MDARI
Médecin Radiologue
Centre de Radiologie El Oulfa
Bd. Oum Rabii - Rue 50 N°2
Casablanca - 20220
Tel : 05 22 93 04 93