

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

M22- 0056482

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1727 Société :  
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :  
 Nom & Prénom : Ben Brahim Assiya  
 Date de naissance : 02-02-1951  
 Adresse : Bous-Koura golf city, Im 15 Apt 2 Bouskoura  
 Tél. : 0522590324 Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :  
 Date de consultation : 15/03/2023  
 Nom et prénom du malade : Ben Brahim Assiya Age : 72 ans  
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
 Nature de la maladie : Dyslipémie  
 Affection longue durée ou chronique ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : 19/12/2023

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019







**Dr. Driss BERRADA**  
*Cardiologue*

**الدكتور ادريس برادة**  
اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

Ex. Attaché au Service de  
cardiologie du  
CHU Hassan II de Fès

- Echocardiographie
- Epreuve d'Effort
- Holter ECG
- Holter Tensionnel



Fès, le .....

**25/10/2023**

**Mme BEN BRAHIM ASSIYA 72 ans**

### ORDONNANCE

1/4, 10x4

**ROSUVAS SUN 10 MG**

1 cp le soir après repas

30, 70x4

**KARDEGIC 75MG**

1 sachet au milieu du déjeuner

TT DE QUATRE MOIS

Tél : 05 35 93 20 76

GSM : 06 61 34 10 70

**PHARMACIE L'AMITIE**  
**Dr. Karim FASSI FEHRI**  
Bd Med El Fassi, N° 232 Hay Adarissa  
- FES -  
TEL : 05 35 60 91 39



Av. Slaoui, N° 64, Bureaux des Palmiers, 1er étage N°8 (en face du Club de l'enseignement) - Fès  
64، شارع السلاوي، مكاتب النخيل الطابق الأول، رقم 8 ( أمام نادي التعليم ) - فاس



صان

روزوقاس®

ROSUVAS® SUN 10 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés



روزوقاساتین

LOT  
230090

EXP  
03/2025

PPV:154DH10

10 م

30 قرص  
عن طريق



صان

روزوقاس®

ROSUVAS® SUN 10 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés



روزوقاساتین

LOT  
230090

EXP  
03/2025

PPV:154DH10

10 م

30 قرص

عن طريق



صان

روزوقاس®

ROSUVAS® SUN 10 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés



روزوقاساتین

LOT  
230090

EXP  
03/2025

PPV:154DH10

10 م

30 قرص

عن طريق





صان

روزوقاس®

ROSUVAS® SUN 10 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés



روزوقاس تاتين

LOT  
230090

EXP  
03/2025

PPV:154DH10

10 م

30 قرص  
عن طريق

# كارديجيك

NOFI

ar elle

LOT : 23E005  
PER : 09 2024

KARDEGIC 75MG  
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



6 118000 061847

DANS

**Titulaire de l'AMM :** sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,  
Casablanca - Maroc.

**Lahcen BOUCHAQUIR, Pharmacien Responsable.**  
**Fabricant :** sanofi-aventis Maroc

km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -  
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

- mi.
- \* si vous souffrez d'une maladie de la même famille que l'aspirine.
- anti-inflammatoire.
- si vous êtes enceinte, à partir du début du 6<sup>ème</sup> mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour,
  - si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS),
  - si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum,
  - si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens),
  - si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,
  - si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
  - si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

#### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

#### **Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :**

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),
- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- si vous avez une maladie des reins ou du foie,
- si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),
- si vous avez des règles abondantes.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.



# كارديجيك

NOFI

ar elle

LOT : 23E005  
PER : 09 2024

KARDEGIC 75MG  
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



6 118000 061847

DANS

**Titulaire de l'AMM :** sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,  
Casablanca - Maroc.

**Lahcen BOUCHAQUIR,** Pharmacien Responsable.

**Fabricant :** sanofi-aventis Maroc  
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -  
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

- mi.
- \* si vous souffrez d'une maladie de la même famille que l'aspirine.
- anti-inflammatoire.
- si vous êtes enceinte, à partir du début du 6<sup>ème</sup> mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour,
  - si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS),
  - si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum,
  - si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens),
  - si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,
  - si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
  - si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

#### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

#### **Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :**

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),
- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- si vous avez une maladie des reins ou du foie,
- si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),
- si vous avez des règles abondantes.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

# كارديجيك

NOFI

ar elle

LOT : 23E005  
PER : 09 2024

KARDEGIC 75MG  
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



6 118000 061847

DANS

**Titulaire de l'AMM :** sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,  
Casablanca - Maroc.

**Lahcen BOUCHAQUIR,** Pharmacien Responsable.

**Fabricant :** sanofi-aventis Maroc  
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -  
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

- mi.
- \* si vous souffrez d'une maladie de la même famille que l'aspirine.
- anti-inflammatoire.
- si vous êtes enceinte, à partir du début du 6<sup>ème</sup> mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour,
  - si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS),
  - si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum,
  - si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens),
  - si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,
  - si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
  - si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

#### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

#### **Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :**

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),
- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- si vous avez une maladie des reins ou du foie,
- si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),
- si vous avez des règles abondantes.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

# كارديجيك

NOFI

ar elle

LOT : 23E005  
PER : 09 2024

KARDEGIC 75MG  
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



6 118000 061847

DANS

**Titulaire de l'AMM :** sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat R.P.1 BP2611 - Aïn Sebaâ 20250,  
Casablanca - Maroc.

**Lahcen BOUCHAQUIR,** Pharmacien Responsable.

**Fabricant :** sanofi-aventis Maroc  
km 10, route côtière 111, Quartier industriel Zenata -  
Aïn Sebaâ 20250 Casablanca - Maroc.

- mi.
- \* si vous souffrez d'une maladie de la même famille que l'aspirine.
- anti-inflammatoire.
- si vous êtes enceinte, à partir du début du 6<sup>ème</sup> mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée) pour des doses supérieures à 100 mg par jour,
  - si vous avez ou avez déjà eu de l'asthme ou des polypes nasaux associés à un asthme provoqué par la prise d'aspirine ou d'un médicament de la même famille (les AINS),
  - si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum,
  - si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens),
  - si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a identifié chez vous des risques de saignements,
  - si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,
  - si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

#### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.

#### **Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :**

- si vous avez une maladie héréditaire des globules rouges, appelée déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,
- si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou du duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),
- si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),
- si vous avez une maladie des reins ou du foie,
- si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),
- si vous avez des règles abondantes.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose.



# Dr. Driss BERRADA

Nom : BEN BRAHIM ASSIYA

Sex: femell Lit No:


Age: 72A Date: 25/10/2023 12:46:41

SN: 000759 Section:


Cli No.: CaseNo.:

Fréquence:	1000Hz	QT Interval:	399ms
Temps d'écha	18s	QTc Interval:	425ms
FC:	68bpm	P Axis:	12.40°
P Interval:	95ms	QRS Axis:	-37.90°
QRS Interval:	76ms	T Axis:	-16.60°
T Interval:	191ms	RV5/SV1	0.16/0.37mV
PR Interval:	161ms	RV5+SV1	0.54mV

Prompt:



Docteur:



00:04 AC+DFT+EMG 25mm/s 10mm/mV