

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0046041

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

192280 Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0453 Société : R.A.M. Retraite

Actif Pensionné(e) Autre : MOKRĀT M. M'HAMED

Nom & Prénom : MOKRĀT M. M'HAMED

Date de naissance : 01.01.1943

Adresse : HAY moulay Abdellah N° 454

Dim el-hor Casablanca

Tél. : 0659381534 Total des frais engagés : 842100 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr MOUSTAFA EL IDRISI AMAL
Pneumo Physiologue
1er Etage Bd Jaza N°3 Ifara 2
Ain Chock - Casablanca
tel: 05 22 52 19 01

Date de consultation : 25/01/2024

Nom et prénom du malade : FAÏMA MACHHOUA Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : ALD ALC Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 26 JAN 2024

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/10/24	CS	.	300 Dhs	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE LUMIERES LAHRACH SARL AU 30, Bd. Mohamed V, Casablanca, Ain Chok Tel. 05 22 52 40 29 INN: 092040427	25/01/2024	512,42

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

A diagram of a dental arch (maxilla) with numbered teeth (1-8 on each side) and a coordinate system. The vertical axis is labeled 'H' at the top, the horizontal axis to the left is labeled 'D', the horizontal axis to the right is labeled 'G', and the vertical axis at the bottom is labeled 'B'. The teeth are numbered 1 through 8 on both the upper and lower arches, with 1 at the midline and 8 at the second molar. The diagram shows the relationship between the teeth and the coordinate system.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Asthme - Tuberculose - Allergie
Bronchoscopie
Tests cutanés - EFR (spirométrie)
Pathologie du sommeil

HARMACIE LUMIERES
LAHRICH SARL AU
30, Bd. Al Qods, Inara, Ain Chok
Casablanca - INPE : 092040427
Télé: 05 22 52 40 29

الضيق - السل - الحساسية
الشخص بالمنظار
فحص وظائف الرئة
أمراض النوم
اختبار الحساسية

Casa Le : 25/01/2024 الدار البيضاء

95,00

Fatima NACHOURE

11. effusion 500

(SV)

بعد الوجبات زادت

170,00

21. effusion 200

(SV)

بعد الوجبات زادت

6j

185,00

31. oxytose 200

(SV)

(x 10)

92,40

41. Défa 30 - 8

(SV)

زادت في النهار

542,40

Dr. MOUSTARHFIR
Pneumo Physiologist
1er étage, Bd Taza N° 3 Inara 2, Ain chock Casablanca
Télé: 05 22 52 40 29

الطريق الأول، شارع تازة، الرقم 3، إنارة 2، عين الشق - الدار البيضاء

1er Etage, Bd Taza N° 3 Inara 2, Ain chock Casablanca

Tél.: +212 522 521 901 / Gsm : +212 663 407 724 / E-mail : a.elidrissim@yahoo.fr

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DEFAX® 30 mg, comprimés sécables Déflazacort

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut avoir des effets indésirables.
- Si l'un des effets indésirables détaillés dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

PPV: 92,40 DH

DEFAX® 30 mg
Déflazacort

10 comprimés sécables



Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que DEFAX® 30 mg
2. Quelles sont les informations
3. Comment prendre DEFAX® 30 mg
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver DEFAX® 30 mg
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE DEFAX® 30 mg, comprimés sécables ? DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DEFAX® 30 mg appartient au groupe des médicaments appelé corticostéroïdes.

Les corticostéroïdes sont des hormones produites dans le corps et influencent des processus cellulaires. D'autre part, les corticostéroïdes sont également de puissants médicaments qui sont utilisés lors de maladies organiques impliquant des réactions inflammatoires ou les défenses immunitaires. Ils peuvent aider à réduire les réactions inflammatoires et allergiques.

Lorsque les corticostéroïdes sont utilisés durant une longue période, ils peuvent causer des effets indésirables.

Les comprimés DEFAX® 30 mg ne doivent être utilisés que sur prescription médicale pour traiter les maladies suivantes :

- Maladies rhumatismales et du collagène ;
- Allergies sévères (asthme bronchique) ou réactions allergiques ne répondant pas aux médicaments habituels ;
- Affections cutanées, telles que l'eczéma et la psoriasis ;
- Certaines maladies inflammatoires de la rétine et de la choroïde de l'œil ;
- Certaines maladies du sang ;
- Certaines maladies des voies respiratoires ;
- Certaines maladies inflammatoires de l'intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse) ;
- Certaines maladies rénales ou formes sévères d'inflammation du foie.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT ?

EFLOXIN® 500 mg

Lévofoxacine

Comprimés pelliculés sécables - Boîte de 7

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament

EFLOXIN 500 mg : Chaque comprimé pelliculé sécable contient 500 mg de substance active : Lévofoxacine (sous forme de Lévofoxacine hémihydraté : 512,46 mg).

Excipients : cellulose microcristalline, cellulose en poudre, amidon de maïs prégalatinisé, amidon de maïs, crospovidone Type A, povidone K25, sodium stéaryl fumarate, Opadry II31F3243 (Lactose monohydrate, Hydromellose 15 cP, Titanium dioxide, Macrogol PEG 4000, Oxyde de fer jaune- E172, Oxyde de fer rouge - E172, Oxyde de fer noir - E172.)

Excipients à effet notoire : Sodium, Lactose.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Classe pharmacothérapeutique : antibiotiques de la famille des quinolones, fluoroquinolones : code ATC : J01MA12.

Le nom de votre médicament est EFLOXIN comprimé pelliculé

secable. EFLOXIN comprimé contient une substance active appelée la lévofoxacine. Elle appartient à un groupe de médicaments appelés antibiotiques. La lévofoxacine est un antibiotique de type « quinolone ». Elle agit en tuant les bactéries responsables d'infections dans votre organisme.

3. Indications thérapeutiques

EFLOXIN peut être utilisé pour traiter les infections des :

- Sinus.
- Poumons, chez les personnes ayant des problèmes respiratoires chroniques ou une pneumonie.
- Voies urinaires, notamment au niveau de vos reins ou votre vessie.
- Prostate, lorsque vous avez une infection qui dure.
- Peau et tissus sous-cutanés, y compris les muscles. C'est ce que l'on appelle parfois les « tissus mous ».

Dans certaines situations particulières, EFLOXIN comprimé peut être utilisé pour diminuer les risques de contracter une maladie pulmonaire appelée maladie du charbon ou les risques d'aggravation de la maladie après exposition à la bactérie responsable de la maladie du charbon.

4. Posologie :

VEILLEZ A TOUJOURS PRENDRE CE MEDICAMENT EN SUivant EXACTEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE MEDECIN. VERIFIEZ AUPRES DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN EN CAS DE DOUTE.

Comment prendre ce médicament ?

- Ce médicament doit être pris par la bouche.

• Avez les comprimés entiers avec de l'eau.

• Les comprimés peuvent être pris au

prise d'EFLOXIN, consultez immédiatement un ophtalmologiste.

Prévenez votre médecin si l'un des effets indésirables suivants s'aggrave ou dure plus de quelques jours :

Fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

• Troubles du sommeil.

• Maux de tête, sensation d'étourdissement.

• Sensation de malaise (nausées, vomissements) et diarrhée.

• Augmentation du niveau de certaines enzymes hépatiques dans votre sang.

Peu fréquent (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

• Modifications du nombre des autres bactéries ou champignons, infections par des champignons dans les résultats de

• Modifications certaines fois dans les résultats de

• Sensation de pression dans le nez et la tête qui tourne (vertiges).

• Souffre ou constipation

• Modifications douleurs et démanie

• Démanie transpiratif et douleur

• Les tissus problèmes de la crête et faibles

• Rare (peut être ou tendance à la diminution du

• Diminution de la quantité de globules blancs (neutropénie).

• Réponse immunitaire exagérée (hypersensibilité).

• Baisse du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Ceci est important pour les personnes diabétiques.

• Impressions visuelles ou auditives non réelles (hallucinations, paranoïa), modification de votre opinion et de vos pensées (réactions psychotiques) avec un risque de pensées suicidaires et de passage à l'acte.

• Sensation de dépression, problèmes mentaux, (agitation), rêves anormaux ou cauchemars.

• Sensation de picotements dans les mains et les pieds (paresthesies).

• Problèmes d'audition (bourdonnement d'oreille) ou de vision (vision trouble).

• Battements inhabituellement rapides du cœur (tachycardie) ou tension artérielle basse (hypotension).

• Faiblesse musculaire. Ceci est important chez les personnes atteintes de myasthénie (une maladie rare du système nerveux).

• Modifications du fonctionnement des reins et insuffisance rénale occasionnelle qui peut être due à une réaction allergique au niveau du rein appelée néphrite interstitielle.

• Fièvre.

Inconnu (fréquence ne pouvant être estimée au vu des données disponibles) :

• Baisse des globules rouges (anémie) : ceci peut provoquer une pâleur de la peau ou lui donner une couleur jaune à la suite d'une atteinte des globules rouges : baisse du nombre de tous les types de cellules sanguines.

- Interactions avec d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment ou pourrez prendre tout autre médicament. Ceci car EFLOXIN peut à mode d'action d'autres médicaments. De même, certains médicaments peuvent influer sur l'effet d'EFLOXIN.

En particulier, prévenez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants. Ceci car ils peuvent augmenter le risque que vous présentiez des indésirables, lorsqu'ils sont pris avec EFLOXIN :

- Corticoïdes, parfois appelés stéroïdes - utilisés contre l'inflammation. Vous avez plus de risques de développer une inflammation et/ou une rupture de vos tendons.
- Warfarine - utilisée pour fluidifier le sang. Vous pouvez présenter plus de risques de saignements. Votre médecin vous fera faire des contrôles sanguins réguliers pour vérifier la qualité de la coagulation de votre sang.
- Théophylline - utilisée pour les problèmes respiratoires. Vous avez plus de risques de faire une crise d'épilepsie (convulsion) si vous la prenez avec EFLOXIN.

- Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fenbufénone, le kétorolac, l'indométhacine. Vous avez plus de risques de faire une crise d'épilepsie (convulsion) si vous prenez avec EFLOXIN.
- Ciclosporine - utilisée après les transplantations d'organes. Vous pouvez avoir plus de risques de présenter les effets indésirables de la ciclosporine.

- Médicaments connus pour pouvoir modifier le rythme cardiaque. Ceci comprend les médicaments utilisés pour les anomalies du rythme cardiaque (antiarythmiques tels que quinidine, hydroquinidine, disopyramide, sotalol, dofetidole, ibutilide et amiodarone), pour la dépression (antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline et l'imipramine), pour les troubles psychiatriques (antipsychotiques) et pour les infections bactériennes (antibiotiques de la famille des « macrolides », tels que l'érythromycine, l'azitromycine et la clarithromycine).

- Probenécide - utilisé pour la goutte, il est possible que votre médecin vous recommande une dose plus faible si vous avez des problèmes rénaux.

- Cimétidine - utilisée pour les ulcères et les brûlures d'estomac. Votre médecin pourra vous donner une dose plus faible si vous avez des problèmes rénaux. Informez votre médecin si l'un des cas ci-dessus s'applique à votre cas.

Ne prenez pas EFLOXIN comprimé en même temps que les médicaments suivants. Ceci car le mode d'action d'EFLOXIN comprimé peut en être affecté :

- Comprimés de fer (pour l'anémie), suppléments à base de zinc, antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium (pour l'acidité ou les brûlures gastriques), didanosine ou suratafate (pour les ulcères de l'estomac). Voir rubrique 4 (posologie) : Si vous prenez déjà des comprimés de fer, des antiacides ou du suratafate.

- Test urinaire pour détecter les opiacés

Chez les personnes prenant EFLOXIN, les tests urinaires peuvent donner des résultats « faussement positifs » lors de la détection des antalgiques forts appelés « opiacés ». Si votre médecin vous a prescrit un test urinaire, prévenez-le que vous prenez EFLOXIN.

- Test de la tuberculose

Ce médicament peut rendre des résultats « faussement négatifs » lors de certains tests de laboratoire pour rechercher les bactéries responsables de la tuberculose.

3. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement

OFIKEN®

Céfixime

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

DENOMINATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre..... 200 mg

Excipients.....

q.s.p un comprimé pelliculé.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre..... 100 mg

Excipients.....

q.s.p 5 ml de suspension reconstituée.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

OFIKEN® 200 mg, comprimé pelliculé, boîtes de

OFIKEN® 100 mg/5 ml :

Poudre pour suspension buvable en flacon de 3

Poudre pour suspension buvable en flacon de 6

Poudre pour suspension buvable en flacon de 10

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines.

3^{ème} génération.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Comprimé pelliculé :

Ce médicament est indiqué dans le traitement

- Otites et sinusites aiguës,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Certaines infections urogénitales.

Poudre pour suspension buvable :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus

- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aiguës,
- Certaines infections urinaires.

ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Poudre pour suspension buvable et comprimé pelliculé :

- Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines, ou à l'un des excipients de ces médicaments.

Comprimé pelliculé :

- Enfant de moins de 12 ans.

