

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

0 Réclamation	: contact@mupras.com
0 Prise en charge	: pec@mupras.com
0 Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

Le MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2202

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Rahma

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Boutayna EL AZIFI
RHUMATOLOGUE
Sidi Maârouf Casablanca
05 22 58 19 58/05/2014/34 52

Date de consultation :

28/01/24

Nom et prénom du malade : EL GHARFAOUI FATNA Age :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/01/24	S		300DH	Docteur Boutayna RHUMAIS Sidi Maarouf Casablanca Tél.: 05 22 68 19 56/06 02 42 34 52

EXECUTION DES ORDONNANCES

PHARMACIE D'EDMUND LOUZ	INPF 092065044	DC MURKINID AMINA	N. 25/10/2024	Montant de la Facture
PHARMACIE D'EDMUND LOUZ	INPF 092065044	DC MURKINID AMINA	25/10/2024	937,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIGRAPHIES		Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	R x genoux (F)	200DN

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

The diagram illustrates the 12th edition of the International System of Numbered Teeth (ISO 3950). It shows a dental arch with 28 numbered teeth, arranged in four quadrants. The teeth are numbered sequentially from 1 to 32. The first quadrant (maxillary) contains teeth 1 through 8. The second quadrant (maxillary) contains teeth 9 through 16. The third quadrant (mandibular) contains teeth 17 through 24. The fourth quadrant (mandibular) contains teeth 25 through 32. The teeth are represented by small circles with numbers, and the arch is shown with a blue outline.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVISE

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Boutayna EL AZIFI

RHUMATOLOGUE

Maladies **des os, articulations**
et colonne vertébrale
Echographie ostéo-articulaire
Rhumatologie interventionnelle



دكتورة بثينة العزيزي

اختصاصية في :
 - أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم
 - العمود الفقري وهشاشة العظام
 - الفحص بالصدى

25/01/2024

Casablanca le :

Nom : Mme EL GHARFAOUI FATNA

76,60*2
ARIXIB 90MG **S.I.**

1 Comprimé le soir après le repas pendant 14 jours

22,20*2
CODOLIPRANE COMPRIME SECABLE 400 MG BOITE DE 16

1 Comprimé le matin 1 Comprimé le midi 1 Comprimé le soir après le repas pendant 10 jours

2,80,00*2
FLEXIMAX GELULES **S.I.**

1 Gélule le matin, 1 Gélule le soir après le repas pendant 2 mois

130,00
SINOVIX GEL **S.I.**

1 Application le matin, 1 Application le soir pendant 10 jours

1937,60
Dr. MUKHAID AMINA **S.I.**
Dr. MUKHAID AMINA
HARAMEE SINANE LULU
N°. 4 Imme. 7 Oued Azouz
Al Farih 2 - Casablanca
Dr. Boutayna EL AZIFI
RHUMATOLOGUE
Sidi Maârouf - Casablanca
Tél. 0522581956 0646017793
E-mail : boutayna.azifi@gmail.com

إقامة نعيم، شارع 1258، المداري، عمارة 4 شقة 6، سيدى معروف

Résidences NAIM, Bd Abou Bakr El Kadiri, Immeuble 4, apt 6, Sidi Maârouf

Tél. : 05 22 58 19 56 - 06 46 01 77 93 - E-mail : boutayna.azifi@gmail.com

sinovix



Le: 06/02/2024
12h00

EFFET
THERMIQUE

U10
FORMULE
SANS
CONSERVATEURS

GEL
ANTI - DOULEUR
Aux huiles essentielles

Dispositif Médical

120 ml

FLEXIMAX

FORME ET PRÉSENTATION

Boîte de 30 et 60 gélules

COMPOSITION (par gélule)

Substance active: Cartilage de requin

d'Harpagophytum 200mg

Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium

Capsule végétale en HPMC

PROPRIÉTÉS :

FLEXIMAX améliore la qualité du cartilage grâce à la combinaison du cartilage de requin et de l'Harpagophytum et permet ainsi un bien-être articulaire.

CONSEILS D'UTILISATION :

2 Gélules par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Femmes enceintes ou allaitantes, demandez conseil à votre médecin.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Food supplement, is not a medicine.

LOT: 2307010

FAB: 07/2023

EXP: 07/2026

PVC: 280.00DH



6 111261 530374

Fabriqué et
Distribué par : 

10 Rue Racine Valfleur, Maarif
Casablanca, Maroc

Site de Fabrication :
Commune Sahel Had Soualem

+212 522 23 22 51
contact@healthinnovation.ma
www.healthinnovation.ma

ONSSA N°: CAPV.59.21719
N°Enregistrement au ministère de la santé
DA20202002567DMP/20UCA/MA V2

FLEXIMAX

FORME ET PRÉSENTATION

Boîte de 30 et 60 gélules

COMPOSITION (par gélule)

Substance active: Cartilage de requin

d'Harpagophytum 200mg

Anti-agglomérant: Stéarate de magnésium

Capsule végétale en HPMC

PROPRIÉTÉS :

FLEXIMAX améliore la qualité du cartilage grâce à la combinaison du cartilage de requin et de l'Harpagophytum et permet ainsi un bien-être articulaire.

CONSEILS D'UTILISATION :

2 Gélules par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Femmes enceintes ou allaitantes, demandez conseil à votre médecin.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Food supplement, is not a medicine.

LOT: 2307010

FAB: 07/2023

EXP: 07/2026

PVC: 280.00DH



6 111261 530374

Fabriqué et
Distribué par : 

10 Rue Racine Valfleur, Maarif
Casablanca, Maroc

Site de Fabrication :
Commune Sahel Had Soualem

+212 522 23 22 51
contact@healthinnovation.ma
www.healthinnovation.ma

ONSSA N°: CAPV.59.21719
N°Enregistrement au ministère de la santé
DA20202002567DMP/20UCA/MA V2

Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Paracétamol.

Phosphate de codeïne hémihydraté

(Quantité correspondant à codeïne base)


Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre,

Codoliprane®

Paracétamol / Codeïne

400 mg/20 mg

Comprimés sécables



6 118000 040217

PPV: 22DH20

PER: 09/25

LOT: M2957

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité

l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codeïne. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).



Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Paracétamol.

Phosphate de codeïne hémihydraté

(Quantité correspondant à codeïne base)

Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre,

Codoliprane®

Paracétamol / Codeïne

400 mg/20 mg

Comprimés sécables



6 118000 040217

PPV: 22DH20

PER: 09/25

LOT: M2957

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité moyenne à forte, lorsque l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codeïne. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).



ARIXIB® 60 mg et 90 mg

Comprimé pelliculé en boîte de 7 et 14 Etoricoxib

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin

- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que ARIXIB®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ARIXIB®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Qu'est-ce que ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

ARIXIB®, comprimé pelliculé contient la substance active « etoricoxib ».

ARIXIB®, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

Ceux-ci appartiennent à une famille de médicaments nommée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quels cas ARIXIB®, comprimé pelliculé est-il utilisé ?

ARIXIB®, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients âgés de 16 ans et plus atteints d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.

ARIXIB®, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire chez les patients âgés de 16 ans et plus.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est une maladie des articulations. Elle résulte d'une altération progressive du cartilage qui protège les extrémités des os.

Elle entraîne un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité, une raideur et un handicap.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Elle provoque douleur, raideur, gonflement et perte progressive du mouvement des articulations atteintes. Elle peut entraîner également une inflammation d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la goutte ?

La goutte est une maladie qui se manifeste, au niveau des articulations, par des crises soudaines et récurrentes associant une inflammation, une rougeur et une très vive douleur. Elle est provoquée par des dépôts de cristaux minéraux dans les articulations.

Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante ?

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des articulations sacro-iliaques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais ARIXIB®, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'etoricoxib ou à l'un

LOT : 231868
EXP : 11/2026
PPV : 76,60 DH

ARIXIB® 90 mg

7 comprimés



6 118000 083313

(médicament pour traiter l'asthme)

• Pilule contraceptive (l'association d'effet secondaire),

• Traitement hormonal substitutif qui peut augmenter votre risque d'effets indésirables.

• Aspirine car le risque d'ulcère de l'estomac augmente lorsque vous prenez ARIXIB®, comprimé pelliculé.

- Aspirine en prévention d'un accident vasculaire cérébral. ARIXIB®, comprimé pelliculé peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral.

• Si vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère de l'estomac,

• Vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère de l'estomac,

• Vous êtes déshydraté(e), par exemple à cause d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée prolongée,

• Vous avez des cédermes dus à une rétention d'eau,

• Vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque,

• Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. ARIXIB®, comprimé pelliculé peut augmenter la tension artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses. Votre médecin peut être amené à contrôler votre tension artérielle plus régulièrement,

• Vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins,

• Vous avez des traitements anti-infectieux. ARIXIB®, comprimé pelliculé peut masquer une fièvre, qui peut être un signe d'infection,

• Vous avez du diabète, du cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque,

• Vous êtes une femme et souhaitez concevoir un enfant,

• Vous êtes âgée(e) de plus de 65 ans.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un de ces points vous concerne, contactez votre médecin avant de prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé pour vérifier que ce médicament est adapté à votre cas.

ARIXIB®, comprimé pelliculé est aussi efficace chez le sujet âgé que chez l'adulte jeune. Si vous êtes âgée(e) de plus de 65 ans, votre médecin assurera une surveillance adaptée. Aucun ajustement de posologie n'est nécessaire chez les patients âgés de plus de 65 ans.

(voir rubrique "Grossesse, allaitement et fertilité")

• Si vous êtes âgée(e) de moins de 16 ans,

• Si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, maladie de Crohn, recto-colite hémorragique ou

• Si vous présentez une hypertension artérielle par un traitement (vérifiez avec votre médecin) si vous n'êtes pas sûr(e) que votre pression artérielle est bien contrôlée),

• Si votre médecin vous a diagnostiquée une maladie à type d'insuffisance cardiaque (modérée ou si de poitrine (douleurs thoraciques),

• Si vous avez des antécédents de crise cardiaque, crise cardiaque, maladie des artères périphériques (mauvaise circulation dans les jambes et les pieds due à des artères rétrécies ou bouchées),

• Si vous avez eu un accident vasculaire cérébral, quelle que soit la sorte, y compris un accident ischémique transitoire). L'etoricoxib pourrait légèrement augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin au préalable.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé si :

• Vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère de l'estomac,

• Vous êtes déshydraté(e), par exemple à cause d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée prolongée,

• Vous avez des cédermes dus à une rétention d'eau,

• Vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque,

• Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. ARIXIB®, comprimé pelliculé peut augmenter la tension artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses. Votre médecin peut être amené à contrôler votre tension artérielle plus régulièrement,

• Vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins,

• Vous avez des traitements anti-infectieux. ARIXIB®, comprimé pelliculé peut masquer une fièvre, qui peut être un signe d'infection,

• Vous avez du diabète, du cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque,

• Vous êtes une femme et souhaitez concevoir un enfant,

• Vous êtes âgée(e) de plus de 65 ans.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un de ces points vous concerne, contactez votre médecin avant de prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé pour vérifier que ce médicament est adapté à votre cas.

ARIXIB®, comprimé pelliculé est aussi efficace chez le sujet âgé que chez l'adulte jeune. Si vous êtes âgée(e) de plus de 65 ans, votre médecin assurera une surveillance adaptée. Aucun ajustement de posologie n'est nécessaire chez les patients âgés de plus de 65 ans.

Le passage de l'etoricoxib dans le lait maternel n'a pas été établi.

Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter avant de prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé, contactez votre pharmacien.

Grossesse, allaitement et fertilité

Les comprimés pelliculés d'ARIXIB® sont contre-indiqués pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou en cas de désir de grossesse, contactez votre pharmacien.

Si vous n'êtes pas sûre que l'un de ces points vous concerne, contactez votre pharmacien.

Fertilité

ARIXIB®, comprimé pelliculé n'est pas contre-indiqué chez les femmes qui essaient de concevoir.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

La prise d'ARIXIB®, comprimé pelliculé peut entraîner des étourdissements et une somnolence.

Ne conduisez pas si vous ressentez une somnolence.

N'utilisez ni ouïez ni marchez si vous ressentez des étourdissements ou une somnolence.

ARIXIB®, comprimé pelliculé peut entraîner des étourdissements et une somnolence.

Si votre pharmacien vous a informé(e) que vous étiez enceinte, contactez-le avant de prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé.

3. COMMENT PRENDRE ARIXIB®

VEUVEZ À TOUJOURS PRENDRE ARIXIB®

ARIXIB® 60 mg et 90 mg

Comprimé pelliculé en boîte de 7 et 14 Etoricoxib

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin

- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que ARIXIB®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

3. Comment prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ARIXIB®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Qu'est-ce que ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

ARIXIB®, comprimé pelliculé contient la substance active « etoricoxib ».

ARIXIB®, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

Ceux-ci appartiennent à une famille de médicaments nommée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quels cas ARIXIB®, comprimé pelliculé est-il utilisé ?

ARIXIB®, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients âgés de 16 ans et plus atteints d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.

ARIXIB®, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire chez les patients âgés de 16 ans et plus.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est une maladie des articulations. Elle résulte d'une altération progressive du cartilage qui protège les extrémités des os.

Elle entraîne un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité, une raideur et un handicap.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Elle provoque douleur, raideur, gonflement et perte progressive du mouvement des articulations atteintes. Elle peut entraîner également une inflammation d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la goutte ?

La goutte est une maladie qui se manifeste, au niveau des articulations, par des crises soudaines et récurrentes associant une inflammation, une rougeur et une très vive douleur. Elle est provoquée par des dépôts de cristaux minéraux dans les articulations.

Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante ?

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des articulations sacro-iliaques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ARIXIB®, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais ARIXIB®, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'etoricoxib ou à l'un

LOT : 231868
EXP : 11/2026
PPV : 76,60 DH

ARIXIB® 90 mg

7 comprimés



6 118000 083313

(médicament pour traiter l'asthme)

• Pilule contraceptive (l'association d'effet secondaire),

• Traitement hormonal substitutif qui peut augmenter votre risque d'effets indésirables.

• Aspirine car le risque d'ulcère de l'estomac augmente lorsque vous prenez ARIXIB®, comprimé pelliculé.

- Aspirine en prévention d'un accident vasculaire cérébral. ARIXIB®, comprimé pelliculé peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral à faibles doses. Si vous prenez des faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral, interrompez le traitement par l'aspirine.

- Aspirine et autres médicaments stéroïdiens (AINS) :

Ne prenez pas d'aspirine ou de fortes doses pendant le traitement par l'aspirine.

ARIXIB®, comprimé pelliculé avec AINS peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral.

Le début de l'effet d'ARIXIB®, comprimé pelliculé dépend de la prise de la première dose.

Grossesse, allaitement et fertilité

Les comprimés pelliculés d'ARIXIB® sont utilisés pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou en cas de désir de grossesse, contactez votre médecin.

Si vous n'êtes pas sûre que l'un de ces points vous concerne, contactez votre médecin avant de prendre ARIXIB®, comprimé pelliculé pour vérifier que ce médicament est adapté à votre cas.

ARIXIB®, comprimé pelliculé est aussi efficace chez le sujet âgé que chez l'adulte jeune. Si vous êtes âgée(e) de plus de 65 ans, votre médecin assurera une surveillance adaptée. Aucun ajustement de posologie n'est nécessaire chez les patients âgés de plus de 65 ans.

Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.

Autres médicaments et ARIXIB®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE ARIXIB®

Veillez à toujours prendre ce



CABINET DE RHUMATOLOGIE DR BOUTAYNA EL AZIFI

A CASABLANCA LE : 25/01/2024

PATIENT : Mme EL GHARFAOUI FATNA

NOTE D'HONORAIRE

Radiographie des genoux de face

**Arrêtée la présente facture a la somme de : 200DH
(Deux cent dirhams)**

Bd Abou Bakr El Kadiri, résidence Naim, Immeuble 4, Appt 6, Sidi Maarouf – Casablanca
Tel: 05 22 58 19 56 / 06 02 42 34 52

*Dr Boutayna EL AZIFI
RHUMATOLOGUE
Sidi Maarouf - Casablanca
Tél: 05 22 58 19 56/06 02 42 34 52*



CABINET DE RHUMATOLOGIE DR BOUTAYNA EL AZIFI

A CASABLANCA LE : 25/01/2024

Compte rendu de radiographie

PATIENT : Mme EL GHARFAOUI FATNA

Radiographie des genoux de face

- Pincement femoro-tibial interne stade II
- Mineralisation osseuse normale

الدكتور بثينة العزيزى
Docteur Boutayna EL AZIFI
RHUMATOLOGISTE
Sidi Maârouf - Casablanca
Tél.: 05 22 58 19 56/06 02 12 74 82