

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19- 064836

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7791 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : Chahouani Rahjouna
 Date de naissance : 1949
 Adresse : Mahituelle
 Tél. : 0661218109 Total des frais engagés : 627,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

الدكتور عبد اللطيف الناصري
Dr. LAKHSSASSI Abdellatif
 Cardiologue
 33, Bd. Abdellatif Ben Kaddor
 Casablanca - Tél. : 05 22 94 06 06


Date de consultation : 18/01/2024
 Nom et prénom du malade : Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : HTA
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18.01 2024	ex + SC		350,00	

Dr. LAKHSSASSI Abdelatif
 Cardiologue
 33, Bd Abdelatif Ben Kaddor
 Casablanca - Tél: 05 22 94 06 04

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ARAUCARIA Hichem EL PHARMACIEN 42, Rue du Ifrane Hay Salam C.I.L Casablanca - Tél: 05 22 36 13 05	18/01/24	267,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient											
				Coefficient DES TRAVAUX										
				MONTANTS DES SOINS										
				DEBUT D'EXECUTION										
				FIN D'EXECUTION										
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE													
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412 00000000</td> <td>21433552 00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000 35533411</td> <td>00000000 11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412 00000000	21433552 00000000	D	G	00000000 35533411	00000000 11433553	B			Coefficient DES TRAVAUX
	H													
	25533412 00000000	21433552 00000000												
	D	G												
	00000000 35533411	00000000 11433553												
	B													
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS										
				DATE DU DEVIS										
				DATE DE L'EXECUTION										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Abdellatif LAKHSSASSI

Spécialiste des Maladies du Cœur
et des Vaisseaux
Diplômé de la Faculté de Médecine
de Montpellier
Membre de la Société Française
de Cardiologie
Ancien Chef de Service de Cardiologie
des Polycliniques de la Sécurité Sociale



الدكتور عبد اللطيف الخصاصي

إختصاصي في أمراض القلب و الشرايين
خريج كلية الطب بمونبولى
عضو الجمعية الفرنسية لأمراض القلب
رئيس قسم أمراض القلب سابقا
بمصحات الضمان الإجتماعي

Casablanca, le 18.01.2024 الدار البيضاء في

CHARITH KAHJOURA

3 max

89.20x3

Ameln 5



12

92 267.60

الدكتور عبد اللطيف الخصاصي
Dr. LAKHSSASSI
Cardiologue
33, Bd. Abdellatif Ben Kaddour
Casablanca - Tél.: 05 22 94 06 06

HARMACIE ARAUCARIA
Hicham TALI Pharmacien
12, Rue d'Ifrane Hay Salam C.I.L
Casablanca - Tél.: 05 22 36 13 05

أملور®

Pfizer

أقراص أملور 5 مجم و أملور 10 مجم
أملوديبين

UT.AV :

P.P.V. :

LOT N° :

P10002669

89,200

نرجس قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل تناول

1. احتفظ بهذه النشرة
2. في حالة
3. تم وصف
4. يكون هذا
5. في حالة
6. به طبيبك
7. محتوى
8. ما هو
9. قبل تناول
10. كيفية تنا
11. آثار غير
12. كيفية حفظ
13. معلومات إض
14. ما هو أملور وفيه يتنصص

يحتوي أملور على المادة الفعالة أملوديبين التي تنتمي لمجموعة الأدوية المسماة بالمثبطات الكلسية. يستخدم أملور لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم الشرياني (ارتفاع ضغط الدم) أو نوع معين من ألم القفس الصدري الذي يسمى بالذبحة، والتي من ضمن أنواعها النادرة ذبحة برانجيل أو إحدى صورها. لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع قيم ضغط الدم الشرياني، يعمل دواءك من خلال إرخاء الأوردة الدموية، بحيث يجرها الدم بصورة أسهل. لدى المرضى المصابين بالذبحة الصدرية، يعمل أملور من خلال تحسين وصول الدم إلى عضلة القلب مما يعني تلقائياً كمية أكبر من الأكسجين، ويؤدي ذلك إلى تخفيف الإصابة بآلام بالقفس الصدري. لا يؤدي دواءك لتخفيف مباشر في حالة ارتباط ألم القفس الصدري بالذبحة الصدرية.

2. ما هي المعلومات المطلوب معرفتها قبل تناول أملور ؟
لا تتناول أملور مطلقاً:
• إذا كنت تعاني من الحساسية (الحساسية المفرطة) تجاه الأملوديبين أو تجاه أحد السواغات (انظر الفقرة 6) أو تجاه المثبطات الكلسية. قد تظهر ردود الأفعال في صورة حكة أو احمرار الجلد أو صعوبات التنفس.
• إذا أصبت بالفشلخ شديد في ضغط الدم الشرياني (انخفاض ضغط الدم).
• إذا كنت تعاني من تضيق الصمام الأورطي (تضيق الأورطي) أو من صمعة قلبية (مرض يعجز فيه القلب عن ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم).
• إذا كنت تعاني من قصور في القلب نتيجة أزمة قلبية.

توخ الحذر بشكل خاص عند تناول أملور
يجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تعاني أو عانيت من قبل من إحدى الحالات التالية:
• أزمة قلبية حديثة
• قصور بالقلب
• ارتفاع شديد في ضغط الدم الشرياني (أزمة ارتفاع ضغط الدم)
• مرض بالكبد (التهاب الكبد)
• إذا كنت شخصاً مسناً وكانت جرعتك بحاجة للزيادة
• الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين
• لم تتم دراسة تناول أملور لدى الأطفال أقل من 6 سنوات. لا ينبغي استخدام أملور إلا لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين البالغين من العمر من 6 إلى 17 عاماً (انظر الفقرة 3).
• الحصول على معلومات إضافية، نرجس استشارة طبيبك.
• تناول أملور مع الأدوية الأخرى
أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.
قد يؤثر أملوديبين على أدوية أخرى أو ينثر بها، مثل:

شديدة، أو ظهور حويصلات، أو تقشر وتورم الجلد، أو التهاب المخاطية (متلازمة ستيفنز جونسون، انحلال البشرة الفقاعي)، أو ردود أفعال تحسسية أخرى

- احتشاء عضلة القلب، عدم انتظام ضربات القلب
- التهاب البنكرياس مما قد يؤدي إلى ألم حاد بالبطن والظهر مصحوباً بشعور شديد بالضيق
- لقد تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية الشائعة للغاية التالية. إذا سببت أي من تلك الآثار مشكلات لك أو إذا دامت أكثر من أسبوع واحد، ينبغي عليك الاتصال بطبيبك.
- شائعة جداً: يمكن أن تصيب أكثر من شخص من بين كل 10 أشخاص
- تورم (المتباني السوائل)
- الآثار الشائعة: تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 100 مريض:
- الصداع، الدوار، الغثاس (خاصة في بداية العلاج)
- الخفقان (الشعور بقوة ضربات القلب)، الاحمرار
- ألم البطن، الغثاس
- تغير حركة الأمعاء المعتادة، الإسهال، الإمساك، سوء الهضم
- الإرقاق، الضعف
- اضطرابات الرؤية، رؤية مزدوجة
- الشد العضلي
- تورم الكاحل

تشمل الآثار الجانبية الأخرى التي تم الإبلاغ عنها القائمة التالية. إذا تعرضت لأي من الآثار الجانبية المدرجة بصفحتها شديدة أو إذا أصبت بآثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي
أثر غير مرغوب فيها قليلة الشيوخ : تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 1,000 مريض:

- تقيحات مزاجية، قلق، اكتئاب، أرق
- رعشة، حاسة تذوق غير طبيعية، فقدان الوعي، ضعف
- شعور بالتشنج أو التشنج في الأطراف، فقدان الشعور بالآلم
- اضطرابات الرؤية، رؤية مزدوجة، طنين بالأذنين
- انخفاض ضغط الدم الشرياني
- غثاس وسيلان الأنف بسبب التهاب الغشاء المخاطي للأنف (التهاب الأنف)
- اضطراب العيون، إسهال، حساسية، عسر الهضم، جفاف الفم، قي (غثاس)
- تساقط الشعر، زيادة التعرق، حكة جلدية، يقع حمراء على الجلد، تغير لون الجلد
- صعوبات التبول، زيادة الرغبة في التبول ليلاً، زيادة عدد مرات التبول
- عدم القدرة على الانتصاب، زيادة حجم الثدي لدى الرجال
- ضعف، ألم، شعور بالضيق
- آلام بالمفاصل أو العضلات، تقلصات عضلية، آلام بالظهر
- زيادة أو نقص الوزن

نادرة: تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 10,000 مريض:
• آرتياك
• نادرة جداً: تصيب أقل من مريض واحد من بين 10,000 مريض:
• قلة عدد كرات الدم البيضاء، قلة عدد الصفائح الدموية مما قد يؤدي إلى ظهور غير طبيعي للكدمات أو إلى نزيف متكرر.
• ارتفاع السكر في الدم
• اضطراب الأعصاب مما يؤدي إلى ضعف عضلي وتشنج وتخدر
• سعال، تورم اللثة
• انتفاخ البطن (التهاب المعدة)
• حثل بوظائف الكبد، التهاب الكبد، اصفرار الجلد (حكة)، ارتفاع الإنزيمات الكبدية مما قد يكون لديه تأثير على بعض الاختبارات الإكلينيكية
• زيادة التوتر العضلي
• التهاب الأوعية الدموية، قد يكون غالباً مصحوباً بطفح جلدي
• حساسية تجاه الضوء
• اضطرابات تجمع بين التصلب والرعشة و/أو اضطراب الحركة

الإبلاغ عن الآثار الجانبية
إذا شعرت بأي أثر غير مرغوب فيه، أخبر طبيبك أو الصيدلي بذلك. ينطبق هذا أيضاً على أي أثر غير مرغوب فيه وغير مذكور في هذه النشرة. قد يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها. كما يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها مباشرة من خلال النظام القومي للإبلاغ. عند الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها، فإنك تساهم في تقديم المزيد من المعلومات

أملور®

Pfizer

أقراص أملور 5 مجم و أملور 10 مجم
أملوديبين

UT.AV :

P.P.V. :

LOT N° :

P10002669

89,200

نرجس قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل تناول

1. احتفظ بهذه النشرة
2. في حالة
3. تم وصف
4. يكون هذا
5. في حالة
6. به طبيبك
7. محتوى
8. ما هو
9. قبل تناول
10. كيفية تنا
11. آثار غير
12. كيفية حفظ
13. معلومات إض
14. ما هو أملور وفيه يتنصص

يحتوي أملور على المادة الفعالة أملوديبين التي تنتمي لمجموعة الأدوية المسماة بالمثبطات الكلسية. يستخدم أملور لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم الشرياني (ارتفاع ضغط الدم) أو نوع معين من ألم القفس الصدري الذي يسمى بالذبحة، والتي من ضمن أنواعها النادرة ذبحة برانجيل أو إحدى صورها. لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع قيم ضغط الدم الشرياني، يعمل دواءك من خلال إرخاء الأوردة الدموية، بحيث يجرها الدم بصورة أسهل. لدى المرضى المصابين بالذبحة الصدرية، يعمل أملور من خلال تحسين وصول الدم إلى عضلة القلب مما يعني تلقيها لكمية أكبر من الأكسجين، ويؤدي ذلك إلى تخفيف الإصابة بآلام بالقفس الصدري. لا يؤدي دواءك لتخفيف مباشر في حالة ارتباط ألم القفس الصدري بالذبحة الصدرية.

2. ما هي المعلومات المطلوب معرفتها قبل تناول أملور ؟
3. لا تتناول أملور مطلقاً:
4. إذا كنت تعاني من الحساسية (الحساسية المفرطة) تجاه الأملوديبين أو تجاه أحد السواغات (انظر الفقرة 6) أو تجاه المثبطات الكلسية. قد تظهر ردود الأفعال في صورة حكة أو احمرار الجلد أو صعوبات التنفس.
5. إذا أصبت بالفصاض شديد في ضغط الدم الشرياني (انخفاض ضغط الدم).
6. إذا كنت تعاني من تضيق الصمام الأورطي (تضيق الأورطي) أو من صمعة قلبية (مرض يعجز فيه القلب عن ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم).
7. إذا كنت تعاني من قصور في القلب نتيجة أزمة قلبية.
8. توخ الحذر بشكل خاص عند تناول أملور
9. يجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تعاني أو عانيت من قبل من إحدى الحالات التالية:
10. أزمة قلبية حديثة
11. قصور بالقلب
12. ارتفاع شديد في ضغط الدم الشرياني (أزمة ارتفاع ضغط الدم)
13. مرض بالكبد (التهاب الكبد)
14. إذا كنت شخصاً مسناً وكانت جرعتك بحاجة للزيادة

الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين
لا تتم دراسة تناول أملور لدى الأطفال أقل من 6 سنوات. لا ينبغي استخدام أملور إلا لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين البالغين من العمر من 6 إلى 17 عاماً (انظر الفقرة 3).
الحصول على معلومات إضافية، نرجس استشارة طبيبك.
تناول أملور مع الأدوية الأخرى
أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.
قد يؤثر أملوديبين على أدوية أخرى أو ينثر بها، مثل:

شديدة، أو ظهور حويصلات، أو تقشر وتورم الجلد، أو التهاب المخاط (متلازمة ستيفنز جونسون، انحلال البشرة الفقاعي)، أو ردود أفعال تحسسية أخرى

- احتشاء عضلة القلب، عدم انتظام ضربات القلب
- التهاب البنكرياس مما قد يؤدي إلى ألم حاد بالبطن والظهر مصحوباً بشعور شديد بالضيق
- لقد تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية الشائعة للغاية التالية. إذا سببت أي من تلك الآثار مشكلات لك أو إذا دامت أكثر من أسبوع واحد، ينبغي عليك الاتصال بطبيبك.
- شائعة جداً: يمكن أن تصيب أكثر من شخص من بين كل 10 أشخاص
- تورم (المتباني السوائل)

- الآثار الشائعة: تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 100 مريض:
- الصداع، الدوار، الغثاس (خاصة في بداية العلاج)
- الخفقان (الشعور بقوة ضربات القلب)، الاحمرار
- ألم البطن، الغثاس
- تغير حركة الأمعاء المعتادة، الإسهال، الإمساك، سوء الهضم
- الإرقاق، الضعف
- اضطرابات الرؤية، رؤية مزدوجة
- الشد العضلي
- تورم الكاحل

تشمل الآثار الجانبية الأخرى التي تم الإبلاغ عنها القائمة التالية. إذا تعرضت لأي من الآثار الجانبية المدرجة بصفحتها شديدة أو إذا أصبت بآثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي
أثر غير مرغوب فيها قليلة الشيوخ : تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 1,000 مريض:

- تقيحات مزاجية، قلق، اكتئاب، أرق
- رعشة، حاسة تذوق غير طبيعية، فقدان الوعي، ضعف
- شعور بالتشنج أو التشنج في الأطراف، فقدان الشعور بالآلم
- اضطرابات الرؤية، رؤية مزدوجة، طنين بالأذنين
- انخفاض ضغط الدم الشرياني
- غثاس وسيلان الأنف بسبب التهاب الغشاء المخاطي للأنف (التهاب الأنف)
- اضطراب العيون، إسهال، حساسية، عسر الهضم، جفاف الفم، قي (غثاس)
- تساقط الشعر، زيادة التعرق، حكة جلدية، يقع حمراء على الجلد، تغير لون الجلد
- صعوبات التبول، زيادة الرغبة في التبول ليلاً، زيادة عدد مرات التبول
- عدم القدرة على الانتصاب، زيادة حجم الثدي لدى الرجال
- ضعف، ألم، شعور بالضيق
- آلام بالمفاصل أو العضلات، تقلصات عضلية، آلام بالظهر
- زيادة أو نقص الوزن

نادرة: تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 10,000 مريض:

- أرتباك
- نادرة جداً: تصيب أقل من مريض واحد من بين 10,000 مريض:
- قلة عدد كرات الدم البيضاء، قلة عدد الصفائح الدموية مما قد يؤدي إلى ظهور غير طبيعي للكدمات أو إلى نزيف متكرر.
- ارتفاع السكر في الدم
- اضطراب الأعصاب مما يؤدي إلى ضعف عضلي وتشنج وتقرح
- سعال، تورم اللثة
- انتفاخ البطن (التهاب المعدة)
- حثل بوظائف الكبد، التهاب الكبد، اصفرار الجلد (حكة)، ارتفاع الإنزيمات الكبدية مما قد يكون لديه تأثير على بعض الاختبارات الإكلينيكية
- زيادة التوتر العضلي
- التهاب الأوعية الدموية، قد يكون غالباً مصحوباً بطفح جلدي
- حساسية تجاه الضوء
- اضطرابات تجمع بين التصلب والرعشة و/أو اضطراب الحركة
- الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا شعرت بأي أثر غير مرغوب فيه، أخبر طبيبك أو الصيدلي بذلك. ينطبق هذا أيضاً على أي أثر غير مرغوب فيه وغير مذكور في هذه النشرة. قد يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها. كما يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها مباشرة من خلال النظام القومي للإبلاغ. عند الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها، فإنك تساهم في تقديم المزيد من المعلومات

أملور®

Pfizer

أقراص أملور 5 مجم و أملور 10 مجم
أملوديبين

UT.AV :

P.P.V. :

LOT N° :

P10002669

89,200

نرجس قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل تناول

1. احتفظ بهذه النشرة
2. في حالة
3. تم وصف
4. يكون هذا
5. في حالة
6. به طبيبك
7. محتوى
8. ما هو
9. قبل تناول
10. كيفية تنا
11. آثار غير
12. كيفية حفظ
13. معلومات إض
14. ما هو أملور وفيه يتنصص

يحتوي أملور على المادة الفعالة أملوديبين التي تنتمي لمجموعة الأدوية المسماة بالمثبطات الكلسية. يستخدم أملور لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم الشرياني (ارتفاع ضغط الدم) أو نوع معين من ألم القفس الصدري الذي يسمى بالذبحة، والتي من ضمن أنواعها النادرة ذبحة برانجيل أو إحدى صورها. لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع قيم ضغط الدم الشرياني، يعمل دواءك من خلال إرخاء الأوردة الدموية، بحيث يجرها الدم بصورة أسهل. لدى المرضى المصابين بالذبحة الصدرية، يعمل أملور من خلال تحسين وصول الدم إلى عضلة القلب مما يعني تلقيها لكمية أكبر من الأكسجين، ويؤدي ذلك إلى تخفيف الإصابة بآلام بالقفس الصدري. لا يؤدي دواءك لتخفيف مباشر في حالة ارتباط ألم القفس الصدري بالذبحة الصدرية.

2. ما هي المعلومات المطلوب معرفتها قبل تناول أملور ؟
3. لا تتناول أملور مطلقاً:
4. إذا كنت تعاني من الحساسية (الحساسية المفرطة) تجاه الأملوديبين أو تجاه أحد السواغات (انظر الفقرة 6) أو تجاه المثبطات الكلسية. قد تظهر ردود الأفعال في صورة حكة أو احمرار الجلد أو صعوبات التنفس.
5. إذا أصبت بالفصاض شديد في ضغط الدم الشرياني (انخفاض ضغط الدم).
6. إذا كنت تعاني من تضيق الصمام الأورطي (تضيق الأورطي) أو من صمعة قلبية (مرض يعجز فيه القلب عن ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم).
7. إذا كنت تعاني من قصور في القلب نتيجة أزمة قلبية.
8. توخ الحذر بشكل خاص عند تناول أملور
9. يجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تعاني أو عانيت من قبل من إحدى الحالات التالية:
10. أزمة قلبية حديثة
11. قصور بالقلب
12. ارتفاع شديد في ضغط الدم الشرياني (أزمة ارتفاع ضغط الدم)
13. مرض بالكبد (التهاب الكبد)
14. إذا كنت شخصاً مسناً وكانت جرعتك بحاجة للزيادة

الاستخدام لدى الأطفال والمراهقين
لا تتم دراسة تناول أملور لدى الأطفال أقل من 6 سنوات. لا ينبغي استخدام أملور إلا لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين البالغين من العمر من 6 إلى 17 عاماً (انظر الفقرة 3).
الحصول على معلومات إضافية، نرجس استشارة طبيبك.
تناول أملور مع الأدوية الأخرى
أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.
قد يؤثر أملوديبين على أدوية أخرى أو ينثر بها، مثل:

شديدة، أو ظهور حويصلات، أو تقشر وتورم الجلد، أو التهاب المخاط (متلازمة ستيفنز جونسون، انحلال البشرة الفقاعي)، أو ردود أفعال تحسسية أخرى

- احتشاء عضلة القلب، عدم انتظام ضربات القلب
- التهاب البنكرياس مما قد يؤدي إلى ألم حاد بالبطن والظهر مصحوباً بشعور شديد بالضيق
- لقد تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية الشائعة للغاية التالية. إذا سببت أي من تلك الآثار مشكلات لك أو إذا دامت أكثر من أسبوع واحد، ينبغي عليك الاتصال بطبيبك.
- شائعة جداً: يمكن أن تصيب أكثر من شخص من بين كل 10 أشخاص
- تورم (المتباني السوائل)
- الآثار الشائعة: تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 100 مريض:
- الصداع، الدوار، الغثاس (خاصة في بداية العلاج)
- الخفقان (الشعور بقوة ضربات القلب)، الاحمرار
- ألم البطن، الغثاس
- تغير حركة الأمعاء المعتادة، الإسهال، الإمساك، سوء الهضم
- الإرقاق، الضعف
- اضطرابات الرؤية، رؤية مزدوجة
- الشد العضلي
- تورم الكاحل

تشمل الآثار الجانبية الأخرى التي تم الإبلاغ عنها القائمة التالية. إذا تعرضت لأي من الآثار الجانبية المدرجة بصفحتها شديدة أو إذا أصبت بآثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي
أثر غير مرغوب فيها قليلة الشيوغ : تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 1,000 مريض:

- تقيحات مزاجية، قلق، اكتئاب، أرق
- رعشة، حاسة تذوق غير طبيعية، فقدان الوعي، ضعف
- شعور بالتشنج أو التتميل في الأطراف، فقدان الشعور بالآلم
- اضطرابات الرؤية، رؤية مزدوجة، طنين بالأذنين
- انخفاض ضغط الدم الشرياني
- غثاس وسيلان الأنف بسبب التهاب الغشاء المخاطي للأنف (التهاب الأنف)
- اضطراب العيون، إسهال، حساسية، عسر الهضم، جفاف الفم، قي (غثاس)
- تساقط الشعر، زيادة التعرق، حكة جلدية، يقع حمراء على الجلد، تغير لون الجلد
- صعوبات التبول، زيادة الرغبة في التبول ليلاً، زيادة عدد مرات التبول
- عدم القدرة على الانتصاب، زيادة حجم الثدي لدى الرجال
- ضعف، ألم، شعور بالضيق
- آلام بالمفاصل أو العضلات، تقلصات عضلية، آلام بالظهر
- زيادة أو نقص الوزن


نادرة: تؤثر على مريض واحد إلى عشرة مرضى ضمن كل 10,000 مريض:

- آرتياك
- نادرة جداً: تصيب أقل من مريض واحد من بين 10,000 مريض:
- قلة عدد كرات الدم البيضاء، قلة عدد الصفائح الدموية مما قد يؤدي إلى ظهور غير طبيعي للكدمات أو إلى نزيف متكرر.
- ارتفاع السكر في الدم
- اضطراب الأعصاب مما يؤدي إلى ضعف عضلي وتتميل وتقدر
- سعال، تورم اللثة
- انتفاخ البطن (التهاب المعدة)
- حثل بوظائف الكبد، التهاب الكبد، اصفرار الجلد (حكة)، ارتفاع الإنزيمات الكبدية مما قد يكون لديه تأثير على بعض الاختبارات الإكلينيكية
- زيادة التوتر العضلي
- التهاب الأوعية الدموية، قد يكون غالباً مصحوباً بطفح جلدي
- حساسية تجاه الضوء
- اضطرابات تجمع بين التصلب والرعشة و/أو اضطراب الحركة

الإبلاغ عن الآثار الجانبية
إذا شعرت بأي أثر غير مرغوب فيه، أخبر طبيبك أو الصيدلي بذلك. ينطبق هذا أيضاً على أي أثر غير مرغوب فيه وغير مذكور في هذه النشرة. قد يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها. كما يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها مباشرة من خلال النظام القومي للإبلاغ. عند الإبلاغ عن الآثار غير المرغوب فيها، فإنك تساهم في تقديم المزيد من المعلومات

CHARIH HACHOUH
 الدكتور عبد الحفيظ الحناصي
 Dr. LAKHSSASSI
 Cardiologue
 33, Bd. Abdellatif Ben Kaddor
 Casablanca - Tél: 06 29 94 06 06

FC 87/min
 Axes :
 P 40 °
 QRS 7 °
 T 69 °
 Intervals
 RR 693 ms
 P 110 ms
 PR 156 ms
 QRS 82 ms
 QT 356 ms
 QTC 429 ms
 (Bazett)
 P (II) 0.11 mV
 S (V1) -0.74 mV
 R (V5) 1.08 mV
 Sokol. 2.30 mV




عيادة فحص و تشخيص أمراض القلب و الشرايين

CABINET DE CONSULTATION ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Dr. Abdellatif LAKHSSASSI

Spécialiste des Maladies du Cœur
et des Vaisseaux
Diplômé de la Faculté de Médecine
de Montpellier
Membre de la Société Française
de Cardiologie



الدكتور عبد اللطيف الخصاصي

إختصاصي في أمراض القلب و الشرايين
خريج كلية الطب بمونبيري
عضو الجمعية الفرنسية لأمراض القلب

ELECTROCARDIOGRAMME

Nom : CHENIK Prénom : MAHMOUD

Date : 18.01.2024 Dossier N° : _____