

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **M 881** Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **Mo Rabi KARINA** 193611

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : ..... Age : .....

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :





# Conditions Générales

## POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes :

**C** = Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien  
**CS** = Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)  
**CNPSY** = Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre  
**V** = Visite de jour au domicile du malade par le médecin  
**VN** = Visite de nuit au domicile du malade par le médecin  
**VD** = Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade  
**VD** = Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié  
**PC** = Acte de pratique médicale courant et de petite chirurgie  
**K** = Actes de chirurgie et de spécialistes

**SF** = Actes pratiqués par la sage-Femme et relevant de sa compétence  
**SFI** = Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme  
**AMM** = Actes pratiqués par le masseur ou le kinésithérapeute  
**AMI** = Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière  
**AP** = Actes pratiqués par un orthophoniste  
**AMY** = Actes pratiqués par un aide-orthophoniste  
**R-Z** = Electro - Radiologie  
**B** = Analyses

## POUR L'ADHERENT

- La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que si après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.
- Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes d'adresser au service de la Mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.
- Ce bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord ou de présenter ses observations.
- Le bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous pli confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

## LES ACTES SOUMIS A ACCORD PREALABLE

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| - L'HOSPITALISATION EN CLINIQUE                 | - LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES |
| - L'HOSPITALISATION EN HOPITAL                  | - L'ORTHOPEDIE                    |
| - L'HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU            | - LA REEDUCATION                  |
| - PREVENTORIUM                                  |                                   |
| - SEJOUR EN MAISON DE REPOS                     | - LES ACCOUCHEMENTS               |
| - LES ACTES EFFECTUÉS EN SERIE, il s'agit       | - LES CURES THERMALES             |
| - d'actes répétés en plusieurs séances ou actes | - LA CIRCONCISION                 |
| - globaux comportant un ou plusieurs échelons   | - LE TRANSPORT EN AMBULANCE       |
| - dans le temps.                                |                                   |

## EN CAS D'URGENCE

Les actes d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit prévenir dans les 24 heures le Service Mutuelle qui donnera ou non son accord

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade



# MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

DATE DE DEPOT

AEROPORT CASA ANFA  
CASABLANCA

TEL : 05 22 91 26 46 / 2648 / 2649 / 2857 / 2883

FAX / 05 22 91 26 52

TELEX / 3998 MUT

E-mail : mupras@RoyalAirMaroc.co.ma

## FEUILLE DE SOINS MU 046661

### A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Nom & Prénom : **MOURADI KARIMA**  
 Matricule : **11881** Fonction : **Agent commercial** Poste : **9575**  
 Adresse : **16815, Rue A.M Sidi ARI, Bouskoura.**  
 Tél. : **0615354455** Signature Adhérent : **Sily.**

### A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient : **Mourad Karim** Age : **24** **08** **17**  
 Lien de parenté avec l'adhérent : Adhérent  Conjoint  Enfant

Date de la première visite du médecin : .....

Nature de la maladie : **HTA**

S'il s'agit d'un accident : causes et circonstances .....

A **encueillie**, le **19** / **01** / **2024** Signature et cachet du médecin

Durée d'utilisation 3 mois

الدكتور سليمان العلوي  
Dr. LAKSSI SLEIMAN  
Cardiologue  
33, Bd Abdellatif Ben Abdellah  
Casablanca Tél. 05 22 94 06 06

### VOLET ADHERENT

DECLARATION MU 046661

Matricule N° : **11881**  
 Nom du patient : **MOURADI KARIMA**  
 Date de dépôt : **30/01/2024**  
 Montant engagé : **1081,00 DH**  
 Nombre de pièces jointes : **1**



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et Signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19.01 2024	ces	-	0 gmt	 dr. LAKHSSASSI Abdellatif Cardiologue Dr. Lakhssassi Abdellatif Ben Kaddor 522 94 06 06

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Dr. BENKADDOUZ 4, Rue Amaadou Bamba Casablanca Tel. 05 22 26 515</i>	18/01/2024	₾ 1081,80₾

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

## SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">H</td> <td style="width: 50%;">25533412</td> <td style="width: 50%;">H</td> <td style="width: 50%;">21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>G</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">B</td> <td style="width: 50%;">00000000</td> <td style="width: 50%;">B</td> <td style="width: 50%;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">G</td> <td style="width: 50%;">35533411</td> <td style="width: 50%;">G</td> <td style="width: 50%;">11433553</td> </tr> </table>		H	25533412	H	21433552	D	00000000	G	00000000	D		G		B	00000000	B	00000000	B		B		G	35533411	G	11433553
H	25533412	H	21433552																								
D	00000000	G	00000000																								
D		G																									
B	00000000	B	00000000																								
B		B																									
G	35533411	G	11433553																								
<p style="text-align: center;">(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>																											
CŒFFICIENT DES TRAVAUX																											
MONTANT DES SOINS																											
DATE DU DEVIS																											
DATE DE L'EXECUTION																											

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION


# Dr. Abdellatif LAKHSSASSI

Spécialiste des Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux

Diplômé de la Faculté de Médecine  
de Montpellier

Membre de la Société Française  
de Cardiologie

Ancien Chef de Service de Cardiologie  
des Polycliniques de la Sécurité Sociale



الدكتور عبد اللطيف الخصاقي

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

خريج كلية الطب بمونبولي

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض القلب

رئيس قسم أمراض القلب سابقا

بمصحات الضمان الاجتماعي

Casablanca, le 19.01.2024 ..... الدار البيضاء في

Honneur Katame

30,60x6,11 Escherichia coli  
S. V. 10 mm

21 / Disparu  
149,80x6,11 mm

Total 108,1,85  
092064559

الدكتور عبد اللطيف الخصاقي  
Dr. LAKHSSASSI Abdellatif

Cardiologue  
33, Bd. Abdellatif Ben Kaddour  
Casablanca - Tél.: 05 22 94 06 06

33, شارع عبد اللطيف بن قدور - اقامة بيلافيستا II - شقة 4 - الطابق 2 - الدار البيضاء

33, Bd. Abdellatif Ben Kaddour - Rés. Bella Vista II - Appt. N° 4 - 2ème Etage - Casa

GSM : 06 61 14 48 64 - الفاكس : 05 22 94 00 60 - المحمول : Tél.: 05 22 94 06 06



6 118000 041672

PPV: 149DH70

PER: 09/26

LOT: M2932

Compri

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés et dans quelles conditions le prendre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT® 100mg/ 25mg Comprimés pelliculés ET DANS QUelles CONDITIONS LE PRENDRE ?

Classe pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - combinaison. DIPREZAR FORT® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par les reins qui stimulate les récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela entraîne une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, ce qui entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels excédentaires des reins. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle. DIPREZAR FORT® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?

#### Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres médicaments mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre pharmacien).
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ce médicament au début de grossesse – voir rubrique « Grossesse »).
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

#### Faites attention avec DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Il est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte car il pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR FORT® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la main.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25mg, comprimé pelliculé »).
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou une maladie rénale unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine ou fait d'une mauvaise fonction cardiaque.
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques).
- Si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque).
- Si vous avez une artérite des vaisseaux sanguins (une maladie qui peut entraîner une perte d'irrigation sanguine dans les tissus).
- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez eu de la goutte.
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie de la peau (rash cutané), des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé).
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans sel ou sans potassium.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale. Pour faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronone suite à une anomalie des glandes surrénales).
- Si vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle :
- Un IEC (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes de diabète.
- L'aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle et les niveaux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.





6 118000 041672

PPV: 149DH70

PER: 09/26

LOT: M2932

Compri

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés et dans quelles conditions le prendre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT® 100mg/ 25mg Comprimés pelliculés ET DANS QUelles CONDITIONS LE PRENDRE ?

Classe pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - combinaison. DIPREZAR FORT® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par les reins qui stimulate les récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela augmente la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, entraînant une dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle. DIPREZAR FORT® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?

#### Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres médicaments mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre pharmacien).
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ce médicament au début de grossesse – voir rubrique « Grossesse »).
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

#### Faites attention avec DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Il est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte car il pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR FORT® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la main.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25mg, comprimé pelliculé »).
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou une maladie rénale unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine ou d'une mauvaise fonction cardiaque.
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques).
- Si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque).
- Si vous avez une artérite des vaisseaux sanguins (une maladie qui peut entraîner une perte d'irrigation sanguine dans les tissus).
- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez eu de la goutte.
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie de la peau (eczéma, psoriasis), des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé).
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans sel ou sans potassium.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale. Pour faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronone suite à une anomalie des glandes surrénales).
- Si vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle :
- Un IEC (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes de diabète.
- L'aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle et les niveaux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.





6 118000 041672

PPV: 149DH70

PER: 09/26

LOT: M2932

Compri

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés et dans quelles conditions le prendre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT® 100mg/ 25mg Comprimés pelliculés ET DANS QUelles CONDITIONS LE PRENDRE ?

Classe pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - combinaison. DIPREZAR FORT® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par les reins qui agit sur les récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela entraîne une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, ce qui entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels excédentaires des reins. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle. DIPREZAR FORT® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?

#### Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres médicaments mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre pharmacien).
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ce médicament au début de grossesse – voir rubrique « Grossesse »).
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

#### Faites attention avec DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Il est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte car il pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR FORT® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la main.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25mg, comprimé pelliculé »).
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou une maladie rénale unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine ou fait d'une mauvaise fonction cardiaque.
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques).
- Si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque).
- Si vous avez une artérite des vaisseaux sanguins (une maladie qui peut entraîner une perte d'irrigation sanguine dans les tissus).
- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez eu de la goutte.
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie de la peau (rash cutané), des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé).
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans sel ou sans potassium.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale et faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronone suite à une anomalie des glandes surrénales).
- Si vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle :
- Un IEC (par exemple énacapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes de diabète.
- L'aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle et les niveaux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.





6 118000 041672

PPV: 149DH70

PER: 09/26

LOT: M2932

Compri

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés et dans quelles conditions le prendre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT® 100mg/ 25mg Comprimés pelliculés ET DANS QUelles CONDITIONS LE PRENDRE ?

Classe pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - combinaison. DIPREZAR FORT® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par les reins qui stimulate les récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela entraîne une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, ce qui entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels excédentaires des reins. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle. DIPREZAR FORT® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?

#### Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres médicaments mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre pharmacien).
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ce médicament au début de grossesse – voir rubrique « Grossesse »).
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

#### Faites attention avec DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Il est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte car il pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR FORT® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la main.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25mg, comprimé pelliculé »).
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou une maladie rénale unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine ou fait d'une mauvaise fonction cardiaque.
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques).
- Si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque).
- Si vous avez une artérite des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques).
- Si vous avez une artérite des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques).
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie de la peau, des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé).
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans sel.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale et faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronone suite à une anomalie des glandes surrénales).
- Si vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle :
- Un IEC (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes de diabète.
- L'aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle et les niveaux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.





6 118000 041672

PPV: 149DH70

PER: 09/26

LOT: M2932

Compri

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés et dans quelles conditions le prendre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT® 100mg/ 25mg Comprimés pelliculés ET DANS QUelles CONDITIONS LE PRENDRE ?

Classe pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - combinaison. DIPREZAR FORT® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par les reins qui stimulate les récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela augmente la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, entraînant une dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle. DIPREZAR FORT® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?

#### Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres médicaments mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre pharmacien).
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ce médicament au début de grossesse – voir rubrique « Grossesse »).
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

#### Faites attention avec DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Il est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte car il pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR FORT® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la main.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25mg, comprimé pelliculé »).
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou une maladie rénale unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine ou d'une mauvaise fonction cardiaque.
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques).
- Si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque).
- Si vous avez une artérite des vaisseaux sanguins (une maladie qui peut entraîner une perte d'irrigation sanguine dans les tissus).
- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez eu de la goutte.
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie de la peau (rash cutané), des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé).
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans potassium.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale. Pour faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronone suite à une anomalie des glandes surrénales).
- Si vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle :
- Un IEC (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes de diabète.
- L'aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle et les niveaux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.





6 118000 041672

PPV: 149DH70

PER: 09/26

LOT: M2932

Compri

avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés et dans quelles conditions le prendre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR FORT® 100mg/ 25mg Comprimés pelliculés ET DANS QUelles CONDITIONS LE PRENDRE ?

Classe pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - combinaison. DIPREZAR FORT® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par les reins qui agit sur les récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela entraîne une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, ce qui entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide aide à éliminer l'eau et les sels excédentaires des reins. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle. DIPREZAR FORT® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés ?

#### Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres médicaments mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre pharmacien).
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre ce médicament au début de grossesse – voir rubrique « Grossesse »).
- Si votre fonction rénale est gravement altérée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament contenant de l'aliskiren.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

#### Faites attention avec DIPREZAR FORT® 100mg/25 mg, Comprimés pelliculés :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ce médicament. Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Il est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte car il pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR FORT® :

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la main.
- Si vous prenez des diurétiques.
- Si vous faites un régime sans sel.
- Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque.
- Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR FORT® 100mg/25mg, comprimé pelliculé »).
- Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou une maladie rénale unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale.
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine ou fait d'une mauvaise fonction cardiaque.
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques).
- Si vous avez une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque).
- Si vous avez une goutte.
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie de la peau, des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé).
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans potassium.
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale et faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à une augmentation d'aldostéronone suite à une anomalie des glandes surrénales).
- Si vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle :
- Un IEC (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes de diabète.
- L'aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle et les niveaux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.



# Esidrex® 25 mg

Hydrochlorothiazide

20 comprimés sécables

30,60



6 118000 181194

dem... ou plus

à votre

inégalement prescrit. Ne le donnez pas à être nocif, même si les signes de leur

d'autres personnes. Si pourtant... maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?
2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
7. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :  
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

### • Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes),
- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre indications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

### Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

##### Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie,
- Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins ou un rein unique)
- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang),
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé,
- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée « lupus erythémateux » (appelée également « lupus » ou « LED »),
- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque anormal),
- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions),
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires),
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations),
- Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement,
- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme,
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil,
- Si vous prenez tout autre médicament,
- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

### Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique

# Esidrex® 25 mg

Hydrochlorothiazide

20 comprimés sécables

30,60



6 118000 181194

dem... ou plus

à votre

inégalement prescrit. Ne le donnez pas à être nocif, même si les signes de leur

d'autres personnes. Si pourtant... maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
7. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :  
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

### • Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes),
- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre indications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

### Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

##### Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie,
- Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins ou un rein unique)
- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang),
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé,
- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée « lupus erythémateux » (appelée également « lupus » ou « LED »),
- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque anormal),
- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions),
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires),
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations),
- Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement,
- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme,
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil,
- Si vous prenez tout autre médicament,
- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

### Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique

# Esidrex® 25 mg

Hydrochlorothiazide

20 comprimés sécables

30,60



6 118000 181194

dem... ou plus

à votre

inégalement prescrit. Ne le donnez pas à être nocif, même si les signes de leur

d'autres personnes. Si pourtant... maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
7. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :  
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

### • Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes),
- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre indications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

### Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

##### Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie,
- Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins ou un rein unique)
- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang),
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé,
- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée « lupus erythémateux » (appelée également « lupus » ou « LED »),
- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque anormal),
- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions),
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires),
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations),
- Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement,
- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme,
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil,
- Si vous prenez tout autre médicament,
- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

### Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique

# Esidrex® 25 mg

Hydrochlorothiazide

20 comprimés sécables

30,60



6 118000 181194

dem... ou plus

à votre

inégalement prescrit. Ne le donnez pas à être nocif, même si les signes de leur

d'autres personnes. Si pourtant... maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
7. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :  
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

### • Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes),
- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre indications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

### Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

##### Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie,
- Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins ou un rein unique)
- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang),
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé,
- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée « lupus erythémateux » (appelée également « lupus » ou « LED »),
- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque anormal),
- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions),
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires),
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations),
- Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement,
- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme,
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil,
- Si vous prenez tout autre médicament,
- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

### Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique

# Esidrex® 25 mg

Hydrochlorothiazide

20 comprimés sécables

30,60



6 118000 181194

dem... ou plus

à votre

inégalement prescrit. Ne le donnez pas à être nocif, même si les signes de leur

d'autres personnes. Si pourtant... maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
7. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :  
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

### • Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes),
- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre indications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

### Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

##### Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie,
- Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins ou un rein unique)
- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang),
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé,
- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée « lupus erythémateux » (appelée également « lupus » ou « LED »),
- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque anormal),
- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions),
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires),
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations),
- Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement,
- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme,
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil,
- Si vous prenez tout autre médicament,
- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

### Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique

# Esidrex® 25 mg

Hydrochlorothiazide

20 comprimés sécables

30,60



6 118000 181194

dem... ou plus

à votre

inégalement prescrit. Ne le donnez pas à être nocif, même si les signes de leur

d'autres personnes. Si pourtant... maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice ?
2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?
7. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMÉS SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :  
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

### • Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes),
- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec un autre médicament.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre indications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

### Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

#### Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

##### Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie,
- Si vous présentez une sténose de l'artère rénale (rétrécissement des vaisseaux sanguins irriguant les deux reins ou un rein unique)
- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang),
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé,
- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée « lupus erythémateux » (appelée également « lupus » ou « LED »),
- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque anormal),
- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions),
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires),
- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations),
- Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement,
- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme,
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil,
- Si vous prenez tout autre médicament,
- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

### Exposition au soleil ou aux UV

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin a souhaité poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des rayons de soleil et ne plus faire d'UV en cabine (référez-vous également à la rubrique