

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

194077

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 1167 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MOUHEN BRAHIM

Date de naissance : 01-06-1954

Adresse : N°14 lot oued Rachen Hy. Hly Rachid 1

Casablanca Maroc

Tél. : 0664 96 12 31 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Brahim Moussem Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : / /

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : / /

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/01/2021	cat	c2	300	
	Echo 055		400	
	K30		700	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 INPE 092015379 Abdelaziz	23/05/2015 10 2015	 INPE 092015379 SALE 100044

ANALYSES - RADIOGRAPHIES



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

*Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	B G	COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Échographie Abdominale - Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

Casablanca, le

23/10/2014

الدكتور بنيس خالد

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والبواسير

خريج كلية الطب بانجي وباريس

شهادة التشخيص بالمنظار الباطني (بياريس)

شهادة التشخيص في أمراض وجراحة المخرج (بياريس)

عضو الجمعية الفرنسية في أمراض المخرج والمصارين

عضو الجمعية الفرنسية في الكشف بالموجات فوق الصوتية

Moumen . Brahim

99.00

①

Cixifor SV

73.50

②

Forloox SV

(0.80x2)

③

Flagyl SV

BENNIS Khalid
HÉPATO-ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO-CHIRURGICALE
Résidence "Al Mawlid 4" Angle Bd. Abdelloun et Bd. Anoual 2^e Etage N° "A 24" - CASABLANCA - Tél.: 05 22 98 41 16



le 04/04/2014



إقامة المولود 4 - زاوية شارع عبد المؤمن و شارع أنوال - الطابق الثاني شارع عبد المؤمن - البيضاء - الهاتف : 05 22 98 41 16

Résidence "Al Mawlid 4" Angle Bd. Abdelloun et Bd. Anoual 2^e Etage N° "A 24" - CASABLANCA - Tél.: 05 22 98 41 16

Portable Cabinet : 06 65 04 25 69

FLAGYL® 500 mg

Métronidazole

Comprimé pelliculé

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antibiotiques antibactériens anti-parasitaires de la famille des nitro-5-imidazolés - code ATC : J01XD01 – P01AB01

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections à germes sensibles (bactéries, parasites).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé ?

N'utilisez jamais FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au métronidazole, à un médicament de la famille des imidazolés (famille d'antibiotiques à laquelle appartient le métronidazole) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6, • si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten), • si le patient est un enfant âgé de moins de 6 ans (voir Avertissements et précautions).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé.

Mises en garde et précautions d'emploi

Avant d'utiliser FLAGYL, prévenez votre médecin si vous présentez :

- des troubles neurologiques, • des troubles psychiatriques, • des troubles sanguins, • des antécédents de ménigrites sous métronidazole.

Prenez immédiatement votre médecin si l'un des troubles suivants se produit pendant le traitement par FLAGYL :

Dès la première dose, il existe un risque de survenue de réaction allergique sévère et soudaine (choc anaphylactique, œdème de Quincke), se manifestant par les symptômes suivants : oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou évanouissements, ouvertures lors du passage en position debout (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?). Si ces symptômes surviennent, arrêtez d'utiliser ce médicament car votre vie pourrait être mise en danger, et contactez immédiatement votre médecin.

La survenue, en début de traitement, d'une rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules, et accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction grave appelée pustulose exanthématique aigüe généralisée (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?) ; prévenez votre médecin immédiatement car cela impose l'arrêt du traitement ; cette réaction va contre-indiquer toute nouvelle administration de métronidazole seul ou associé dans un même médicament à une autre substance active.

Il faut surveiller l'apparition potentielle ou l'aggravation de troubles nerveux comme une difficulté à coordonner les mouvements, un état de confusion, des convulsions, et une difficulté pour parler, pour marcher, des tremblements, des mouvements involontaires des yeux, ainsi que d'autres manifestations au niveau des mains et des pieds telles que des fourmillements, picotements, sensations de froid, engourdissements, diminution de la sensibilité du toucher. Ces troubles sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement. Il est alors important d'interrompre le traitement et de consulter immédiatement votre médecin. (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?)

Des troubles du comportement à risque pour le patient peuvent survenir dès les premières prises du traitement, notamment en cas de troubles psychiatriques antérieurs. Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin (voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?).

En cas d'antécédéti traitement prolongé, des examens sanguins doivent être réalisés pour surveiller les résultats en positivant faussement positifs. Des cas de toxicité entraînant une insomnie ont été rapportés avec ce médicament.

Si vous êtes atteint(e) du syndrome de la fatigue chronique, surveillez votre état de santé et informez votre médecin. Veuillez noter que les symptômes peuvent persister plusieurs mois après l'arrêt du traitement.

La prise de comprimés peut entraîner des effets indésirables.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes allaitante, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, ne prenez pas ce médicament.

Si vous êtes all

LIXIFOR

X1032 0727

LOT _____ PER _____

Prix 99.00

COMPOSITION : Dose par gélule

- Séné	140 mg
- Radis Noir	75 mg
- Anis Etoilé	75 mg
- Cascara	30 mg

PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour spécialement formulé pour :

- Régulation du volume et de la fréquence des selles
- Réduction des gaz
- Ballonnement et pesanteur abdominale
- Active le péristaltisme
- Améliore le confort intestinal
- Stimule le transit intestinal
- Combat les fermentations intestinales
- Favorise un transit régulier

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 gélule par jour le soir au couche avec un verre d'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent sans avis médical.
- A conserver dans un endroit sec et frais.
- Sans ingrédient d'origine animale, sans gluten, sans gélatine.

PRESENTATION :

Boite de 15 gélules.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto
98000 - MONACO

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet****Macrogol 4000**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
3. Comment prendre FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : LAXATIF OSMOTIQUE - code ATC : A06AD15 (A : appareil digestif et métabolisme).

FORLAX contient la substance active macrogol 4000 et appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques. Il permet d'augmenter la quantité d'eau dans les matières fécales, ce qui aide à résoudre les problèmes liés à un transit intestinal ralenti. FORLAX n'est pas absorbé dans la circulation sanguine et n'est pas modifié dans l'organisme.

FORLAX est indiqué pour le traitement de la constipation chez l'adulte et l'enfant de plus de 8 ans.

Ce médicament se présente sous forme d'une poudre qu'il faut dissoudre dans un verre d'eau (au minimum 50 ml) et boire. Son effet se manifeste généralement en 24h à 48h.

Le traitement de la constipation par un médicament doit être associé à des règles d'hygiène de vie et à une alimentation saine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

Ne prenez jamais FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au macrogol (polyéthylène glycol) ou à l'un des autres composants contenus dans le médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie telle qu'une maladie sévère de l'intestin :
 - Inflammation de l'intestin (telle que rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, dilatation anormale de l'intestin)
 - Perforation de l'intestin ou risque de perforation de l'intestin
 - Iléus ou suspicion d'obstruction de l'intestin.
 - Douleurs abdominales de cause incertaine.

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes atteint par l'une des affections citées ci-dessus. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FORLAX. Des cas de réactions allergiques se manifestant par une éruption sur la peau et un gonflement du visage ou de la gorge (angio-oedème) ont été rapportés chez l'adulte après la prise de médicaments contenant du macrogol (polyéthylène glycol).

Des cas isolés de manifestations allergiques sévères ayant conduit à des pertes de connaissance, collapsus, ou difficultés respiratoires et sensations de malaise général ont été rapportés.

forlax[®]

10g

Macrogol 4000

Enfant de plus de 8 ans/Adulte

Si vous présentez :

et contactez immédiatement un professionnel de la santé.

Dans la mesure où ce médicament peut provoquer des effets indésirables, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

FORLAX 10G SAC B20

P.P.V. : 73.50 DH

6118001181193

maphar

Boulevard Almouneur n°16

Quartier Industriel Sud Berrechid Casablanca - Maroc

LOT : A64896
Exp. : 05/2026

En cas de trouble de la déglutition, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FORLAX.

Evitez de mélanger FORLAX avec des épaississants à base d'amidon si vous avez des difficultés à avaler. Cela peut entraîner la formation d'une solution liquide qui pourrait pénétrer dans vos poumons et provoquer une pneumopathie d'inhalation, si vous ne parvenez pas à avaler correctement.

Autres médicaments et FORLAX

Il est possible que l'absorption d'autres médicaments puisse être temporairement réduite lors de l'utilisation de FORLAX, en particulier des médicaments ayant un index thérapeutique étroit ou une demi-vie courte comme la digoxine, les anticonvulsifs, les coumarins et les immunosuppresseurs, entraînant une diminution de l'efficacité.

Si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez recours à des épaississants pour faciliter l'ingestion des liquides, FORLAX peut contre l'effet de l'épaississant et l'empêcher d'agir.

Grossesse et allaitement

FORLAX peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune étude sur les effets de FORLAX sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été réalisée.

FORLAX contient du sorbitol et du dioxyde de soufre

Ce médicament contient du dioxyde de soufre et peut provoquer des réactions allergiques et une gêne respiratoire.

Ce médicament contient 1,7 mg de sorbitol par sachet.

FORLAX peut néanmoins être utilisé si vous êtes diabétique ou si vous devez suivre un régime exempt de galactose.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par sachet, c'est-à-dire qu'il est essentiellement "sans sodium".

3. COMMENT PRENDRE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

Lorsque vous prenez FORLAX, respectez toujours ce qui est indiqué dans cette notice ou les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien. En cas de doute, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Posologie

Adultes et enfants de plus de 8 ans

La dose habituelle recommandée est de 1 à 2 sachets par jour, de préférence en prise unique le matin.

La dose journalière peut être adaptée à l'effet obtenu et peut varier de 1 sachet tous les 2 jours (chez les enfants en particulier) à 2 sachets par jour au maximum.

Dissolvez le contenu du sachet dans un verre d'eau (au minimum 50 ml) immédiatement avant de prendre FORLAX.

Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Échographie Abdominale - Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

Casablanca, le

28/01/2024

Facture

= 400 DH

M^r Moumen
Brahim

Echo Abdominale

K 30

**Résidence " AL Mawlid " 4^e Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual
2^{ème} Etage - CASABLANCA - Tél.: 05 22 98 41 16
Portable Cabinet : 06 65 04 25 69**



DOCTEUR BENNIS KHALID

SPECIALISTE en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplômé d'Échographie Abdominale Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale Paris (St Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

23/01/2024

MOUMEN Brahim

Clinique

RECIDIVE DE COLIQUES, CONSTIPATION TERMINALE .DYSPHAGIE CERVICALE,
AMAIGRISSEMENT DE 15 KG EN 1 AN

Examen

Foie de taille normale (FH= 13 cm), d'échostructure homogène et de contours réguliers.
Absence de syndrome de masse; absence de dilatation des VBIH.

TP de calibre normal (7 mm).VBP fine (2 mm).

Vésicule biliaire alithiasique, à paroi fine.

Pancréas exploré partiellement limité par les gaz .

Absence d'adénopathies profondes.

Aspect moucheté du cadre colique

Rate homogène, de taille normale (grand axe de 8 cm).

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale,
sans dilatation des cavités pyélocalicielles.Présence d'un calcul rénal gauche (10 mm).

Vessie et prostate normales.

Conclusion

STASE STERCORALE DIFFUSE

ANSES GRELIQUES PELVIENNES DILATEES EN FAVEUR DE GASTRO-ENTERITE.

Dr. BENNIS Khalid
HEPATO-GASTRO-PROCTOLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO-CHIRURGICALE
Rés. Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen
et Bd. Anoual Casablanca
Tél. 05 22 98 11 16