

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Ensuite, avec les vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être joints à toute demande de remboursement.

Le rapport des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la Mutuelle.

La facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Le certificat de coûts de la séance avant le début des séances de soins doivent être jointes à la feuille de soins.

La feuille de soins est

Autorisation CNDR N° : AA-215 / 2019



Déclaration de Maladie

M23-007811

1945M

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1608

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : NE AZZOUZI ELIDRISSI Mblay Taha

Date de naissance : 1950

Adresse : Rue Ahmed Kadmiri Rue Nada Apt 13 3^e Etage Casablanca

Tél. 0663082895

Total des frais engagés : -115420 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr BENNIS Sophia
Médecine générale
26 rue François Villon cité plateau
riviera Casablanca
Tel 0522985174

Date de consultation : 20 / 1 / 2018

Nom et prénom du malade : TALEB AICHA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Prout cutané

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : H

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Cas Le : 12 / 2 / 2018


Signature de l'adhérent(e) : LM

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20.1.24.	U.		150 DA	Dr ANNIS sophia Medecine générale 26 rue François villon cite plate riviera Casablanca Tel 0522985174

Dr BENNIS Sophia
Médecine générale
26 rue François Villon cité Plateau
riviera Casablanca
Tel 0522985174

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE KADMRI 27, Rue Ahmed KADMIRI Cité Plateau Lycée Al Waha 022.99.43.95 - Casablanca	20/01/2024 20/01/2024 05/02/2024	314 Dhs A31,50 131,2 Dhs

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature de l'analyste et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Rés. Masurel, Rue Soerat, Immeuble N° 20-00 Casablanca Tél.: 0522 23 36 03 / 0522 23 34 65 - Fax: 0522 25 85 08 Email : labo.socrate@menara.ma	20/01/24	B300 +11%	427,02 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre -				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

Central Drama

PPV 16DH60
EXP 11/2028
LOT 2D0342

Cabinet Médical

الدار البيضاء في Casablanca le 20. 1 - 24

الدكتورة بنيس صوفيا
الطب العام

Dr Dennis Sophia
Médecine Générale



TAREB ACHA.
ORDONNANCE

PHARMACIE ZYMA
27, Rue Ahmed KADMIRI
Cité Plateau Lycée Al Waha
Tél : 022.99.43.95 - Casa

78.60 11 Alora 5 mg
1 mg au mélange

S.V.

20. systol plic
1 mg 2x15

131,50 31. Starval
1 mg 15

S.V.

77, Rue AL Bachir Lallaï
Cité Plateau - Casa - N.P.E : 092024256
Tél : 0522 25 96 06 - I.C.E : 00151323900000
PHARMACIE EL HILIA
LABBOUDI SELLWA

Dr BENNIS Sophia
Médecine générale
26 rue François Villon
riviera Casablanca
Tel 0522 98 51 74

TM de 3 mois

87,50 41. Nebilet 5 mg
1/2 mg 15

S.V.

زنقة فرانسوا فيون، حي البطحاء، ريفيرا - الدار البيضاء
26, Rue François Villon, Cité Plateau, Riviéra - Casablanca
Tél. : 05 22 98 51 74 - Mail : bennissophia74@gmail.com

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

STARVAL® 160 mg.
STARVAL® 80 mg.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

STARVAL® 160 mg

La substance active est :

Valsartan..... 160 mg

STARVAL® 80 mg

La substance active est :

Valsartan..... 80 mg

Pour un comprimé pelliculé

Les autres composants :

Noyau (en commun) : Cellulose microcristalline, Crospovidone, Sili coloïdique anhydre, Stéarate de magnésium, Amidon prégalatinisé, e purifiée.

Préculture : Opadry 03GS2389 Jaune (pour STARVAL® 80 mg), Opad 03GS4386 rose (pour STARVAL® 160 mg)

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente en boîtes de 14 & 28 comprimés pelliculés.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antagonistes de l'angiotensine II, non associés (code ATC : C09CA03).

5. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

STARVAL®, comprimé pelliculé, peut être utilisé pour trois affections différentes:

- Pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes, les enfants et les adolescents âgés de 6 à 18 ans. L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition de ces pathologies.
- Pour le traitement de patients adultes ayant récemment subi une crise cardiaque (infarctus du myocarde). « Récemment » signifie ici entre 12 heures et 10 jours.
- Pour traiter les patients adultes atteints d'insuffisance cardiaque symptomatique. STARVAL®, comprimé pelliculé, est utilisé lorsqu'une famille de médicaments appelés les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (médicaments utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque) ne peut être utilisée ou bien peut être administré en plus des IEC quand d'autres médicaments ne peuvent pas être utilisés pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque comporte les symptômes suivants: souffle court et gonflement des pieds et des jambes par accumulation de liquide. Elle survient lorsque le muscle cardiaque ne parvient pas à pomper suffisamment de sang pour fournir la quantité de sang nécessaire à l'organisme.

6. POSOLOGIE & MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin afin d'obtenir les meilleurs résultats et réduire le risque d'effets indésirables. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne remarquent souvent aucun signe de la présence de cette maladie. La plupart des personnes peuvent se sentir plutôt normales. C'est pourquoi il est d'autant plus important que vous respectiez les rendez-vous avec le médecin, même si vous vous sentez bien.

- **Hypertension artérielle chez les patients adultes:** La dose recommandée est de 80 mg par jour. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire des doses plus fortes (ex. 160 mg ou 320 mg). Il pourra également associer STARVAL®, comprimé pelliculé à un autre médicament (ex. un diurétique).

- **Hypertension chez les enfants et adolescents (âgés de 6 à 18 ans)**
Chez les patients de poids inférieur à 35 kg, la posologie habituelle est de 40 mg de valsartan une fois par jour.

Chez les patients pesant 35 kg ou plus, la posologie habituelle est de 80 mg de valsartan une fois par jour.

Dans certains cas, votre médecin pourra vous prescrire des doses plus élevées (la posologie peut être augmentée à 160 mg et jusqu'à un maximum de 320 mg).

ts adultes:

lement débute dès la médecine augmentera suivantes jusqu'à une finale dépend de votre

un autre traitement de tement est approprié

: fois par jour. Votre cours des semaines fois par jour. La dose

un autre traitement de quel traitement est

imprimé pelliculé que

ses sévères et/ou des

immédiatement votre médecin, et allongez-vous. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, consultez votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, ne prenez pas la dose oubliée si le moment de votre prochaine prise est proche.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé

L'arrêt de votre traitement par STARVAL® peut entraîner une aggravation de votre maladie. N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre STARVAL®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments. Prenez STARVAL®, comprimé pelliculé avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez STARVAL®, comprimé pelliculé à peu près au même moment tous les jours.

7. CONTRE-INDICATION

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au Valsartan ou à l'un des autres composants contenus dans STARVAL®, comprimé pelliculé,
- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter

de prendre STARVAL® en début de grossesse ; si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et/ou par un antihypertenseur appelé Aliskiren EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8. EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas toujours.

Certains effets indésirables peuvent être gênants ou empêcher la charge médicale immédiate :

En cas de symptômes d'angio-oedème chez :

- gonflement du visage, des lèvres, des paupières,
- difficultés à respirer ou à avaler,
- urticaire, démangeaisons.

Si vous ressentez l'un de ces symptômes immédiatement, votre médecin (ou employeur) : Mises en garde spéciales ».

Autres effets indésirables :

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• sensations vertigineuses,

• pression artérielle basse accompagnée de sensations vertigineuses et des sensations de débordement,

• fonction rénale diminuée (signes d'insuffisance rénale),

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• angio-oedème (voir rubrique « Certains effets indésirables peuvent être gênants ou empêcher la charge médicale immédiate »),

• perte de connaissance soudaine (syncope),

• sensation de tête qui tourne (vertige),

• importante diminution de la fonction rénale,

• spasmes musculaires, anomalies d'hypertonie (hypertonie),

• essoufflement, difficulté à respirer et piqûres ou piqûres des pieds ou des jambes (signes d'insuffisance rénale),

• toux,

• douleurs abdominales,

• nausée,

• diarrhée,

• fatigue,

• faiblesse,

Fréquence indéterminée (la fréquence des personnes n'a pas pu être déterminée) :

• appariition de cloques sur la peau (signes d'urticaire),

• réactions allergiques avec éruption cutanée, symptômes de fièvre, gonflements de la peau, douleur musculaire, gonflement de la tête, symptômes grippaux peuvent survenir

• taches violacées à rougeâtres, d'inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

• saignements ou ecchymoses inhabituels,

• douleurs musculaires (maladie),

• fièvre, mal de gorge ou aphtes causés par la maladie, tache blanche ou bleue de globules blancs, également diminution du taux d'hémoglobine et de globules rouges, sang (ce qui peut, dans des cas sévères, entraîner une insuffisance rénale),

• augmentation du taux de potassium sévères, provoquer des spasmes musculaires cardiaques,

• augmentation des valeurs de la fonction hépatique et/ou biliaire (y compris une augmentation de la transaminase),

• douleurs abdominales (maladie),

• augmentation du taux d'urée sanguine (augmentation de la fonction rénale),

• augmentation de la fonction rénale (indiquer une fonction rénale anormale).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. DENOMINATION

STARVAL® 160 mg.
STARVAL® 80 mg.

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

STARVAL® 160 mg

La substance active est :

Valsartan..... 160 mg

STARVAL® 80 mg

La substance active est :

Valsartan..... 80 mg

Pour un comprimé pelliculé

Les autres composants :

Noyau (en commun) : Cellulose microcristalline, Crospovidone, Sili coloïdique anhydre, Stéarate de magnésium, Amidon prégalatinisé, e purifiée.

Préculture : Opadry 03GS2389 Jaune (pour STARVAL® 80 mg), Opad 03GS4386 rose (pour STARVAL® 160 mg)

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Ce médicament se présente en boîtes de 14 & 28 comprimés pelliculés.

4. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antagonistes de l'angiotensine II, non associés (code ATC : C09CA03).

5. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

STARVAL®, comprimé pelliculé, peut être utilisé pour trois affections différentes:

- Pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes, les enfants et les adolescents âgés de 6 à 18 ans. L'hypertension artérielle augmente l'effort fourni par le cœur et les artères. En l'absence de traitement, l'hypertension peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. L'hypertension artérielle augmente le risque de crise cardiaque. Le fait d'abaisser votre pression artérielle jusqu'à un niveau normal permet de diminuer le risque d'apparition de ces pathologies.
- Pour le traitement de patients adultes ayant récemment subi une crise cardiaque (infarctus du myocarde). « Récemment » signifie ici entre 12 heures et 10 jours.
- Pour traiter les patients adultes atteints d'insuffisance cardiaque symptomatique. STARVAL®, comprimé pelliculé, est utilisé lorsqu'une famille de médicaments appelés les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) (médicaments utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque) ne peut être utilisée ou bien peut être administré en plus des IEC quand d'autres médicaments ne peuvent pas être utilisés pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque comporte les symptômes suivants: souffle court et gonflement des pieds et des jambes par accumulation de liquide. Elle survient lorsque le muscle cardiaque ne parvient pas à pomper suffisamment de sang pour fournir la quantité de sang nécessaire à l'organisme.

6. POSOLOGIE & MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin afin d'obtenir les meilleurs résultats et réduire le risque d'effets indésirables. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ne remarquent souvent aucun signe de la présence de cette maladie. La plupart des personnes peuvent se sentir plutôt normales. C'est pourquoi il est d'autant plus important que vous respectiez les rendez-vous avec le médecin, même si vous vous sentez bien.

- **Hypertension artérielle chez les patients adultes:** La dose recommandée est de 80 mg par jour. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire des doses plus fortes (ex. 160 mg ou 320 mg). Il pourra également associer STARVAL®, comprimé pelliculé à un autre médicament (ex. un diurétique).

- **Hypertension chez les enfants et adolescents (âgés de 6 à 18 ans)**
Chez les patients de poids inférieur à 35 kg, la posologie habituelle est de 40 mg de valsartan une fois par jour.

Chez les patients pesant 35 kg ou plus, la posologie habituelle est de 80 mg de valsartan une fois par jour.

Dans certains cas, votre médecin pourra vous prescrire des doses plus élevées (la posologie peut être augmentée à 160 mg et jusqu'à un maximum de 320 mg).

ts adultes:

lement débute dès la médecine augmentera suivantes jusqu'à une finale dépend de votre

un autre traitement de tement est approprié

: fois par jour. Votre cours des semaines fois par jour. La dose

un autre traitement de quel traitement est

imprimé pelliculé que

ses sévères et/ou des

immédiatement votre médecin, et allongez-vous. Si vous avez accidentellement pris trop de comprimés, consultez votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Toutefois, ne prenez pas la dose oubliée si le moment de votre prochaine prise est proche.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre STARVAL® 160 mg, comprimé pelliculé

L'arrêt de votre traitement par STARVAL® peut entraîner une aggravation de votre maladie. N'arrêtez pas votre traitement sauf avis contraire de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre STARVAL®, comprimé pelliculé avec ou sans aliments. Prenez STARVAL®, comprimé pelliculé avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez STARVAL®, comprimé pelliculé à peu près au même moment tous les jours.

7. CONTRE-INDICATION

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au Valsartan ou à l'un des autres composants contenus dans STARVAL®, comprimé pelliculé,
- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter

de prendre STARVAL® en début de grossesse ; si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et/ou par un antihypertenseur appelé Aliskiren EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8. EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas toujours.

Certains effets indésirables peuvent être gênants ou empêcher la charge médicale immédiate :

En cas de symptômes d'angio-oedème chez :

- gonflement du visage, des lèvres, des paupières,
- difficultés à respirer ou à avaler,
- urticaire, démangeaisons.

Si vous ressentez l'un de ces symptômes immédiatement, votre médecin (ou employeur) : Mises en garde spéciales ».

Autres effets indésirables :

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• sensations vertigineuses,

• pression artérielle basse accompagnée de sensations vertigineuses et des sensations de débordement,

• fonction rénale diminuée (signes d'insuffisance rénale),

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• angio-oedème (voir rubrique « Certains effets indésirables peuvent être gênants ou empêcher la charge médicale immédiate »),

• perte de connaissance soudaine (syncope),

• sensation de tête qui tourne (vertige),

• importante diminution de la fonction rénale,

• spasmes musculaires, anomalies d'hypertonie (hypertonie),

• essoufflement, difficulté à respirer et piqûres ou piqûres des pieds ou des jambes (signes d'insuffisance rénale),

• toux,

• douleurs abdominales,

• nausée,

• diarrhée,

• fatigue,

• faiblesse,

Fréquence indéterminée (la fréquence des personnes n'a pas pu être déterminée) :

• appariition de cloques sur la peau (signes d'urticaire),

• réactions allergiques avec éruption cutanée, symptômes de fièvre, gonflements de la peau, douleur musculaire, gonflement de la tête, symptômes grippaux peuvent survenir

• taches violacées à rougeâtres, d'inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

• saignements ou ecchymoses inhabituels,

• douleurs musculaires (maladie),

• fièvre, mal de gorge ou aphtes causés par la maladie, tache blanche ou bleue de globules blancs, également diminution du taux d'hémoglobine et de globules rouges, sang (ce qui peut, dans des cas sévères, entraîner une insuffisance rénale),

• augmentation du taux de potassium sévères, provoquer des spasmes musculaires cardiaques,

• augmentation des valeurs de la fonction hépatique et/ou biliaire (y compris une augmentation de la transaminase),

• douleurs abdominales (maladie),

• augmentation du taux d'urée sanguine (augmentation de la fonction rénale),

• augmentation de la fonction rénale (indiquer une fonction rénale anormale).



comprimé
pelliculé
voie orale

ALORA® 5mg

Desloratadine

Deva
Pharmaceutique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait entraîner des effets indésirables graves.
- Si l'un des effets indésirables devient gênant, n'hésitez pas à en parler-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il n'est pas mentionné dans cette notice,

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ALORA 5 mg, comprimé pelliculé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALORA 5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre ALORA 5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables possibles ?
5. Comment conserver ALORA 5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'ALORA 5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique

Antihistaminique systémique

Indications thérapeutiques

Alora soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens). Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démange, les démangeaisons du palais, les yeux qui démangent, qui sont rouges ou larmoyants.

Alora est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALORA 5 MG, COMPRIME PELLICULE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Ne pas utiliser ALORA 5 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la desloratadine, à l'un des autres composants contenus dans ALORA, ou à la loratadine.

ALORA est indiqué chez l'adulte et l'adolescent (12 ans et plus).

Faites attention avec ALORA 5 mg, comprimé pelliculé :

• Si vous présentez une maladie des reins

Si vous êtes concerné ou si vous avez un doute, consultez votre médecin avant de prendre ALORA.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Il n'y a pas d'interactions connues d'ALORA avec d'autres médicaments.

Aliments et boissons

ALORA peut être pris pendant ou en dehors des repas.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament durant votre grossesse et si vous allaitez.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, l'utilisation d'ALORA n'est pas recommandée.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines : A la dose recommandée, ALORA ne rend généralement pas somnolent et ne diminue pas la vigilance.

Cependant, très rarement ont été rapportés des cas de somnolence susceptible d'affecter l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

Liste des excipients à effet notable

Informations importantes concernant certains composants d'Alora, comprimé pelliculé :

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ALORA 5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

NEBILET® 5 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez en avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

V140977/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés O

PPV 87DH50

Un médicament protecteur utilisé dans le traitement d'un ulcère;

pour traiter un excès d'acidité dans les ulcères (médicament antiacide), cimétidine ; NEBILET 5 mg doit être pris avec les repas et l'antiacide entre les

prises de ces médicaments est généralement déconseillée sous traitement par nébivolol sauf avis contraire de votre médecin.

3. COMMENT PRENDRE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable ?

Hypertension

La dose est généralement d'un comprimé par jour. Chez les sujets âgés et chez les insuffisants rénaux, la posologie initiale est de 1/2 comprimé par jour. L'activité antihypertensive se manifeste généralement après 1 à 2 semaines de traitement, l'effet maximal ne pouvant apparaître qu'au bout de 4 semaines. Votre médecin peut décider d'associer d'autres médicaments antihypertenseurs, en cas de réponse insuffisante.

Insuffisance cardiaque chronique stable

La posologie est adaptée à chaque patient, par augmentation progressive des doses toutes les 1 à 2 semaines en fonction de la tolérance.

Le traitement est instauré à 1,25 mg (soit 1/4 de comprimé) par jour pendant 1 à 2 semaines, selon la prescription de votre médecin.

Si le médicament est bien toléré, la posologie sera augmentée à 2,5 mg (soit 1/2 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, (soit 1 comprimé) une fois par jour pendant 1 à 2 semaines selon la prescription, et enfin à 10 mg (2 comprimés) par jour.

La posologie maximalement recommandée est de 10 mg une fois par jour.

Si vous prenez :

NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

La substance active est :

Nébivolol 5,00 mg
Sous forme de chlorhydrate de nébivolol 5,45 mg
pour un comprimé quadrisécable

Les autres composants sont :

Polysorbate 80, hyproméllose, lactose monohydraté, amidon de maïs, croscarmellose sodique, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

1. QU'EST-CE QUE NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable

ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé quadrisécable en boîte de 28 comprimés.

Ce médicament est un bêta-bloquant sélectif.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (d'origine inconnue).

Ce médicament est également utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable légère à modérée, en complément du traitement habituel de l'insuffisance cardiaque, chez les patients âgés de 70 ans ou plus.

• مرض مزمن للرئتين .
• توقف عن تناول ليثيوم 160
• لاحظت واحد من الأعراض
• أثار جانبية أخرى :
• قد يبالغ طبيبك أو صيدليك إذا
• شائعة (قد تحدث عند أقل من سنتين)
• اسأل .

رسالة الكمة من الدواء

الام في المعدة
غازات
غثيان
نقيفون
نسبة عالية من هـ
ارتفاع الأوموносـ
قد تم ارتباطها
علاقة سببية قدـ
ليلة التردد (قد تحدثـ
صداعـ

نصب عالية من مختلف أنزيمات
ارتفاع الألوموسين (كمية موجة
قد تم ارتباطها بخطورة عالية له
علاقة سلبية قد تم تبيانها)
كليلة التردد (قد تحدث عند أقل من شخص
صادر.
حالة الصفراوية.
انخفاض الشهوة الجنسية.
طفح حادى، حكة أو صفات حمراء على
ارتفاع الكرياتينين (تغرس من قبل الكلى
أو قد تحدث عند أقل من شخص 1 من
قدنار الشعر.

- ارتفاع البولة (نقرز من قبل الكلى)، تك
- حساسية مفرطة من الشمس، من مصابي
- انخفاض الهيموغلوبين (خضاب ينقبل
- البضاء، يكشف عنها التحاليل

آثار حاتمة غير معرفة للعدد:

- إحلال النسج العضلي.
- تعدد الحساسة الصفراوية.
- الشعور بالإرهاق.

قد يبالغ طبيبك أو مساعدتك إذا ظهر عندهك والإبلاغ عن الآثار الغير مرغوب فيها:

- إذا شعرت بأي آخر غير مرغوب فيه، أما على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد من خلال الإبلاغ عن الآثار الغير مرغوب منها المعلومات حول أمن الدواء.

5. كيف يتم حفظ ليثينيل 160 منغ فرس مقا
يجب إبقاء هذا الدواء بعيداً عن نظر ومتناول ا
عد استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلا
تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير
يحفظ هذا الدواء في العبوة الأصلية، بعيداً عن

الجرعة. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.
من بين تلك 160 مليون يعيشون
من ضمنهم النساء والأطفال والمسنين.
من ضمنهم 60 مليون يعيشون
لأنهم معرضون لخطر الإصابة.

فـذا تناولت لينينشل 60 ملغ قرص مغلف أكثر مما يجب أو لينينشل 15 ملغ قرص مغلف أكثر مما يجب أو لينينشل 15 ملغ قرص مغلف الأقرب.

إذا تناولت بيتيني يجب استشارة الطبيب فوراً أو اتصل بالطبيب
إذا نسيت تناول بيتينيل **160** ملغم قرص ملغ
تناول بيتينيل **160** ملغم قرص ملغ، تناول القرص

إذا تسببت سقوط الماء في إتلافه، فتحتم العودة إلى الماء، فإذا تم ذلك، ينجز العدد المطلوب.

٦- يمكن لبيثيل 160 منع انتشار عذول لبيثيل 160 ملغ فرم سوق تناولك هذا الدواء. فعلا، النسب

Laboratoires MAPHAR
Boulevard ALKIMIA N°6
Quartier Industriel,
Sidi Bernoussi - Casablanca
Maroc
P.P.V. : 116.80 DH

6 118001 181636

1858

اکنہاں کیا کہ تھا؟

٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء أثار جانبية، لكنها لا تظهر تلقائياً عند الجميع.

توقف فرا عن تناول بيسيل 160 من فرس مغلف و استشر حالا الطبيب، إذا ظهر عندك واحد من الآثار الجانبية الخطيرة التالية: قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ:

قلة التردد (قد تحدث هذه أقى من شخص 1 في 100).

تشنجات أو الالم، تحسس أو فشل عضلي: قد تدل على إلتهاب أو انحلال عضلي، والـ التي قد تؤدي إلى مشاكل كلوية، حتى الموت.

الآلام في المعدة: قد تدل على التهاب البنكرياس.
الآلام في الصدر وضيق التنفس: قد تدل على حملة دموية في الرئتين (انسداد رئوي).

الآن، اهتمار أو انتفاخ الساقين: قد تدل على جلطة دموية في ساق (جلطة وربدية عصبية)

التي قد تؤدي إلى صعوبات في التنفس.
اصفرار البشرة وبياض العيون (البرقان)، أو ارتفاع أنبىء بمات الكبد: قد تدل على،

الت�ب الكبد *Cholestatis* **أعراض** *Symptomes* **التشخيص** *Diagnose* **العلاج** *Therapie*

• طفح جلدي حاد مع احمرار، بثور و ونمات للجلد تشبه حروق شديدة.



Doliprane® 1000mg

PÁRACETAMOL

**Suppositoire
ADULTE (à partir de 15 ans)**

COMPOSITION ET PRÉSENTATION

1g de paracétamol pour un suppositoire de 2.5 g soit 10 g de paracétamol par boîte.

Boîte de 10

PROPRIETE

Ce médicament est un antipyrrétique et un analgésique. Il réduit la température corporelle et soulage les douleurs.

INDICAT

Traitemen 107 M4140

- douleurs
 - douleurs
 - douleurs dentaires et douleurs intercostales,
 - fractures, entorses, luxations, douleurs après traitement orthopédique,
 - douleurs au cours des interventions O.R.L.,
 - maux de tête, migraines,
 - règles douloureuses.

Traitemen~~t~~ de la fièvre, notamment :

- états grippaux, grippe,
 - maladies infectieuses, bactériennes et virales.

Quelques conseils pour mieux traiter la douleur

Le produit doit être pris toutes les 6 à 8 heures et de façon régulière, de manière à prévenir la réapparition de la douleur.

Respecter les posologies préconisées par votre médecin.

Quelques conseils pour mieux connaître Doliprane

Doliprane peut être associé aux médicaments suivants :

- anti-inflammatoires,
 - cortisone ou ses dérivés,
 - anticoagulants.

Doliprane peut être utilisé pendant la grossesse et pendant l'allaitement.

Doliprane n'est pas agressif pour votre estomac, ou votre intestin.

Il peut être pris en cas d'ulcère gastrique ou duodénal.

Bilan Biologique

Le : 20.1.14.

Nom/Prénom : Aicha Faiez

Age : 24 ans Sexe : H F

Hématologie

- NFS
- Plaquettes
- VS
- CRP
- Hémoculture

Bilan martial

- Fer Sérique
- CTF
- Ferritine
- Transferrine

Hémostase

- Temps de Prothrombine
- TCK
- Fibrinogène
- INR

Glucose

- Glycémie à jeun
- Hyperglycémie par VO
- Hémoglobine glyquée

Ionogramme sanguin

- NA+
- K+
- Cl+
- Ca++
- Phosphore
- Mg++
- Bicarbonat
- Urée
- Créatinine
- Acide urique

Autre :

Bilan lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

Fonction hépatique et enzymologie

- Amylasémie
- Bilirubine libre et conjuguée
- Phosphatas acide
- Phosphatas alcalines
- Lactate Déshydrogénase LDH
- Transaminases ASAT , ALAT
- Gamma-GT
- 5'Nucléotidase
- CPK (Créatine Phosphokinase)
- Troponine
- Electrophorèse des protéines EPP
- BNP

Ionogramme urinaire

- Na+
- K+
- Cl+
- Ca++
- Phosphore
- Mg++
- Bicarbonat
- Urée
- Cratinine

Examen des urines

- Protéinurie des 24h
- ECBU
- Antibiogramme

Groupage Sanguin

- ABO
- Rhésus
- RAI

Sérologie et immunologie

- VDRL-TRHA
- Hépatite B
 - Antigène Hbs
 - Anticorps Anti-Hbs
 - Anticorps Anti-Hbc
 - Anticorps Anti-Hbe
- Hépatite C
 - Anticorps Anti-HVC

- Sérologie Toxoplasmose
- Sérologie Rubéole
- B-HCG Plasmatique

- Facteur Rhumatoïde :
 - (Latex,Waaler Rose)
- Anticorps anti-nucléaires
- Anticorps Anti-DNA natif
- ASLO
- Dosage du Complément

Dr BENNIS Sophia
Médecine générale
Français villa cité plateau
26 rue Casablanca
tel 0522 755174



Code Patient : 160613A027
Date de l'examen : 02-02-2024

Saisie le 02-02-2024 09:06

Mme Aicha Ep Azzouzi TALEB
Réf : 240202A012
Prescription : Dr sophia bennis

BIOCHIMIE SANGUINE

Urée (Dosage enzymatique)	0.29 4.83	g/l mmol/l	(0.15–0.50) (2.50–8.33)	13-02-2023 0.26
Créatinine jaffé (Dosage cinétique)	7.5 66.4	mg/L μmol/L	(5.0–11.0) (44.3–97.4)	13-02-2023 6.5
Glycémie à jeun (Hexokinase G6PD-H)	1.10 6.11	g/L mmol/L	(0.83–1.10) (4.61–6.11)	13-02-2023 1.17
Acide Urique (Dosage enzymatique)	35 208	mg/L mmol/L	(24–57) (143–339)	13-06-2016 63
HbA1c (G8 Tosoh)	6.2	%	(4.0–6.0)	
Cholestérol total (Dosage enzymatique)	* 2.86 7.40	g/l mmol/L	(<2.00) (<5.17)	
Triglycérides (Dosage enzymatique)	* 2.34 2.34	g/L mmol/L	(<1.50) (<1.50)	

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SOCRATE

Résidence Masurel ,Angle Rue Socrate et Bd Yacoub EL Mansour IMM C N°4 –
CASABLANCA
Tél : 0522 23 36 03. Fax : 0522 25 85 08 - PATENTE : 35804986- CNSS : 6478417
BP 19078021211 507790200 18 18. AGENCE YACOUB EL MANSOUR CASABLANCA
IF 44409091 ICE 000114556000027

INPE 0093001964



Dr. Abdellatif LOUDGHIRI
Pharmacien Biogiste
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Bactériologie–Biochimie–Hématologie
Mycologie - Parasitologie – Virologie

FACTURE N° : 240000506

CASABLANCA le 02-02-2024

Mme Aicha Ep Azzouzi TALEB

Demande N° 240202A012

Numéro de l'adhérent :

Numéro de prise en charge :

Date de l'examen : 02-02-2024

Analyses :

CN	Analyse	Récapitulatif des analyses		
		Clé	Clé	Total
PS	Prélèvement sang	E25	E	25.00 MAD
B100	Acide urique sanguin	B30	B	40.20 MAD
B106	Cholestérol total	B30	B	40.20 MAD
B111	Créatinine	B30	B	40.20 MAD
B118	Glycémie	B30	B	40.20 MAD
B119	Hémoglobine glycosylée	B100	B	134.00 MAD
B134	Triglycérides	B50	B	67.00 MAD
B135	Urée	B30	B	40.20 MAD
Total				427.00 MAD

Total des B : 300

TOTAL DOSSIER : 427.00DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : quatre cent vingt-sept dirhams

Le Laboratoire d'Analyses Médicales Socrate
s. Masurel, Rue Socrate, Imm C N°4 - 20.000 Casablanca
Tél: 0522 23 36 03 / 0522 23 34 65 - Fax: 0522 25 85 08
E-mail : labo.socrate@menara.ma