

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-0027034

194577

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 13.6

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TOUFAH SOTAIL

Date de naissance : 01/01/49


Adresse : Rue 13 villa 104 oufle - Casab

Tél. 0661517353

Total des frais engagés : 680,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 08 FEV 2022

Nom et prénom du malade : CHARLY Fatima ej iou Fati Age :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 09/02/2022

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Hassani 1516 bld Hassani Le Caire - Tel: 0522974457	08-02-24	480.50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
	25533412
D	00000000
	00000000
	35533411
	21433552
	00000000
	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

1

14°

Casablanca, le

08 FEV 2024

لدارالبيضا، في):

طیب محلف

خبير لدى المحاكم

et TOUFAH

1. Quinolox

23.80

2. Hejauac

3 - $14^{\circ} 0' 0''$ up
Odees 20

60, 000

4. ~~Entelognathia~~

2.2  2007

5. Bedelik 3c

185

9 2

180.)



Finanziarie KIND
Soc. Coop. Immobiliare
Loc. Montebello - 5104511
Lot. 1000 - 5104457
N. 516 B - Tel. 051/220000
Casa - Tel. 051/220000

ادكتور سعيد الكحولة
طبيب محترف، متخصص في الامراض
النفسية والسلوكية لدى المعاو
60 - قرب مستشفى الحسين - الدار البيضاء
مارعلا - 022 90 70 88
هاتف: 91 55

60، طرق مولاي التهامي (قرب مصحة الضمان الاجتماعي) مازولا. الحي الحسني. الدار البيضاء

60, Route Moulay Thami (à côté de la Polyclinique Hay Hassani), Mazola - Hay Hassani - Casablanca

تيل: 05 22.90.70.88 - البريد الإلكتروني: drgqza@gmail.com - INPE: 091069666 - IF: 51469500

كينولوكس® 200 (أفلوكساسين)

التقديم :

أقراص : علبة من 10 أقراص

أقراص : علبة من 20 قرص

التركيب :

أفلوكساسين..... 200 ملغ
كمية كافية لـ 1 قرص..... سواغ

لائحة سواغ ذات تأثير معلوم : لاكتوز
الخاصيات :

الأفلوكساسين مضاد حيوي من عائلة الفلويوروكينولون.

دواعي الاستعمال :

- تغثنات الجهاز البولي و التناسلي
- تغثنات العظام
- تغثنات القصبة الهوائية
- تغثنات الفم و الانف و الحنجرة
- التغثنات الصعبة للبروستات

نواهي الاستعمال :

- حساسية للأدوية من عائلة الفلويوروكينولون
- مرض الصرع
- نقص في كليكوز - 6 - فوسفاط - ديزيدروجيناز
- الأطفال و المراهقون في طور النمو
- المرأة الحامل أو المرضع

التأثيرات الغير المرغوب فيها :

- اضطرابات هضمية : غثيان، آلام المعدة، إسهال، قيء
- مظاهر حساسية جلدية
- آلام العضلات و العظام
- صداع، اضطرابات في النظر، دوخة

احتياطات الإستعمال :

- تجنبوا التعرض لأشعة الشمس
- في حالة قصور كلوي يجب تغيير المقادير

المقادير و طريقة الإستعمال :

خاص بالبالغين :

- قرص صباحاً و قرص مساء

- في بعض الحالات تكتفون القصبة الهوائية قرصين في مرّة واحدة

- لا يترك في متناول أيدي الأطفال

LOT : 5196
PER : 08 - 26
P.P.V : 149 DH 00

QUINOLOX® 200

Oflloxacine

Formes et présentations :

Comprimés : Boîte de 10

Comprimés : Boîte de 20

Composition :

Oflloxacine (DCI)..... 200 mg

Excipients q.s.p..... 1 comprimé

Excipients à effet notoire : lactose

Propriétés :

- L'ofoxacine est un antibiotique de synthèse appartenant à la famille des fluoroquinolones. Le spectre antibactérien naturel de l'ofoxacine est le suivant :

- espèces habituellement sensibles : *Escherichia coli*, *Citrobacter*, *Proteus mirabilis*, *Proteus indole +*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*, *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia enterolitica*, *Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli*, *Aeromonas hydrophila*, *Plesiomonas*, *Haemophilus influenzae* et *para-influenzae*, *Haemophilus ducreyi*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Branhamella catarrhalis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus coagulase négative*, *Clostridium perfringens*, *Mycoplasma*, *Chlamydia trachomatis*, *Legionella*;

- espèces habituellement résistantes : *Bactéroides fragiles*, *Clostridium difficile*, *Listeria*, *Nocardia*.

Les *Staphylococcus aureus* résistants à la méticilline sont généralement résistants à l'ensemble des fluoroquinolones.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte au traitement des infections urinaires, gynécologiques, ostéoarticulaires, bronchiques et ORL et intervient aussi dans le traitement des infections sévères dans les manifestations prostatiques.

Contre-indications :

- Allergie aux médicaments du groupe des quinolones.
- Epilepsie.
- Déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase.
- Enfants et adolescents en période de croissance.
- Antécédents de tendinopathie avec une fluoroquinolone.
- Femme enceinte ou qui allaité.

Effets indésirables :

- Troubles digestifs : nausées, gastralgies, diarrhées, vomissements.
- Manifestations cutanées allergiques.
- Douleurs musculaires et/ou articulaires, tendinites.
- Troubles neurologiques : céphalées, troubles de la vision, vertiges; exceptionnellement, hallucinations signalées chez les personnes âgées.
- Augmentation modérée des transaminases et de la créatininémie.

Mises en garde et précautions d'emploi :

- Eviter l'exposition au soleil et aux rayonnements UV pendant la durée de traitement en raison du risque de photosensibilisation.
- L'ofoxacine doit être administrée à distance des antiacides à deux heures d'intervalle.
- La posologie doit être adaptée chez les sujets présentant une altération de la fonction rénale.

Posologie et mode d'emploi :

- Réservé à l'adulte

La posologie habituellement est de 400 mg/j, soit 1 comprimé matin et 1 comprimé soir.

Dans certaines infections bronchiques, la dose est de 400 mg/j en une seule prise, soit 2 comprimés en une seule fois. Cette posologie peut augmenter selon la gravité de l'infection.

- Ne pas laisser à la portée des enfants

- Liste I



Laboratoires Pharmaceutiques PHARMA 5
21, Rue des asphodèles - Casablanca

PACKAGE LEAFLET : INFORMATION FOR THE USER

Enterogermina® 2 billion/5 ml, oral suspension

Enterogermina® 2 billion, hard capsules

Spores of polyantibiotic-resistant *Bacillus clausii* – oral use

Read this leaflet carefully before you start taking this medicine as it contains important information for you.

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you would like more information or advice, ask your doctor or pharmacist.
- If you experience any of the undesirable effects, including effects not listed in this leaflet, speak to your doctor or pharmacist. See section 4.
- Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

What is in this leaflet :

1. What Enterogermina is and what it is used for
2. What you need to know before you take Enterogermina
3. How to take Enterogermina
4. Possible side effects
5. How to store Enterogermina
6. Further information

1. WHAT ENTEROGERMINA IS AND WHAT IT IS USED FOR

Enterogermina is a medicine consisting of a spore suspension of *Bacillus clausii*, normally present in the intestine, without disease-causing capacity (without pathogenic ability).

Enterogermina is used for:

- the prevention and treatment of the alteration of the normal balance of intestinal flora (gut microbiota) and vitamin deficiencies in the body resulting from the imbalance of intestinal flora (endogenous avitaminosis),
- co-adjvant treatment to restore intestinal microbial flora altered during treatment with antibiotics or chemotherapy,
- the treatment of acute and chronic gastro-intestinal diseases of infants caused by poisoning or alteration of the normal balance of intestinal flora (intestinal dysmicrobism) or vitamin deficiencies in the organism (avitaminosis).

Health education notes

The intestinal bacterial flora constitutes a real defensive barrier against harmful bacteria. Its balance can be upset by intestinal infections, poisoning, food disorders, changes in diet or use of antibiotics. This imbalance manifests itself as diarrhoea, abdominal pain and an increase in air in the intestine.

Talk to your doctor if you do not notice any improvements or if you notice a worsening of symptoms after a brief period of treatment.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ENTEROGERMINA

Contra-indications :

Do not take Enterogermina

If you are allergic to spores of polyantibiotic-resistant *Bacillus clausii* or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

Appropriate precautions for use ; Special warnings :

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Enterogermina.

This medication is for oral use only. Do not inject or administer through other routes. Impression d'injection

severe anaphylactic reactions such as anaphylactic shock.

During treatment with antibiotics, ingest Enterogermina between one admin.

If you notice the presence of corpuscles, or of tiny particles in the Enterogermina suspension, this is normal. These are impaired, as these are simply clusters of *Bacillus clausii* spores.

Other medicines and Enterogermina

Inform your doctor or your pharmacist if you are taking, have recently taken or are about to take other medicines.

No disorders (interactions) are envisaged concerning the association between 1

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1
Ain sebaâ Casablanca
Enterogermina 2 milliards
susp b 10 ml
P.P.V : 60,00 DH
5 113001 081653



bedelix® 3g

Montmorillonite beidellitique

poudre pour suspension buvable en sachet

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ?
3. Comment prendre BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES

ADSORBANTS INTESTINAUX. code ATC : A07BC05

Ce médicament agit en protégeant les parois (muqueuses) de votre estomac et de votre intestin.

Ce médicament est utilisé chez l'adulte en traitement symptomatique des manifestations fonctionnelles intestinales, c'est-à-dire pour traiter les symptômes liés à une maladie fonctionnelle du colon (maladie qui affecte le bon fonctionnement de l'intestin).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ?

Ne prenez jamais BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la montmorillonite beidellitique) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'une maladie provoquant un rétrécissement de votre tube digestif.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec BEDELIX :

Si vous êtes sous dialyse, cela signifie que vos reins fonctionnent mal et ceux-ci auront des difficultés à éliminer l'hydroxyde d'aluminium contenu dans ce médicament. Dans ce cas, vous ne devez pas prendre ce médicament pendant une période prolongée sans en parler à votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

Autres médicaments et BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet

Vous devez espacer la prise de BEDELIX et d'un autre médicament pour éviter de diminuer l'efficacité de l'autre traitement.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet avec des aliments et boissons

Vous prendre BEDELIX entre les repas ou un peu avant PER : 12/2021 Gr. 830 BE 6 P. P. U. 870H70 et S pensez à la grossesse 6 1180000 010234

Si, vous ossez, pharmacien avant