

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M23-008378

197883

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4658

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ZKRAOUI ADBRAHMAN

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0653974351

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

26/02/2024

Nom et prénom du malade :

HAMMAZI

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

RHUMATISMALE

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/02/2024	h		300,00	Dr. Salma Eddine MAAROUFI RHUMATOLOGUE 124, Bd. La Liberté - Casablanca Tél : 05 42 30 91 54 - 05 22 54 29

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE FARIDA CASABLANCA Mme SIALI GUENNOU INTESA 226, Boulevard AL Joubani Salimia 2 Casablanca Tél : 05 22 54 29	26/02/2024	99,50
	26/02/2024	633,50

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. Salma Eddine MAAROUFI RHUMATOLOGUE 124, Bd. La Liberté - Casablanca Tél : 05 42 30 91 54 - 05 22 54 29	26/02/2024	7 60	700,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

Dr. Salah Eddine Maâroufi

الدكتور صالح الدين المعروفي

CES de RHUMATOLOGIE

Médecine Manuelle et Osteopathie

Echographie, Osteoarticulaire

Rhumatisme, Maladies des os,
des Articulations, de la colonne vertébrale,

des muscles et des pieds

Diplômé de la faculté de

Medecine de Marseille

Ex. Attaché au C.H.U de Montpellier

خريج كلية الطب بمرسيليا

ملحق سابق بمستشفيات مونبولي

اختصاصي في أمراض العظام، المفاصل

العمود الفقري، العضلات والأرجل

علاج العمود الفقري و المفاصل

بالتطبيب اليدوي

الفحص بالصدى للجهاز الحركي

Casablanca, le:.....26/02/2024.....

MME HAMMADI MAMA

• Isox 100 mg (1 bte de 20)

1 gel / jour après repas

• Plascledine 300 mg - gélule

1 cp / jour au milieu du repas de midi x 3 mois

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

PHARMACIE FADILA CASABLANCA

Line FIL AL GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Jorre

Salmia 2 - Casablanca

Tel: 05 22 38 01 47

ICE: 00211585400092

**PIASCLEDINE® 300 mg, gélule
Insaponifiables d'avocat et de soja**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PIASCLEDINE 300 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
3. Comment prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE PIASCLEDINE 300 mg, gélule
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament contient une substance active extraite d'huiles d'avocat et de soja.

Ce médicament agit sur les articulations (il appartient au groupe de médicaments appelés autres agents anti-inflammatoires non stéroïdiens).

Si vous avez p
que vous n'aure

Les surdosages d
ou exacerber de
ou hépatiques. Si

PIASCLEDINE supérieure à dose recommandée,
consultez immédiatement votre médecin ou votre
pharmacien.

Si vous oubliez

Ne prenez pas de
dose que vous av
suivante du médi

6 118001 072644

3305461

Si vous avez d'autres questions sur ce médicament,
demandez pls d'informations à votre
médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec PIASCLEDINE sont des diarrées, des douleurs abdominales, une gêne en haut de l'abdomen et des nausées.

Effets indésirables graves possibles :

Contactez immédiatement votre médecin et arrêtez le traitement en cas de survenue de l'un des effets indésirables suivants, qui pourrait être grave et pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical en urgence :

Signes et symptômes qui peuvent être des signes de réactions allergiques sévères (peu fréquents) :
Démangeaisons, urticaire, éruption/rougeurs cutanées, gonflement du visage, difficultés respiratoires.
Éruption cutanée intense (rare)

Troubles hépatiques (peu fréquents) :

Des lésions hépatiques ou une obstruction des canaux biliaires pouvant être associées parfois à un jaunissement de la peau et une augmentation des enzymes hépatiques.

PFV 188.00 DH

LABORATOIRES SOTHEMA

supérieure à dose recommandée,

consultez immédiatement votre médecin ou votre

pharmacien.

Si vous oubliez

Ne prenez pas de

dose que vous av

suivante du médi

6 118001 072644

3305461

Si vous avez d'autres questions sur ce médicament,

demandez pls d'informations à votre

médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.



**PIASCLEDINE® 300 mg, gélule
Insaponifiables d'avocat et de soja**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PIASCLEDINE 300 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
3. Comment prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE PIASCLEDINE 300 mg, gélule
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament contient une substance active extraite d'huiles d'avocat et de soja.

Ce médicament agit sur les articulations (il appartient au groupe de médicaments appelés autres agents anti-inflammatoires non stéroïdiens).

Si vous avez p
que vous n'aure

Les surdosages d

ou exacerber de

ou hépatiques. Si

PIASCLEDINE supé

re à dose recommand

consultez immédia

ment votre mède

cien ou votre phar

macien.

Si vous oubliez

Ne prenez pas de

dose que vous av

suivante du mèd

6 118001 072644

PFV 188.00 DH

LABORATOIRES SOTH

EMA

5 305461

Si vous avez d'autre

médicament, demandez

pas d'informations à

votre mède

cien, à votre phar

macien ou à votre infir

mier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce mèdicament

peut provoquer des effets indésirables,

mais ils ne

surviennent pas systématiquement chez tout le

monde.

Les effets indésirables les plus fréquemment rap

portés avec PIASCLEDINE sont des diarrhées,

des douleurs

abdominales, une gêne en haut de l'abdomen

et des

nausées.

Effets indésirables graves possibles :

Contactez immédiatement votre mède

cien et arrêtez

le traitement en cas de survenue de l'un des

effets

indésirables suivants, qui pourrait être

grave et pour

lequel vous pourriez avoir besoin d'un

traitement

médical en urgence :

Signes et symptômes qui peuvent être des signes

de réactions allergiques sévères (peu fréquents) :

Démangeaisons,

urticaire,

éruption/rougeurs cutanées,

gonflement du visage,

difficultés respiratoires.

Éruption cutanée intense (rare)

Troubles hépatiques (peu fréquents) :

Des lésions hépatiques ou une obstruction des

canaux biliaires pouvant être associées parfois à

un jaunissement de la peau et une augmentation

des enzymes hépatiques.

PIASCLEDINE® 300 mg, gélule
Insaponifiables d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PIASCLEDINE 300 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
3. Comment prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE PIASCLEDINE 300 mg, gélule
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament contient une substance active extraite des huiles d'avocat et de soja.

Il appartient à la classe des agents anti-

Si vous avez pris plus de PIASCLEDINE 300 mg que vous n'auriez dû,

Les surdosages de PIASCLEDINE peuvent provoquer ou exacerber des symptômes hépatiques. Si vous avez pris plus de PIASCLEDINE que recommandé, consultez immédiatement un professionnel de la santé ou un pharmacien.

6 118001 072644

8305461

Si vous oubliez de prendre PIASCLEDINE D'AVOCAT ET DE SOJA

Ne prenez pas de PIASCLEDINE si vous avez pris plus de PIASCLEDINE que recommandé ou si vous avez pris PIASCLEDINE lorsque vous n'en aviez pas besoin.

Si vous avez pris plus de PIASCLEDINE que recommandé, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec PIASCLEDINE sont des diarrhées, des douleurs abdominales, une gêne en haut de l'abdomen et des nausées.

Effets indésirables graves possibles :

Contactez immédiatement votre médecin et arrêtez le traitement en cas de survenue de l'un des effets indésirables suivants, qui pourrait être grave et pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical en urgence :

Signes et symptômes qui peuvent être des signes de réactions allergiques sévères (peu fréquents) :

Démangeaisons, urticaire, éruption/rougeurs cutanées, gonflement du visage, difficultés respiratoires.

Éruption cutanée intense (rare)

Troubles hépatiques (peu fréquents) :

Des lésions hépatiques ou une obstruction des canaux biliaires pouvant être associées parfois à une fièvre et une augmentation

KÜHLENDES SOFT-GEL

Kühlt, pflegt, lockert, beruhigt sofort

Was ist newflex kühlendes Sofort-Gel und wann wird das Produkt angewendet?

newflex kühlendes Sofort-Gel ist für die sofortige und direkte Anwendung vor allem vor währing und nach sportlicher Aktivität oder körperlicher Arbeit. Es beugt dem Muskelkater vor, kühlt und vermindert das Verletzungsrisiko. Enthält keine Parabene und ist dermatologisch getestet.

Entspannend, entkrampfend, wohltuend, kühlend, pflegend und beruhigend.

Was sollte bei der Anwendung von newflex kühlendes Sofort-Gel beachtet werden?

Es ist wichtig, die Anwendungsinformation zu befolgen!

- Massieren Sie die entsprechenden Körperteile vor sportlicher Aktivität oder reiben Sie mehrmals täglich die entsprechenden Körperteile ein.

Bei newflex kühlendes Sofort-Gel sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine unerwünschten Wirkungen bekannt.

Verwenden Sie newflex kühlendes Sofort-Gel nicht:

- bei offenen Wunden
- in Verbindung mit lufthaltig abschließenden Kompressen. Zitroneöl kann die Haut reizen.
- Vor Sonnenbädern oder Sonnenbankanwendungen.

Wann ist bei der Anwendung von newflex kühlendes Sofort-Gel besondere Vorsicht geboten?

- Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- Informieren Sie eine Fachperson, wenn Sie an Krankheiten leiden. Allergien haben oder andere Medikamente einnehmen. Dies gilt auch für Medikamente, die Sie selbst gekauft haben.

Wie wenden Sie newflex kühlendes Sofort-Gel an?

- newflex kühlendes Sofort-Gel ist für die mehrmalige Verwendung, zum Beispiel vor dem Sport entwickelt worden. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie Fachpersonal wie Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendungshinweise:

- Tragen Sie die entsprechende Menge auf die betroffenen Hautpartien auf und massieren Sie es

ISOPHARM NEWFLEX COOLING GEL 99.90 dhs

10/25

LOT 718

MFD 11/21

Odswieza, chłodzi, relaksuje, obniża napięcie mięśniowe, chłodzi.

Co to jest Newflex Żel chłodzący /żel chłodzące Newflex?

Żel chłodzący Newflex jest polecanym po każdym wysiłku związanym z aktywnością fizyczną skurczów mięśni i obniżaniem temperatury. Testowany dermatologicznie. Relaksuje, obniża napięcie mięśniowe, chłodzi.

O czym należy wiedzieć przed użyciem Żelu chłodzącego Newflex?

- Pzed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania.
- Pzed podjęciem wysiłku fizycznego energetycznymi ruchami części ciała i tworząc żel kilka razy dziennie w miarę potrzeby.

Kiedy nie należy stosować żelu chłodzącego Newflex?

- Nie zapotrzebowanie wystąpienia objawów niepożądanych w przypadkach jego właściwego zastosowania. Są one związane z reakcją alergiczną na żel lub jego składniki. W tym wypadku żel powinno być natychmiast zatrzymane.
- Nie stosować żelu chłodzącego Newflex: nie jestem alergią, ale jestem alergią na żel lub jego składniki.
- Razem z opatrunkiem założonym na ranę nie zapotrzebowanie wystąpienia objawów niepożądanych w przypadku jego właściwego zastosowania.
- Bezpośrednio przed opalaniem się na słońcu lub w solarium nie stosować żelu chłodzącego Newflex.
- Nie ma szczególnych środków ostrożności, jeżeli produkt stosuje się zgodnie z zaleceniami.
- jeżeli korzystasz z pomocy medycznej, piontomuji, na jakie aktualnie ciężisz schorzenia, czy masz alergię, jakie leki zaszywasz, także takie, które kupujesz bez recepty.

Jak stosować żel chłodzący Newflex?

Żel chłodzący Newflex jest przeznaczony do użycia przed każdym wysiłkiem związany z pracą fizyczną lub aktywnością sportową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pytaj, stosuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób użycia:

Nanieść odpowiednią ilość żelu na skórę.

Jakie

ISOX® 100 mg et 200 mg

Gélules
Célectcoxib

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que Isox 100 mg et 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Isox 100 mg et 200 mg, gélule ?
- Comment prendre Isox 100 mg et 200 mg, gélule ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Isox 100 mg et 200 mg, gélule ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Isox 100 mg et 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?

Isox appartient à la classe des médicaments appelée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et plus spécifiquement au sous-groupe des cyclo-oxygénases-2 (COX-2) inhibiteurs. Votre corps produit des prostaglandines qui peuvent causer une douleur et une inflammation. Dans le cas de maladies telles que l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde, votre corps en produit plus. Isox agit en diminuant la production de prostaglandines et ainsi diminue la douleur et l'inflammation.

Isox est utilisé chez l'adulte pour soulager les signes et symptômes de l'**arthrose**, de la **polyarthrite rhumatoïde** et de la **spondyloarthrite ankylosante**.

Vous devez vous attendre à ce que le médicament commence à agir dans les heures qui suivent la première prise, mais il se peut qu'il faille quelques jours de traitement pour obtenir un effet complet.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Isox 100 mg et 200 mg, gélule ?

Isox vous a été prescrit par votre médecin. Les informations suivantes vous aideront à l'utiliser de façon optimale. Si vous avez d'autres questions, veuillez demander à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne prenez jamais Isox 100 mg et 200 mg, gélule :

Informez votre médecin si vous êtes concerné par l'un des cas suivants car ceux-ci ne permettent pas d'utiliser Isox :

- Si vous êtes allergique au célectcoxib ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés à la rubrique « Contenu de l'emballage et autres informations ».
- Antécédents d'allergie à la classe de médicaments appelée « sulfamides » (certains antibiotiques utilisés dans le traitement d'infections en font partie).
- Présence d'un ulcère ou d'une hémorragie au niveau de votre estomac ou de vos intestins.
- Antécédents d'asthme, de polypes dans le nez, de congestion nasale grave ou d'une réaction allergique avec éruption cutanée accompagnée de démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou du cou, des difficultés à respirer ou des râles, déclenchées par la prise d'acide acétylsalicylique ou d'un autre anti-inflammatoire utilisé contre la douleur (AINS).
- Grossesse. Si vous êtes susceptible d'être enceinte pendant votre traitement, vous devez discuter de mesures de contraception avec votre médecin.
- Allaitement,
- Maladie grave du foie,
- Maladie grave des reins,
- Maladie inflammatoire des intestins telle qu'une rectocolite hémorragique ou une

maladie de Crohn,

- Insuffisance cardiaque, cérébrovasculaire, tels qu'un accident ischémique cérébral ou un accident vasculaire cérébral (AVC), une crise d'angine, irragiant le cœur ou le cerveau.
- Présence ou antécédents d'ulcère ou d'hémorragie au niveau du périphérique (ou antécédents d'ulcère ou d'hémorragie au niveau de votre estomac ou de vos intestins).

Avertissements et précaution

Adressez-vous à votre médecin.

- Antécédents d'ulcère ou d'hémorragie au niveau de votre estomac ou de vos intestins (ou d'ulcère ou d'hémorragie au niveau de votre estomac ou de vos intestins).
82,00
- Utilisation d'acide acétylsalicylique, tels que l'ibuprofène ou le diclofénac. L'administration simultanée de ces médicaments doit être évitée.
- Tabagisme, diabète, hypertension ou cholestérol élevé.
- Pathologies du cœur, du foie ou des reins ; votre médecin pourra être amené à suivre de façon régulière.
- Rétention hydrique (cheveux et pieds gonflés).
- Déshydratation, par exemple suite à une maladie, des diarrhées ou la prise diurétiques (utilisés dans le traitement des œdèmes).
- Antécédents de réaction allergique ou de réaction cutanée grave à des médicaments.
- Sensation de malaise suite à une infection ou lors d'une suspicion d'infection, masquer une fièvre ou d'autres signes d'infection ou d'inflammation.
- Âge supérieur à 65 ans : votre médecin sera amené à vous surveiller de près.
- La consommation d'alcool et d'AINS peut augmenter le risque de problèmes intestinaux.

Comme avec les autres AINS (par exemple ibuprofène et diclofénac), ce médicament peut provoquer une augmentation de la tension artérielle ; c'est pourquoi votre médecin doit être amené à contrôler votre tension artérielle régulièrement.

Quelques cas de réactions hépatiques graves ont été rapportés avec le célectcoxib, telles qu'une inflammation hépatique grave, une réaction hépatique aiguë, une insuffisance hépatique (dont celles d'issue fatale ou nécessitant une greffe du foie). Dans lesquels le délai de survenue était rapporté, la plupart des réactions hépatiques sont apparues dans le mois suivant le début du traitement.

La prise d'Isox rend plus difficile une grossesse. Vous devez informer votre médecin si vous souhaitez être enceinte ou si vous avez des problèmes pour être enceinte (grossesse, allaitement et fertilité).

Autres médicaments et Isox 100 mg et 200 mg, gélule

- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou prendrez tout autre médicament.
- Du dextrométhorphane (médicament antitussif).
 - Des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), des antagonistes de l'angiotensine II, des bêta-blockants et des diurétiques (utilisés pour traiter l'hypertension, l'insuffisance cardiaque),
 - Du fluconazole ou de la rifampicine (médicament traitant les infections bactériennes),
 - De la warfarine ou d'autres médicaments de type warfarine (= anticoagulant) qui diminuent la formation de caillots sanguins, dont les nouveaux médicaments (l'apixaban),
 - Du lithium (médicament utilisé dans le traitement de certains types de dépressions),
 - D'autres médicaments utilisés pour traiter la dépression, les troubles du sommeil, l'hypertension artérielle ou un rythme cardiaque irrégulier,
 - Des neuroleptiques utilisés dans le traitement de certains troubles mentaux,
 - Du méthotrexate utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

ISOX® 100 mg

Célectcoxib
20 gélules

PROMOPHARM S.A.



6 118000 242420

Dr. Salah Eddine Maâroufi

الدكتور صالح الدين المعروفي

CES de RHUMATOLOGIE

خريج كلية الطب بمرسيليا

Médecine Manuelle et Osteopathie

ملحق سابق بمستشفيات مونبولي

Echographie, Osteoarticulaire

اختصاصي في أمراض العظام، المفاصل

Rhumatisme, Maladies des os,
des Articulations, de la colonne vertébrale,

العمود الفقري، العضلات والأرجل

des muscles et des pieds

علاج العمود الفقري و المفاصل

Diplômé de la faculté de

بالتطبيب اليدوي

Medecine de Marseille

الفحص بالصدى للجهاز الحركي

Ex. Attaché au C.H.U de Montpellier

Casablanca, le:.....26/02/2024.....

MME HAMMADI MAMA

Faire :

Radiographie:

- 2 Epaules : Face
- 2 Genoux : face en charge / schuss / profil

fait le : 26/02/2024

Dr. Salah Eddine MAAROUFI
RHUMATOLOGUE
124, Bd La Liberté Casablanca
Tél. 05 22 30 91 54 - 05 22 54 79

Dr. Salah Eddine MAAROUFI
RHUMATOLOGUE
124, Bd La Liberté Casablanca
Tél. 05 22 30 91 54 - 05 22 54 29

Dr. Salah Eddine Maâroufi

الدكتور صالح الدين المحروفي

CES de RHUMATOLOGIE

Médecine Manuelle et Osteopathie

Echographie, Osteoarticulaire

Rhumatisme, Maladies des os,
des Articulations, de la colonne vertébrale,

des muscles et des pieds

Diplômé de la faculté de

Medecine de Marseille

Ex. Attaché au C.H.U de Montpellier

خريج كلية الطب بمرسيليا

ملحق سابق بمستشفيات مونبولي

اختصاصي في أمراض العظام، المفاصل

العمود الفقري، العضلات والأرجل

علاج العمود الفقري و المفاصل

بالخطيب اليدوي

الفحص بالصدى للجهاز الحركي

Casablanca, le:.....26/02/2024.....

Facture

MME HAMMADI MAMA

Acte	Honorairè
Consultation	300,00 Dh
Radiographies	700,00 Dh
Total	1 000,00 Dh

Arrêté la présente facture à la somme de :
mille dirham(s)

Dr. Salah Eddine MAÂROUF
 RHUMATOLOGUE
 124, Bd. La Liberté - Casablanca
 Tél: 0522 30 91 54 - 0808 53 09 58
 123-05-2024



Dr MAAROUFI SALAHEDDINE
RHUMATOLOGUE
Diplôme de la faculté de Médecine
De Marseille
124, BD de la liberté Casablanca
Tel : 0522 30 91 54 / 0808530958

Casablanca Le 26 / 02 / 2024

Non Prénom :

MME HAMMADI MAMA

Signes clinique

➤ Depuis deux mois :

- Paresthésie du membre supérieur droit .
- Douleur lombofessière droite .

Bilan radiographique pratiqué :

- 2 Epaules : Face
➤ 2 Genoux : Face en charge , Schuss , Profil

Compte Rendu :

2 Epaules :

- Articulations gléno-humérales respectées .
- Cintre omo-huméral conservé .
- Pas de calcification tendineuse.
- Condensation du trochiter bilatérales .
- Diminution de l'espace sous acromiale .

2 Genoux :

- Arthrose femoro-tibiale interne et femoro-patellaire bilatérales moyennement évoluée prédominant à gauche .

Dr MAAROUFI SALAHEDDINE

Dr. Salah-Eddine MAAROUFI
RHUMATOLOGUE
124, Bd. La Liberté - Casablanca
Tel: 05 22 30 91 54 - 05 22 54 29