

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être sûrement renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

197885

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 4658

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

ZKRAOUI ADBRRAHMAN

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0653974351

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° A-A215 / 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/02/2024	6/5	3.00		Dr. Mohamed El Karkani Chirurgien Dentiste 404 Bd el Qods Assale - Tel: 0522 810 888 Anchouch, Casablanca - INPE: 141170035

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet de l'Pharmacie ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARAJI PHARMACEUTIQUE CASABLANCA Date FILAI LOUANNOU Ibtissam 226, Boulevard Al Jezira Santé 2 - Casablanca Tél.: 05 22 38 01 47 ICE : 002115854000092 IN.P.E : 092004500	12/02/2024	248,70

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire ou du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
DR MAHIZ ZOUHRI CASA N°9 EL JOULANE SALMA 2 TEL: 00854 0130 / ICE: 003034168000	13/02/24	✓	800,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
M. EL ARKANI Médecin Radiologue RDC 76A Bd. Djiss El Marti Cité Djmaa - Casablanca Tel: 05 22 57 65 65	12/02/24	R	Lomb-Sacrée F+P	300 DTH		





091145466

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX																		
																						
																						
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCOEFFICIENT MASTICATOIRE																					
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">H</td> <td style="text-align: right;">25533412</td> <td style="text-align: right;">21433552</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">00000000</td> <td style="text-align: right;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">D</td> <td style="text-align: right;">00000000</td> <td style="text-align: right;">00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">35533411</td> <td style="text-align: right;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">G</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	H	25533412	21433552		00000000	00000000	D	00000000	00000000		35533411	11433553	B			G					
H	25533412	21433552																				
	00000000	00000000																				
D	00000000	00000000																				
	35533411	11433553																				
B																						
G																						
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																					
CCEFFICIENT DES TRAVAUX																						
MONTANTS DES SOINS																						
DEBUT D'EXECUTION																						
FIN D'EXECUTION																						
DATE DU DEVIS																						
DATE DE L'EXECUTION																						

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



أخصائي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية والتتناسلية

Chirurgien Urologue - Andrologue

- Calculs appareil urinaire
- Cancers Urologiques
- Endoscopie diagnostique et interventionnelle
- Echographie-Laser-Dysfonction érectile
- Infertilité masculine - Incontinence urinaire
- Chirurgie des hernies

URGENCE : 0663 11 29 23

◦ حصى الكلى والمسالك البولية

◦ سرطان المسالك البولية والتتناسلية

◦ الفحص والجراحة بالمنظار

◦ الفحص بالصدى - تفتيت الحصى - الضعف الجنسي

◦ العقم عند الرجال - انفلات البول

◦ جراحة الفتق

NLPC, mini NLPC

إزالة حصى الكلى بدون جراحة

Tél: 05 22 870 888

Ordonnance

Casablanca, le: الدار البيضاء في :

١٢/٠٢/٢٠٢٤

Mr Zekraoui Abderrahmane

PHARMACIE FADILA-CASABLANCA

Mme FILALI GUENNOUIN bilam

226, Boulevard Al Joutoune

Saimia 2 - Casablanca

Tél.: 05 22 38 01 47

ICE : 00211585400092

I.N.P.E : 092004506



cp 5 mg

le n°:

pst 10

calibrat

cp 2 g

le n°:

Calcibronat® 2g

Comprimés effervescents

Bromo-galactogluconate de calcium

COMPOSITION

Un comprimé renferme 2 g de bromo-galactogluco-

Excipients : saccharose, bicarbonate de sodium, a

FORME PHARMACEUTIQUE

Boîte de 20 comprimés effervescents.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

HYPNOTIQUE ET SÉDATIF.

(N: Système nerveux central).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans les troubles le

ATTENTION

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans le

- acné juvénile,
- enfant de moins de 30 mois,
- sujet âgé dénutri et/ou déshydraté,
- hypercalcémie (quantité excessive de calcium dans le sang),
- lithiasis calcique (calcul de calcium),
- hypercalciurie (quantité excessive de calcium dans les urines)
- calcifications (dépôts de calcium) dans les reins,
- néphropathie glomérulaire chronique (maladie des reins),
- en raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucraseisomaltase.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

En cas de survenue de trouble neuropsychique (voir Effets indésirables), de rougeur ou démangeaisons de la peau, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Précautions d'emploi

L'absorption d'alcool est fortement déconseillée pendant le traitement.

En cas de régime pauvre en sel, tenir compte de l'apport en sodium par comprimé : 241 mg.

Chaque comprimé apporte environ 3 g de sucre. En tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Une interférence est possible avec le dosage des chlorures dans le sang.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

PPV 36DH20
EXP 10/2026
LOT 34006 4

Calcibronat®
2 g

20 COMPRIMES
EFFERVESCENTS

Calcibronat®
2 g
20 COMPRIMES EFFERVESCENTS



6 118000 030676

RECTIS® 5 mg

Boîtes de 10 et 30 comprimés pelliculés
Tadalafil

< Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que RECISTIS® dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre RECISTIS®?
- 3- Comment prendre RECISTIS® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver RECISTIS® ?
- 6- Informations supplémentaires

1-QU'EST-CE QUE RECISTIS® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : ou le type d'activité

Code ATC : G04BE08

Tadalafil est présenté comme substance active le tadalafil, un inhibiteur sélectif et réversible de la phosphodiésterase de type 5 (PDE5), spécifique de la guanosine monophosphate cyclique (GMPc).

Indications thérapeutiques :

- Traitement de la dysfonction érectile chez l'homme adulte (une stimulation sexuelle est requise pour qu'efficace)
 - Traitement des signes et symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate chez l'homme adulte.
 - RECISTIS® n'est pas indiqué chez la femme.
- 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE RECISTIS® ?**
- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :**
- Ne prenez jamais RECISTIS®, comprimés pelliculés, en cas de :**
- Patients allergiques au tadalafil ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
 - Patients qui reçoivent des dérivés nitrosous sous toute forme,
 - Patients atteints de maladie cardiaque et pour qui l'activité sexuelle est désconseillée,
 - Patients ayant présenté un infarctus du myocarde au cours des 6 derniers mois,
 - Patients souffrant d'angoisse instable ou présentant des douleurs angineuses pendant les rapports sexuels,
 - Patients ayant présenté une insuffisance cardiaque supérieure ou égale à la classe 2 de la classification NYHA (New York Heart Association) au cours des 6 derniers mois.
 - Patients présentant des troubles du rythme non contrôlés, une hypertension artérielle (< 90/50 mmHg) ou une hypertension artérielle non contrôlée,
 - Patients ayant eu un accident vasculaire cérébral au cours des 6 derniers mois.
 - Patients ayant une perte de la vision d'un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique.
- Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**
- Faites attention avant de prendre RECISTIS® :**
- Avant traitement par RECISTIS®:
 - Avant d'instaurer tout traitement de la dysfonction érectile avec le tadalafil, votre médecin doit prendre en compte votre état cardiovaskulaire et l'activité sexuelle s'accompagnant d'un certain risque cardiaque.
 - Avant d'instaurer tout traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate avec le tadalafil, votre médecin vous examinera afin d'exclure la présence d'un cancer de la prostate.
 - L'efficacité de tadalafil n'est pas connue chez les patients ayant subi :
 - une ablation parralelle totale de la prostate avec section des bandelettes nerveuses de la prostate (prostatectomie radicale sans conservation des bandelettes nerveuses).
 - Attention, l'activité sexuelle comporte un risque potentiel chez les patients ayant une maladie cardiaque, en raison du surcroît d'effort entraîné au niveau du cœur. Si vous avez un problème cardiaque, parlez-en à votre médecin.
 - Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin si vous avez :
 - une dépré造影 (malformation des globules rouges).
 - un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse).
 - une leucémie (cancer des cellules sanguines).
 - une déformation du pénis.
 - une maladie hépatique.
 - insuffisance rénale sévère.
 - En cas de diabète sucré ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement par RECISTIS® et contacter immédiatement votre médecin.
- Enfants et adolescents :**
- L'utilisation de tadalafil dans le traitement de la dysfonction érectile dans la population pédiatrique n'est pas justifiée.
- Interactions avec d'autres médicaments**
- Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
- Ne prenez pas RECISTIS® si vous prenez un traitement à base de dérivés nitrosous.
- L'activité de certains médicaments peut être altérée par RECISTIS®, ou ces médicaments peuvent altérer l'efficacité de RECISTIS®. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes déjà traités par :
 - les alpha-bloquants : les alpha-bloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (ECC), les bêtabloquants, les diurétiques thiazidiques et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II.
 - Un inhibiteur de la 5-alpha réductase (utilisé pour traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate).
 - Des médicaments tels que le cétoconazole comprimés (pour traiter les mycoses) et des inhibiteurs de protéases pour le traitement du SIDA ou du VIH.
 - Du phénobarbital, de la phénytoïne et de la carbamazépine (médicaments anticonvulsivants).
 - De la rifampicine, l'erythromycine, de la clarithromycine ou de l'itraconazole.
- Interactions avec les aliments et les boissons**
- ✓ Chez certains sujets, des sensations de vertiges et une hypotension orthostatique ont été observées lors de la prise de tadalafil avec l'alcool.
- ✓ Le jus de pamplemousse peut altérer l'efficacité de RECISTIS® et doit donc être pris avec précaution.
- Sans objet.
- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**
- RECISTIS® n'est pas indiqué chez la femme.
- Grossesse**
- Les données existantes de l'utilisation du tadalafil chez la femme enceinte sont limitées. Les études chez l'animal ne révèlent pas d'effets nocifs, directs ou indirects, sur le déroulement de la grossesse, le développement de l'embryon/fetus, l'accouplement et le développement postnatal.
- Enfants et adolescents**
- Les données pharmacodynamiques/toxicologiques disponibles chez l'animal ont mis en évidence une excretion de tadalafil dans le lait. Un risque pour les enfants allaités ne peut être exclu.
- Sporfs**
- Sans objet.
- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines**
- tadalafil n'a qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Les patients doivent connaître la manière dont ils réagissent à RECISTIS® avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

Mentions relatives aux excipients à effet notable

RECTIS® contient du lactose : L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3-COMMENT PRENDRE RECISTIS® ?

Instructions pour un bon usage

Tenez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre pharmacien en cas de douleur.

Posologie, Mode et voie d'administration, Fréquence d'administration

Les comprimés de RECISTIS® sont destinés à être utilisés par voie orale le comprimé en entier avec un peu d'eau. Les comprimés doivent être pris.

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Dysfonction érectile chez les hommes adultes :

D'une manière générale, la dose recommandée de RECISTIS® est de 5 mg, mais la dose recommandée de RECISTIS® est de 10 mg de tadalafil ne produit pas un effet suffisant, une dose de 10 mg de tadalafil peut être nécessaire pour obtenir une érection suffisante pour la sexualité.

La fréquence d'administration maximale est de 1 fois par jour.

Chez les patients qui prévoient un usage fréquent de RECISTIS®, la dose recommandée est de 5 mg par jour.

Chez les hommes adultes traités à la fois pour une hypertension bénigne de la prostate chez les hommes et pour une dysfonction érectile chez les hommes, la dose recommandée est également de 5 mg à prendre apprécier.

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les hommes avec une insuffisance rénale sévère traitement à la demande.

La prise quotidienne de tadalafil pour le traitement de la prostate n'a pas été évaluée chez les patients dont le médecin devra procéder à une évaluation individuelle.

prescription.

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients diabétiques.

L'utilisation de tadalafil dans le traitement de la dysfonction érectile dans la population pédiatrique n'est pas justifiée.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de RECISTIS® que vous n'en auriez dû :

Contactez votre pharmacien ou un service d'urgence pour savoir si les effets indésirables similaires à celles décrites dans la rubrique 4 peuvent survenir.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4-QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas nécessairement chez tout le monde.

Les effets suivants peuvent survenir :

Affections du système immunitaire

Pas fréquent : Réactions d'hyper sensibilité

Affections du système nerveux

Fréquent : Céphalées

Affections oculaires

Peu fréquent : Vision trouble, Sensations décrites comme des douleurs oculaires

Affections de l'oreille et du labyrinthe

Peu fréquent : Acouphènes

Affections cardiaques

Peu fréquent : Tachycardie, Palpitations

Affections vasculaires

Fréquent : Bouffées vasomotrices

Peu fréquent : Hypotension, Hypertension

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Fréquent : Congestion nasale

Peu fréquent : Dyspnée, Epistaxis

Affections gastro-intestinales

Fréquent : Dyspepsie, Reflux gastro-cesophagien

Peu fréquent : Douleur abdominale

Affections cutanées et du tissu sous-cutané

Peu fréquent : Rash, Hyperhidrose (transpiration excessive)

Affections musculo-squelettiques et systémiques

Fréquent : Douleurs dorsales, Myalgies, Douleurs des extrémités

Affections du rein et des voies urinaires

Peu fréquent : Hématurie

Affections des organes de reproduction et du sein

Peu fréquent : Hémorragie pénienne, Hémospème

Troubles généraux et anomalies au site d'administration

Peu fréquent : Douleur thoracique

5-COMMENT CONSERVER RECISTIS®?

Tenez-la à portée de la vue et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage. (La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois mentionné)

Conserver dans l'emballage extérieur d'origine à l'abri de l'humidité. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

« Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût, « ni avec les ordures ménagères ».

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement. »

6-INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient RECISTIS®?

Composition quantitative et qualitative en substance active par unité de prise :

Tadalafil (DCE) 5,0 mg

Composition qualitative en excipients :

PHASE INTERNE : Lactose monohydrate, Avicel PH 101, Croscarmellose sodique (vivasol), Lauryl sulfate de sodium, Hydroxypropylcellulose (Avicel PH 101), Eau purifiée.

PHASE EXTERNE: Avicel PH 101, Croscarmellose sodique (vivasol), Stéarate de magnésium.

Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM au Maroc :

Laboratoires AFRIC-PHAR

الصيادلة ماروكو

AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Ain Harroda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S.111)

Km 12,400 Ain Harroda

28 630 Mohammédia.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée

Juillet 2017

Code de prescription et de délivrance.

Tableau A

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet

LOT 231.17

EXP 06/25

PPV:210DH00

RECTIS® 5mg
10 comprimés pelliculés

6 118000 072546



أخصائي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية

Chirurgien Urologue - Andrologue

- Calculs appareil urinaire
 - Cancers Urologiques
 - Endoscopie diagnostique et interventionnelle
 - Echographie-Laser-Dysfonction érectile
 - Infertilité masculine - Incontinence urinaire
 - Chirurgie des hernies
- حصى الكلى والمسالك البولية
 - سرطان المسالك البولية والتناسلية
 - الفحص والجراحة بالمنظار
 - الفحص بالصدري - تفتيت الحصى - الضعف الجنسي
 - العقم عند الرجال - انفلات البول
 - جراحة الفتق

NLPC,mini NLPC

إزالة حصى الكلى بدون جراحة

Tél: 05 22 870 888

URGENCE : 0663 11 29 23

Ordonnance

Casablanca, le: الدار البيضاء في :

le 12/02/2024

٢١٢

Mr ze kraoui Ab dersalma

Rx du rachis

lombo - sacé

/ F
/ F

Dr. ELARKAM Fatna
Médecin Radiologue
RDC 62 Bd Djissat Harti
Cité Djmaâ - Casablanca
Tél : 05 22 57 65 65

Dr.Mohamed EL BAGHOULI
Chirurgien Urologue
أخصائي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية
404, Bd el Qods Rés Assafaï, Etg 2
App 11 Aïn Chock, Casablanca
Tél: 05 22 870 888



أخصائي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية

Chirurgien Urologue - Andrologue

- Calculs appareil urinaire
- Cancers Urologiques
- Endoscopie diagnostique et interventionnelle
- Echographie-Laser-Dysfonction érectile
- Infertilité masculine - Incontinence urinaire
- Chirurgie des hernies

- حصى الكلى والمسالك البولية
- سرطان المسالك البولية والتناسلية
- الفحص والجراحة بالمنظار
- الفحص بالصدى - تفتيت الحصى - الضعف الجنسي
- العقم عند الرجال - انفلات البول
- جراحة الفتقة

URGENCE : 0663 11 29 23

Bilan

Tél: 05 22 870 888

Casablanca, le: 12/01/2024 الدار البيضاء في:

Mr Zekraoui Abderrahman

- | | |
|---|--|
| • ECBU <input type="checkbox"/> | • TESTOSTÉRONE TOTAL <input checked="" type="checkbox"/> |
| • PSA <input checked="" type="checkbox"/> | • TESTOSTÉRONE BIODISPONIBLE <input type="checkbox"/> |
| • NFS + PQ <input type="checkbox"/> | • FSH, LH <input type="checkbox"/> |
| • CRP <input type="checkbox"/> | • BHCG, AFP, LDH <input type="checkbox"/> |
| • URÉE , CRÉAT <input type="checkbox"/> | • INHIBINE B <input type="checkbox"/> |
| • BILAN D'HEMOSTASE <input type="checkbox"/> | • PROLACTINÉMIE <input type="checkbox"/> |
| • GLYCEMIE A JEUN <input type="checkbox"/> | • SPERMOGRAMME <input type="checkbox"/> |
| • HBA1C <input type="checkbox"/> | • SPERMOCULTURE <input type="checkbox"/> |
| • IONOGRAMME SANGUIN <input type="checkbox"/> | • PRÉLÈVEMENT URÉTRAL <input type="checkbox"/> |
| • CALCÉMIE, PHOSPHOREMIE <input type="checkbox"/> | • TSH , T3 , T4 <input type="checkbox"/> |
| • BILAN LIPIDIQUE <input type="checkbox"/> | |

Dr. Mohamed EL BAGHOULI
Chirurgien Urologue
أخصائي في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية
Al Qods Rés Assafâ, Etg 2
Ain Chock, Casablanca
Tél: 05 22 870 888



INPE: 093061497

FACTURE N° 1165/24

CASABLANCA le
Nom et prénom
Référence
Médecin prescripteur

13/02/2024
MR ZEKRAOUI ABDERRAHMAN
19J498
Docteur MAHAMED EL BAGHOULI

Code	Acte de biologie demandé	Cotation (B)
	PSA.ANTIGENE SPECIFIQUE PROSTATIQUE	300
	TESTOSTERONE TOTALE	300
Total du (B)		B 600
Prise de sang (PC)		0,00 DH
Montant en DH		800,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de: **HUIT CENT DIRHAMS**

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES SALIMA
N° 28-30 AV. MAHI ZOHIR
TEL : 0524 030 30 / ICE: 003034168000075



Prélèvement du : 13/02/2024 à 09:23

Résultats édités le: 13/02/2024



Prescripteur: Docteur MAHAMED EL BAGHOULI

MR ZEKRAOUI ABDERRAHMAN

Dossier N° 19J498

DN: 01/01/1957 (67 ans)

Page: 1/1

HORMONES SANG
(Roche-cobas e411)

TESTOSTERONE TOTALE.....: 4,23 ng/ml

(Electrochemiluminescence sur cobas E 411)

Interprétation :

Homme : 2,8 à 8,0 ng/ml

Femme : 0,06 à 0,82 ng/ml

Enfant garçon :

Moins de 10 ans : inf à 0,2 ng/ml

11 - 13 ans : inf à 1,2 ng/ml

13 - 15 ans : 0,2 à 3,0 ng/ml

Enfant fille :

Moins de 5 ans : inf à 0,1 ng/ml

6 - 13 ans : inf à 0,3 ng/ml

13 - 15 ans : 0,1 à 0,8 ng/ml

MARQUEURS PROTEIQUES

ANTIGENE SPECIFIQUE PROSTATIQUE.PSA: 0,85 ng/ml

(Electrochimiluminescence sur cobas E 411)

Interprétations:

< 40 ans : < 1,4 ng/ml

40 à 49 ans : < 2,0 ng/ml

50 à 59 ans : < 3,1 ng/ml

60 à 69 ans : < 4,1 ng/ml

>=70 ans : < 4,4 ng/ml

Le toucher rectal , le message prostatique , une cytoscopie , une échographie transrectale, une biopsie, augmentent transitoirement le taux de PSA

Demande validée biologiquement par: Dr. MAHI Zohir



مركز الفحص بالأشعة سباتة
CENTRE RADIOLOGIE SBATA

Facture N° : 1029/24

Nom complet : Mr ZEKRAOUI ABDERRAHMAN

Le : 12-02-2024



Examens	Montant
---------	---------

- RX DU RACHIS LOMBO-SACREE F+P 300.00 DH

Dr. EL ARKAM El Jemaa
Méd. Clin Radiologue
RDC 762 Bd. Driss El Harti
Cité Djamaa Casablanca
Tel : 05 22 57 65 65

En lettres : Trois cents dirhams



مركز الفحص بالأشعة سباتة

CENTRE RADIOLOGIE SBATA

الدكتورة إل آركام فاطنة

Médecin Radiologue

اختصاصية في الفحص بالأشعة

- Scanner Spirale Corps Entier
- Dentascanner - Panoramique Dentaire
- Echographie Générale

- Echographie - Doppler
- Echographie Ostéo Articulaire
- Radiologie Numérisée

- Mammographie Numérisée
- Radiographie Rachis Entier
- Radio - Photo

DATE LE : 12/02/2024

NOM & PRENOM : MR.ZEKRAOUI ABDERRAHMAN
MEDECIN TRAITANT : DR.MOHAMED EL BAGHOULI

RADIOGRAPHIE DU RACHIS LOMBO SACRE DE FACE ET DE PROFIL

RESULTATS

- Déminéralisation osseuse avancée.
- Tassement vertébral étagé modéré ostéoporotique.
- Remaniements arthrosiques somatiques étagés.
- Pincement discal en L4-L5.
- Pas d'arthrose interapophysaire postérieure évidente.
- Pas de calcification des parties molles d'allure pathologique.
- Pas de recul du mur postérieur.
- Respect des interlignes articulaires sacro-iliaques.

CONCLUSION

- Déminéralisation osseuse avancée.
- Tassement vertébral étagé modéré ostéoporotique.
- Lombarthrose modérée.
- Discarthrose en L4-L5.

Cordialement

Dr. EL ARKAM Fatna
Médecin Radiologue
RDC 762, Bd. Driss El Harti
Cité Djmaâ - Casablanca
Tél : 05 22 57 65 65