

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

19796A

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 14589

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre:

Nom & Prénom : DRIFI Abdelaatif

Date de naissance : 21.11.1959

Adresse : LOTI FRASQUA S/N N°34 Rue El Doudou BERRCHID

Tél. : 0667.01.20.96

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. DAIF BASSAMI
Chirurgie Générale
INPE: 121258289

Date de consultation : 2, 2, 24

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : cholecystecto... colite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Benchedd

Le : 21.11.16

Signature de l'adhérent(e) : 

Dr. DAIF BASSAMI
Chirurgie Générale
121258289

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/12/24	CS Ce			Dr DAIF BASSI Chirurgie Générale INPE: 121258289
16/12/24	C Ce			Dr DAIF BASSI Chirurgie Générale INPE: 121258289

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie ELIRAKI D. YOUSSEF LIPAKI D. DAKHLA BERRECHID TEK 10322.32.83.45	02/12/24	749.90
Pharmacie ELIRAKI D. YOUSSEF LIPAKI D. DAKHLA BERRECHID TEK 10322.32.83.45	16/12/24	284.20

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	<input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS			
	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION			



مصحة الشاوية
CLINIQUE CHAOUIA

LOT N°: 23204A
EXP: 01 2025
P.P.V: 98,50 DH



060003332

LOT N°: 23201A
EXP: 11 2024
P.P.V: 98,50 DH

ORDONNANCE

Mesraoui Archa

153,10

1/ Maxiclav 1g
1 socket x 3/4

82,10

2/ Ezin 20 - 1/4g x 7/4

98,50x5

3/ Hibac 3(0)

1/4g x 7/4

22,20

4/ Codolipine 9

1/4 x 3/4

749,90

Berrechid, le 2/8/24

LOT N°: 23201A
EXP: 11 2024
P.P.V: 98,50 DH

LOT N°: 23204A
EXP: 01 2025
P.P.V: 98,50 DH

E.I.RAKI
E.I.RAKI
BERRECHID
2,83,45
Pharm Dr. Youcef
267 Rue DAK
TEL: 021258289

Dr. DAIF BASSAM
Chirurgie Générale
IMPE: 121258289

Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

comprimé sécable

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

INTERVIEW

COMPOSITION

Paracétamol 400,00 mg
 Phosphate de codeïne hémihydraté 20,00 mg
 (Quantité correspondant à codeïne base) 15,62 mg
 Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N Système nerveux central)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

EVITEZ QUELQUES CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne
 - maladie grave du foie,
 - chez l'asthmatique,
 - en cas d'insuffisance respiratoire,
 - allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre
médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine.
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament dans le cas de dépendance.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AIDE D'UN VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES.
Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine et les psychotropes.
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT.
VOTRE PHARMACIEN.


Ce médicament contient du paracétamol et de
Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les



PPV: 22DH20

PER: 10/25

LOT: M3455



Dr. Daif Bassam

Chirurgie Générale
Diplômé de la faculté de médecine
et de pharmacie de Casablanca



د. ضعيف بسام

الجراحة العامة

جراح كلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء

- Chirurgie digestive, pariétale et endocrinienne
- Coelio chirurgie
- Urgences chirurgicales

جراحة الجهاز المضمي

و الغدد

الجراحة بالمنظار

المستعجلات الجراحية

ORDONNANCE

le 16/11/24

Mesraoui Aicha

134,00

1/ Cibalax salet SV

76,70

1 sachet 1/2



2/ Eg - um 20 - g 73,10

19/3



3/ Ferlax salet SV
1 sachet x 2/2

TOTAL: 284,20



Dr. DAIF BASSAM
Chirurgie Générale
INPE: 121258289

📍 344 Centre d'affaire Berrechid, Lot Nasrolah 2^{ème} Etg N° 12, Berrechid
مركز أعمال برشيد تجزئة نصرالله، الطابق الثاني رقم 12، برشيد 344

✉ dr.daif.bassam@gmail.com

📞 05 22 53 44 41 / 07 02 08 80 10

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet

Macrogol 4000

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
3. Comment prendre FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : LAXATIF OSMOTIQUE - code ATC : A06AD15 (A : appareil digestif et métabolisme).

FORLAX contient la substance active macrogol 4000 et appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques. Il permet d'augmenter la quantité d'eau dans les matières fécales, ce qui aide à résoudre les problèmes liés à un transit intestinal ralenti. FORLAX n'est pas absorbé dans la circulation sanguine et n'est pas modifié dans l'organisme.

FORLAX est indiqué pour le traitement de la constipation chez l'adulte et l'enfant de plus de 8 ans.

Ce médicament se présente sous forme d'une poudre qu'il faut dissoudre dans un verre d'eau (au minimum 50 ml) et boire. Son effet se manifeste généralement en 24h à 48h.

Le traitement de la constipation par un médicament doit être associé à des règles d'hygiène de vie et à une alimentation saine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

Ne prenez jamais FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet :



Enfant de plus de 8 ans/Adulte

Si vous présentez un de ces symptômes, arrêtez de prendre FORLAX et contactez immédiatement votre médecin.

Dans la mesure où ce médicament peut quelquefois engendrer une diarrhée, contactez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si :

- Vous avez une fonction rénale ou hépatique altérée,
- Vous prenez des diurétiques (médicaments augmentant l'élimination urinaire) ou vous êtes âgé, car vous êtes susceptible d'avoir une diminution de vos taux sanguins de sodium (se) et de potassium.

En cas de trouble de la déglutition, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FORLAX.

Evitez de mélanger FORLAX avec des épaississants à base d'amidon si vous avez des difficultés à avaler. Cela peut entraîner la formation d'une solution liquide qui pourrait pénétrer dans vos poumons et provoquer un pneumopathie d'inhalation, si vous ne parvenez pas à avaler correctement.

Autres médicaments et FORLAX

Il est possible que l'absorption d'autres médicaments puisse être transitoirement réduite lors de l'utilisation de FORLAX, en particulier des médicaments ayant un index thérapeutique étroit ou une demi-vie courte comme la digoxine, les antiépileptiques, les coumarines et les immunosuppresseurs, entraînant une diminution de l'efficacité.

Si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez recours à des épaississants pour faciliter l'ingestion des liquides, FORLAX peut contrer l'effet de l'épaississant et l'empêcher d'agir.

Grossesse et allaitement

FORLAX peut être

Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, parlez-en à votre pharmacien avant de prendre FORLAX.

Conduite de véh

Aucune étude sur les effets de FORLAX sur les véhicules et à utili

maphar
Boulevard Aïcha El Béchir
Quarter Industriel Sidi Bernoussi Casablanca - Maroc
FORLAX 10g SAC B20
P.P.V. : 73,50 DH



6118001181193

FORLAX contient du sorbitol et du dioxyde de soufre
Ce médicament contient du dioxyde de soufre et peut provoquer des

allergies et une gêne respiratoire.

7 mg de sorbitol par

LOT : W13868
Exp : 05/2025

CIBALAX®

FOS - *Bifidobacterium lactis*

Cibalax® est un complément alimentaire riche en fibres alimentaires et contient également une haute concentration de bifidobactéries qui favorisent naturellement des selles régulières et un bon transit intestinal

Qu'est-ce que CIBALAX®?

- Chaque stick de Cibalax® contient 1 milliard de *Bifidobacterium lactis* lyophilisées. Les Bifidobactéries dans Cibalax® sont protégées grâce à l'Intellicaps, une nouvelle technologie de microencapsulation qui leur garantit une meilleure survie. Ce nouveau procédé breveté mondialement améliore la qualité du produit.
- FOS qui est une fibre soluble.

Dans quels cas CIBALAX® est-il

- Cibalax® favorise naturellement le fonctionnement intestinal et le régulier des selles.
- Cibalax® est efficace dès les premières utilisations.
- Cibalax® n'entraîne pas de pris.
- Cibalax® peut être utilisé de manière prolongée.

Comment prendre CIBALAX®?

- Cibalax® peut être utilisé par les enfants à partir de l'âge de 5 ans et les adultes.
- La dose recommandée est de 1 stick par jour le matin ou le midi. Cette dose peut être augmentée si nécessaire à maximum 2 sticks par jour à prendre en 2 prises séparées.

Dissoudre le stick dans un verre d'eau ou de

PPC : 134 DH 00



5 420044 310395

■ Favorisez les aliments riches en fibres.

■ Maintenez une activité physique régulière.

Quelles sont les informations à connaître ?

Ezium®

Esoméprazole

20 mg et 40 mg gélules gastro-résistantes. Boîte de 7, 14 et 28.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Composition du médicament :

Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise.

Principe actif :

Esoméprazole magnésium biphosphate	20 mg
Esoméprazole magnésium biphosphate	40 mg
Autres composants : sucrose, amidon de maïs, hypromellose 3cp, diméthicone émulsion 35%, polyphosphate 80, mannitol, dioxycholate monoglycéridé, talc, méthacrylique acide-éthylacrylate copolymer dispersion 30%, triéthyle de citrate, stearoyl macroglycéridé, eau purifiée.	

Excipients à effet notable : Mannitol, Saccharose

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

EZIUM® contient une substance appelée esoméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

Indications thérapeutiques :

EZIUM®, gélules gastro-résistantes est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

Adultes

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). EZIUM® peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement:

Toujours prendre ce médicament en suivant les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

EZIUM® n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à instaurer une surveillance.

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre vos gélules à n'importe quel moment de la journée.

Vous pouvez prendre vos gélules pendant ou en dehors des repas.

Avalez vos gélules entières avec un verre d'eau. Les gélules comme leur contenu ne doivent pas être mordus ni croqués. En effet, les gélules contiennent des granules dont l'embrobage protège le médicament de l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les gélules

Si vous avez des difficultés pour avaler les gélules :

- Ouvrir soigneusement les gélules au dessus d'un verre d'eau (non gazeuse) et vider le contenu des gélules (granules) dans le verre. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

2) Remuez. Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire,

- Afin de prendre la totalité du médicament, rincez ensuite le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et le boire. Tous les granules doivent être avalés sans être mordus ni croqués.

Pour les patients ne pouvant pas avaler: le contenu des gélules peut être mélangé dans de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors être administré par sonde gastrique.

Posologie

Votre médecin vous dira le nombre de gélules à prendre et la durée du traitement. Ceci dépendra de votre état de santé et du fonctionnement de votre foie.

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides)

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'EZIUM® une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg une fois par jour.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg une fois par jour. Une fois le contrôle des symptômes obtenu, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule d'EZIUM® 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins.

Si vous avez des problèmes hépatiques sévères, votre médecin peut vous donner une dose plus faible.

En cas d'infection par la bactérie appelée *Helicobacter pylori*, traitement de l'ulcère duodénal et prévention de la récidive de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg deux fois par jour pendant 7 jours. Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques par exemple de l'omoxycilline et de la cloxacilline.

Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIUM® 20 mg deux fois par jour pendant 7 jours.

EZIUM® 20 mg
Esomeprazole
14 gélules



6 118 000 104 1825

PPV: 76DH70

PER: 02725

LOT: M4120-2



Contre-indications

Ne prenez jamais EZIUM®

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

• si vous prenez un médicament

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

médecin ou votre pharmacien

• si vous êtes allergique à

l'omeprazole, l'esomeprazole.

Si vous avez des douleurs, si vous

m