

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 1600 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : L.D.G.Hiri Abdellah

Date de naissance : 21/3/1948

Adresse : LOT CHANTIMAR, IMPASSE Rue 1, N° 24
CASABLANCA

Tél. : 06.61.31.00.04 Total des frais engagés : 10894,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 6/3/2024

Nom et prénom du malade : L.D.G.Hiri Abdellah Age : 1948

Lien de parenté :

Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : RABAT Le : 6/3/2024

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie du Mail Cet Dr. KHALID IDER loc. 17, Lot. 4, Secteur 9, Hau. Riad. Rabat - Tél. 05 37 71 67 82 INPE : 02041019 ICE : 001292180000003	06/03/24	10 594,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553		Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Rabat, le : 6-3-24

Mr. Lahcen Al Amin

137,90

71 Flowl 10

x 1 m3
Pharmacie du Mail Central
Dr. KHALID IDER
N°17, Lot 4, Sector 9, Hay Riad
Rabat, Tél.: 05 37 71 67 82
INPE: 102041019
ICE: 001292180000003

10411.00

21 Ahm trow 200 mg

x 1 m3

45,80

4 (f1)

31 Cathey 1000

Pr. KONTANI Abdellatif
Chirurgien Urologue
Polyclinique Riad Annakhl
Hay Riad - Rabat
INPE: 101111821

T=10594,70 nettoy 1/2



ملتقى شارع النخيل والطريق الدائري 5، حي الرياض - الرباط

Angle Avenue Nakhil et Rocade S, Hay Riad - Rabat

Tél: +212 537 542 000 - Fax: +212 5 37 56 46 47 - Email: contact@pira.ma

Site web: www.pira.ma

Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé sécable

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : H02AB07

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTÉMIQUE. (H. Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien). Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans et de plus de 20 kg. Ce médicament est utilisé dans de nombreuses maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

À fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet de greffes d'organes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE

CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique à la prednisone ou à l'un des autres composants contenus dans CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, mentionnés à la rubrique 6.
- Si vous avez une infection.
- Si vous souffrez actuellement d'une maladie virale (hépatite virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
- Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n'êtes pas traité pour ceux-ci.
- Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune...).
- Chez l'enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers le comprimé et s'étouffer.

Avertissements et précautions

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

Avant le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez été vacciné récemment.
- Si vous avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin.
- Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée.
- Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose).
- Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement.
- Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).
- Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.
- Si vous avez une maladie des glandes surrénales appelée Syndrome de Cushing.
- Si vous avez des problèmes rénaux ou un taux élevé d'acide urique dans votre sang avant de commencer le traitement par CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable. Vous devez informer votre médecin si vous présentez des symptômes du syndrome de l'yeux telle que crampes musculaires, faiblesse musculaire, confusion, perte de vision ou troubles visuels, essoufflement, convulsions, rythme cardiaque irrégulier ou insuffisance rénale (diminution de la quantité d'urine ou assombrissement de l'urine) au cas où vous souffriez d'une tumeur maligne hématologique (voir rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable si vous souffrez de :

• Sclérodermie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave, appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine.

Pendant et après le traitement :

• Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des

tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière

temporaire d'une rupture des tendons.

Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons.

• Ce médicament peut favoriser l'apparition d'une

FLOTRAL® 10 mg

(Alfuzosine), Comprimés à libération prolongée

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

PPV: 137 DH 90

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ?
3. COMMENT PRENDRE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

FLOTRAL® contient de l'alfuzosine qui appartient à la classe des alpha-bloquants. Ces médicaments agissent sur le système génito-urinaire et hormones sexuelles.

FLOTRAL® est indiqué dans le :

- Traitement des symptômes fonctionnels de l'hypertrophie bénigne de la prostate.
 - Traitement adjuvant au sondage vésical dans la rétention aiguë d'urine liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate.
- ## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ?

Ne prenez jamais FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'alfuzosine et/ou à l'un des autres composants.
- Hypotension orthostatique.
- Insuffisance hépatique.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).
- Si vous prenez certains médicaments utilisés dans le traitement du VIH (par exemple : inhibiteur de protéases associé au ritonavir ou au cobicistat), ou utilisés dans le traitement de l'hépatite C (par exemple : le télaprévir ou le bocéprevir), ou utilisés dans le traitement de certaines infections fongiques (par exemple : kétocoazole, itraconazole, posaconazole), ou utilisés dans certaines infections bactériennes (par exemple : clarithromycine, érythromycine, tétilthromycine) voir rubrique « Prise ou utilisation d'autres médicaments ».

Faites attention avec FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée :

Mises en garde et précautions d'emploi

Avant de commencer le traitement : prévenez votre médecin si vous avez une maladie du cœur (en particulier si vous souffrez d'angine de poitrine, d'insuffisance cardiaque aiguë, de troubles du rythme cardiaque) ou si vous avez déjà eu une baisse importante de la pression artérielle avec un autre médicament de la même famille que FLOTRAL® (alpha-bloquants).

Pendant le traitement

Une hypotension orthostatique peut apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament, éventuellement accompagnée de symptômes (sensations vertigineuses, fatigue, sueurs).

Dans ce cas, le patient devra être maintenu en position allongée jusqu'à ce que les symptômes aient complètement disparu.

Ces phénomènes sont habituellement transitoires,

Traitement adjuvant au sondage vésical dans la rétention aiguë d'urine liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate.

Le traitement est administré

lors de la mise sous cathéter.

FLOTRAL® 10 mg

30 comprimés à libération Prolongée

Voie orale



6 1118001 300150

Mode d'administration

Voie orale.

Le comprimé doit être avalé

immédiatement après le repas.

Les comprimés ne doivent pas

ou broyés en poudre. Ces actions peuvent conduire à une libération et à une absorption inappropriée du médicament et, en conséquence, à des effets indésirables pouvant être précoce.

Durée de traitement

SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DU MEDECIN.

Si vous avez pris plus de FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de surdosage, le malade sera hospitalisé et maintenu en position allongée. Un traitement classique de l'hypotension sera institué.

Du fait de sa fixation protéique élevée, l'alfuzosine est difficilement dialysable.

Si vous oubliez de prendre FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Fréquemment :

- Étourdissements, sensations vertigineuses, malaise, maux de tête;
- Troubles digestifs à type de nausées, douleurs dans le ventre;
- Sensation de fatigue.

Peu fréquemment :

- Vertiges, somnolence, syncope (perte de connaissance brutale);
- Chute de la pression artérielle lors du passage de la position couchée à la position debout;
- Accélération des battements du cœur, palpitations;
- Diarrhée;
- Bouche sèche;
- Nez bouché ou nez qui coule (rhinite);
- Eruptions de boutons sur la peau ou démangeaisons;
- Edèmes, douleurs dans la poitrine;
- Rougeurs du visage.

Très rarement :

- Angine de poitrine chez les patients ayant des antécédents de troubles coronariens (voir rubrique « Faites attention avec »);
- Urticaire, brusque gonflement d'un organe, du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (angio-oedème).

Fréquence non connue :

- Maladies du foie (hépatites), notamment dues à l'obstruction des voies biliaires;
- Erection douloureuse et prolongée;

Quelques flacons lors d'une préparation de la cortaracte (voir

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ABIRATERONE GT® 250 mg, comprimé en boîte de 120

Acétate d'abiratéron

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ABIRATERONE GT® contient du lactose et du sodium

- ABIRATERONE GT® contient du lactose (un type de sucre). Si vous avez été informé par votre médecin que vous avez une intolérance à certains sucre, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

- Ce médicament contient de sodium. Ceci est à prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Abiratéron GT® 250mg

120 comprimés



6 118000 420422 >

exp :

Lot N°:

PPV :

09/2026

94244

10411DH00

- Vous devez prendre la prednisone ou la prednisolone tous les jours pendant votre traitement par ABIRATERONE GT®.

- La dose de prednisone ou de prednisolone que vous prenez peut devoir être modifiée en cas de survenue d'une urgence médicale. Votre médecin vous préviendra si vous devez changer la dose de prednisone ou de prednisolone que vous prenez. N'arrêtez pas de prendre la prednisone ou la prednisolone à moins que votre médecin ne vous le demande. Votre médecin peut également vous prescrire d'autres médicaments pendant votre traitement par ABIRATERONE GT® et la prednisone ou la prednisolone.

Si vous avez pris plus de ABIRATERONE GT® que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus que vous n'auriez dû, prévenez immédiatement votre médecin ou allez immédiatement à l'hôpital.

Si vous oubliez de prendre ABIRATERONE GT® :

- Si vous oubliez de prendre ABIRATERONE GT® ou la prednisone ou la prednisolone, prenez votre dose habituelle le jour suivant.

- Si vous oubliez de prendre ABIRATERONE GT® ou la prednisone ou la prednisolone durant plus d'un jour, contactez votre médecin sans délai.

Si vous arrêtez de prendre ABIRATERONE GT® :

N'arrêtez pas de prendre ABIRATERONE GT® ou la prednisone ou la prednisolone, à moins que votre médecin ne vous l'ait dit.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez de prendre ABIRATERONE GT® et consultez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des effets suivants :

- Faiblesse musculaire, contractions musculaires ou forts battements du cœur (palpitations). Ces derniers peuvent être le signe d'un faible taux de potassium dans votre sang.

Les autres effets indésirables incluent :

Très fréquents (peuvent affecter plus d'1 personne sur 10) : Rétention d'eau dans vos jambes ou vos pieds, faible taux sanguin de potassium, pression artérielle élevée, infection des voies urinaires, diarrhée.

Fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : Taux élevés de graisses dans votre sang, augmentation des résultats des tests de la fonction hépatique, douleur thoracique, troubles du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, rythme cardiaque rapide, infections sévères

Informez votre médecin si on vous a dit que vous aviez une maladie cardiaque ou vasculaire, y compris des troubles du rythme cardiaque (arythmie), ou si vous recevez des



PHARMACIE DU MAIL CENTRAL

ILOT 17 LOT 4 SECT 9 HAY RIAD RABAT

ICE :001292180000003
INPE:102041019

R.C : 71554 Patente:25564198
T.V.A :IF 93011797 C.N.S.S:2923028
Banque:BPRIAD181810212113124507000141
Tél :+212537716782

Le 06/03/2024

FACTURE N°560749

N° ICE :

N° IF : 93011797

LOUDGHIRI ABDELLAH

ICE N° :

Qté	Désignation	PPV Unitaire	Total BRUT	Dont TVA	% Taux
1	ABIRATERONE GT 250MG/120CP	10 411,00	10 411,00		
1	CORTANCYL CO 20MG	45,80	45,80		
1	FLOTRAL CO 10MG 30U LP	137,90	137,90	9,02	7,00

TOTAL T.T.C :

10 594,70

Nbr Articles **TVA 7% Base :** **137,90** **Montant :** **9,02** **TVA 20% Base :** **Montant**

Arrête la présente facture à la somme de :

Dix Mille Cinq Cent Quatre-vingt-quatorze Dirhams et 70 centimes.

NOM DU PATIENT : M. LOUDGHIRI ABDELLAH
DATE DE NAISSANCE : 21/03/1948

Reçu N°: 259323

Paiement du 06/03/2024 09h34

Type	consultation
Montant	300,00 Dh
Type de paiement	Espèce

polyclinique internationale
RIAD ANNAKHL
Secteur 11, Bdg W, N° 4, 4^{me} étage, Annakhil
Tél : +212 537 542 000, E-mail : contact@bira.ma (17)

Visa Caisse