

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

199803

M23- N° 0031052

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 07700 Société : RAM
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : S 4003 Abdellahalek
 Date de naissance : 16-08-1954
 Adresse : 26 Koréa Rue 22 N° 43
 20520 Casablanca
 Tél. : 06.6838.0583 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Docteur Said RIZK
 Diplômé d'Université en Diabéologie
 Omnipraticien-Echographie-Electrocardiogramme
 Médecin Expert Assermenté au près des tribunaux
 Tél.: 05 22 28 11 96 / GSM: 06 61 16 45 47

Date de consultation : 09/03/2021
 Nom et prénom du malade : S 4003 Abdellahalek Age: 1954

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète au type 2

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : Diabète au type 2

En cas d'accident, préciser les causes et circonstances : Casablanca

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 13/03/2024

Signature de l'adhérent(e) : Said

2024

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRÉS

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/03/2014	Glucose	1	17000	Docteur Said RIZK Diplômé d'Université en Diabétologie Omnipraticien-Echographie-Electrocardiogramme Médecin Expert Assessement au près des Tribunaux Tél: 05 22 28 11 96 /Gsm: 06 61 16 45 47
10/03/2014	échographie	1	17000	
11/03/2014				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	09/31/2024	491.10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Saïd RIZK

الدكتور سعيد

الطب العام

خبير محلف لدى المحاكم

الفحص العام بالصدع، أمراض السكري، ببير بكتيري المدم

تخطيط القلب

طیب داخلی سابق بمسنونیات

٦٦

سدي معروف الزنقة ٨٢ الرقم ٦

الدارuspustaka

05.22.28.11.96 : الهاتف

المحمول : 06.61.16.45.47

Sidi Maarouf 1 - Rue 82 - N° 6

Casablanca

Tél. C : 05.22.28.11.96

Page 1 of 1

Geochimica

Casablanca :.....

4000 - ~~Efficiency~~ g/m^2

1955. - Meldej 400-72

1450 - Anstolig N, -

4500 - Respiratory $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

11850 ~~11850~~ = 628

7760

49110


Timor

✓ {

(287)

$$\begin{array}{r} 3880 \times 2 \\ \hline 7760 \end{array}$$

LOT: M0067
EXP: JUL 2024
PPV: 195,50 DH



Imovane® 7,5 mg

Zopiclone

Comprimé pelliculé sécable

sanofi

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament a été prescrit spécialement pour vous. Il pourra être nocif, même si les signes de votre maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF01 (N : système nerveux central).

Ce médicament appartient à une famille de médicaments apparentés aux benzodiazépines.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de courte durée des insomnies chez l'adulte.

Il agit : • En augmentant la durée et en améliorant la qualité du sommeil,

• En diminuant le nombre de fois où l'on se réveille la nuit et le nombre de fois où l'on se réveille trop tôt.

Ne prenez pas ce médicament sur une période prolongée. Le traitement doit être aussi court que possible car le risque de dépendance augmente avec la durée du traitement. Chez l'enfant, étant donné l'absence de données, l'utilisation d'IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable n'est pas recommandée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable : • Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous êtes allergique au blé (car ce médicament contient de l'amidon de blé). • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des muscles). EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable.

L'utilisation d'IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable n'est pas recommandée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans : la tolérance et l'efficacité d'IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable n'ayant pas été démontrées dans cette population.

Avant de prendre IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, prévenez votre médecin : • Si vous avez une insuffisance respiratoire.

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique). • Si vous avez eu des problèmes de dépendance à l'alcool.

Avant de prendre IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, vous devez savoir que : • Une insomnie peut révéler un autre trouble physique ou psychique. Une évaluation médicale doit être effectuée avant la prescription de ce médicament. • Ce médicament ne traite pas la dépression. Si vous souffrez également de dépression, votre médecin vous prescrira un traitement approprié. Si la dépression n'est pas traitée, elle peut s'aggraver avec une persistance ou une augmentation possible du risque suicidaire.

• Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou s'il peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical. • Si votre insomnie persiste ou s'aggrave après une période courte de traitement, consultez votre médecin. • Dans les heures qui suivent la prise du médicament, il peut survenir :

• Une perte de la mémoire concernant les événements survenus pendant le traitement (amnésie antérograde). - Des troubles du comportement (tel que agressivité ou actes automatiques). - Une altération de l'état de conscience. - Une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si :

• Vous prenez ce médicament moins de 12 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance. • Vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée.

• Vous prenez de la zopicline alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif

ou qui augmente la quantité de alcôolisées ou des médicaments. Ces troubles peuvent être dangereux et devraient arrêter le traitement.

• Il peut également survenir :

• Un somnambulisme (par exemple,

• Une conduite automobile sans perte de la mémoire concernant l'abus d'IMOVANE 7,5 mg, comp. associée d'alcool ou d'autres médiator. semblent augmenter le risque d'accident. Dans de tels cas, l'arrêt du traitement.

Risque de dépendance : La prise

du développement d'abus et/ou une dépendance physique et

psychologique. Le risque de dépendance augmente avec la dose et

la durée du traitement et ce risque est plus fort lorsque la

zopicline est prise pendant plus de 4 semaines. Le risque d'abus

et de dépendance est plus grand chez les patients ayant des

antécédents de troubles mentaux et/ou d'alcoolisme, de

toxicomanie ou d'abus médicamenteux.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez déjà

souffert de troubles mentaux ou si vous avez abusé ou avez été

dépendant de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

La dépendance peut se manifester par un phénomène de sevrage

avec des symptômes tels que : insomnie, maux de tête, anxiété,

douleurs musculaires, irritabilité, confusion, hallucinations,

convulsions.

Ce phénomène peut survenir pendant le traitement entre 2 prises

ou dans les jours qui suivent l'arrêt du traitement.

Divers facteurs semblent favoriser la dépendance : • si vous

prenez IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable de façon

prolongée. • si vous prenez une dose importante. • si vous avez

déjà présenté une dépendance à d'autres médicaments, substances ou à l'alcool, • si

vous êtes anxieux. • si vous prenez un autre médicament de la famille des

benzodiazépines tel qu'un anxiolytique ou un autre somnifère. • si vous prenez un

médicament de la famille des analgésiques morphiniques (médicament utilisé pour

éliminer la douleur).

Lisez attentivement la rubrique 3. Comment prendre IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable ? Pour plus d'informations, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Risque de rebond : Une réapparition temporaire de l'insomnie peut survenir à l'arrêt du traitement.

Afin de diminuer le risque de survenue d'un phénomène de sevrage ou de rebond de l'insomnie, la dose sera diminuée progressivement et les prises seront espacées. Les modalités d'arrêt du traitement doivent être précisées par votre médecin.

Risques de l'utilisation concomitante avec des opioïdes

L'utilisation concomitante d'IMOVANE avec des opioïdes peut entraîner une sédatrice, une dépression respiratoire, un coma et un décès. Si vous prenez en même temps IMOVANE et des opioïdes, votre médecin portera une attention particulière aux signes de la dépression respiratoire et de la sédatrice.

Utilisation chez les personnes âgées de plus de 65 ans

IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable doit être utilisé avec prudence en raison de la fréquence plus importante des troubles du comportement chez les personnes âgées, du risque de somnolence et de relâchement musculaire qui peuvent favoriser les chutes.

Les chutes ont souvent des conséquences graves chez les personnes âgées. EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé en association avec des opioïdes, cela peut augmenter le risque de sédatrice, de dépression respiratoire, de coma et de décès. La dose et la durée du traitement concomitant seront limitées.

IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments et boissons

La consommation d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

Grossesse et allaitement : Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte ou que vous souhaitez l'être, consultez votre médecin afin qu'il réévalue l'intérêt du traitement.

Si vous prenez IMOVANE au cours du 1er trimestre de la grossesse : de nombreuses études n'ont pas montré d'effet malformatif des benzodiazépines. Cependant, certaines études ont décrit un risque potentiellement augmenté de survenue de fente labio-palatine chez le nouveau-né par rapport au risque présent dans la population générale. Une fente labio-palatine (parfois nommée « bec de lièvre ») est une malformation congénitale causée par une fusion incomplète du palais et de la lèvre supérieure. Selon ces données, l'incidence des fentes labio-palatines chez les

Maphar

Ed Aklmia N° 6, QI.

Sidi Bernoussi, Casablanca

IMOVANE 7.5 MG

CP PELL B20

P.P.V : 38,80 DH


6 118000 012368

Imovane® 7,5 mg

Zopiclone

Comprimé pelliculé sécable

sanofi

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament a été prescrit spécialement pour vous. Il pourra être nocif, même si les signes de votre maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF01 (N : système nerveux central).

Ce médicament appartient à une famille de médicaments apparentés aux benzodiazépines.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de courte durée des insomnies chez l'adulte.

Il agit : • En augmentant la durée et en améliorant la qualité du sommeil,

• En diminuant le nombre de fois où l'on se réveille la nuit et le nombre de fois où l'on se réveille trop tôt.

Ne prenez pas ce médicament sur une période prolongée. Le traitement doit être aussi court que possible car le risque de dépendance augmente avec la durée du traitement. Chez l'enfant, étant donné l'absence de données, l'utilisation d'IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable n'est pas recommandée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable : • Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous êtes allergique au blé (car ce médicament contient de l'amidon de blé). • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des muscles). EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable.

L'utilisation d'IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable n'est pas recommandée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans : la tolérance et l'efficacité d'IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable n'ayant pas été démontrées dans cette population.

Avant de prendre IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, prévenez votre médecin : • Si vous avez une insuffisance respiratoire.

• Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique). • Si vous avez eu des problèmes de dépendance à l'alcool.

Avant de prendre IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, vous devez savoir que : • Une insomnie peut révéler un autre trouble physique ou psychique. Une évaluation médicale doit être effectuée avant la prescription de ce médicament. • Ce médicament ne traite pas la dépression. Si vous souffrez également de dépression, votre médecin vous prescrira un traitement approprié. Si la dépression n'est pas traitée, elle peut s'aggraver avec une persistance ou une augmentation possible du risque suicidaire.

• Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant, il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou s'il peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical. • Si votre insomnie persiste ou s'aggrave après une période courte de traitement, consultez votre médecin. • Dans les heures qui suivent la prise du médicament, il peut survenir :

• Une perte de la mémoire concernant les événements survenus pendant le traitement (amnésie antérograde). - Des troubles du comportement (tel que agressivité ou actes automatiques). - Une altération de l'état de conscience. - Une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si :

* Vous prenez ce médicament moins de 12 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance. * Vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée.

* Vous prenez de la zopicline alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif

ou qui augmente la quantité de alcôolisées ou des médicaments. Ces troubles peuvent être dangereux et devraient arrêter le traitement.

• Il peut également survenir :

- Un somnambulisme (par exemple,

- Une conduite automobile sans

prise de la mémoire concernant

l'abus d'IMOVANE 7,5 mg, comp-

osité d'alcool ou d'autres médi-

caments, semblant augmenter le

Dans de tels cas, l'arrêt du traite-

Risque de dépendance : La prise

du développement d'abus et/ou une dépendance physique et

psychologique. Le risque de dépendance augmente avec la dose et

la durée du traitement et ce risque est plus fort lorsque la

zopicline est prise pendant plus de 4 semaines. Le risque d'abus

et de dépendance est plus grand chez les patients ayant des

antécédents de troubles mentaux et/ou d'alcoolisme, de

toxicomanie ou d'abus médicamenteux.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez déjà

souffert de troubles mentaux ou si vous avez abusé ou avez été

dépendant de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

La dépendance peut se manifester par un phénomène de sevrage

avec des symptômes tels que : insomnie, maux de tête, anxiété,

douleurs musculaires, irritabilité, confusion, hallucinations,

convulsions.

Ce phénomène peut survenir pendant le traitement entre 2 prises

ou dans les jours qui suivent l'arrêt du traitement.

Divers facteurs semblent favoriser la dépendance : • si vous

prenez IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable de façon

prolongée. • si vous prenez une dose importante. • si vous avez

déjà présenté une dépendance à d'autres médicaments, substances ou à l'alcool, • si

vous êtes anxieux. • si vous prenez un autre médicament de la famille des

benzodiazépines tel qu'un anxiolytique ou un autre somnifère. • si vous prenez un

médicament de la famille des analgésiques morphiniques (médicament utilisé pour

éliminer la douleur).

Lisez attentivement la rubrique 3. Comment prendre IMOVANE 7,5 mg, comprimé

pelliculé sécable ? Pour plus d'informations, parlez-en à votre médecin ou à votre

pharmacien.

Risque de rebond : Une réapparition temporaire de l'insomnie peut survenir à l'arrêt

du traitement.

Afin de diminuer le risque de survenue d'un phénomène de sevrage ou de rebond de

l'insomnie, la dose sera diminuée progressivement et les prises seront espacées. Les

modalités d'arrêt du traitement doivent être précisées par votre médecin.

Risques de l'utilisation concomitante avec des opioïdes

L'utilisation concomitante d'IMOVANE avec des opioïdes peut entraîner une séduction,

une dépression respiratoire, un coma et un décès. Si vous prenez en même temps

IMOVANE et des opioïdes, votre médecin portera une attention particulière aux signes de

la dépression respiratoire et de la séduction.

Utilisation chez les personnes âgées de plus de 65 ans

IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable doit être utilisé avec prudence en raison de

la fréquence plus importante des troubles du comportement chez les personnes âgées,

du risque de somnolence et de relâchement musculaire qui peuvent favoriser les chutes.

Les chutes ont souvent des conséquences graves chez les personnes âgées.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU

DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou

pourriez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé en association avec des opioïdes,

cela peut augmenter le risque de séduction, de dépression respiratoire, de coma et de

décès. La dose et la durée du traitement concomitant seront limitées.

IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable avec des aliments et boissons

La consommation d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du

traitement.

Grossesse et allaitement : Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse. Si vous

découvrez que vous êtes enceinte ou que vous souhaitez l'être, consultez votre médecin

afin qu'il réévalue l'intérêt du traitement.

Si vous prenez IMOVANE au cours du 1er trimestre de la grossesse : de nombreuses

données n'ont pas montré d'effet malformatif des benzodiazépines. Cependant,

certaines études ont décris un risque potentiellement augmenté de survenue de fente

labio-palatine chez le nouveau-né par rapport au risque présent dans la population

générale. Une fente labio-palatine (parfois nommée « bec de lièvre ») est une

malformation congénitale causée par une fusion incomplète du palais et de la

lèvre supérieure. Selon ces données, l'incidence des fentes labio-palatines chez les

Maphar

Ed Aklmia N° 6, QI.

Sidi Bernoussi, Casablanca

IMOVANE 7.5 MG

CP PELL B20

P.P.V : 38,80 DH



6 118000

012368

IXOR® (Oméprazole)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28
- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables dévient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que l'IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'IXOR® ?
3. Comment prendre l'IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver l'IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QU'IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

- Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une gêne au niveau du pancréas (syndrome de Taurac-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (rétrécissement), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE l'IXOR® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

- Ne prenez jamais l'IXOR® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe (par exemple pantoprazole, lanoprazole, rabeprazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir pour traiter l'infection par le VIH.

- Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, pas l'IXOR® comprimé effervescent. Si vous avez des doutes à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce comprimé effervescent.

- En raison de la présence d'aspartam, ce médicament est indiqué en cas de phénylkétoneurie.

- Faute de mention : IXOR® (Mises en garde spécifications particulières d'emploi)

Prendre en compte la teneur en sodium chez les patients à régime hyposodé strict.

- IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent

- IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg de sodium par comprimé effervescent.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre l'IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® comprimé effervescent peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre l'IXOR® comprimé effervescent ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :

- Vous perdez du poids sans raison si vous avez des problèmes d'appétit.

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

- Vous avez des selles noires (teintées de sang).

- Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'oméprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

- Si vous êtes déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement avec un médicament similaire à l'IXOR® qui réduit l'acidité de l'estomac.

- Vous devez faire un examen sanguin spécifique (Gastronomogramme A).

Si vous prenez l'IXOR® comprimé effervescent, il est recommandé (durée supérieure à 8 semaines) à votre médecin de vous surveiller probablement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et événements nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que l'IXOR® comprimé effervescent, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier dans les zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que vous le pouvez. car vous devrez peut-être arrêter votre traitement avec l'IXOR®. Rappelez-vous de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

Enfants :

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que cela ne soit pas recommandé. Ne donnez pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou <10kg.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Autres médicaments et l'IXOR® comprimé effervescent

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela concerne également les médicaments que vous achetez sans ordonnance.

l'IXOR® comprimé effervescent peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'IXOR® comprimé effervescent.

Vous ne devrez pas prendre l'IXOR® comprimé effervescent si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devrez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Kétonazolac, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisé dans le traitement des infections fongiques);

- Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques);

- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie) ou comme relaxant musculaire;

- Phénitytoïne (utilisé dans l'épilepsie); si vous prenez de la phénitytoïne, une surveillance par votre médecin serait nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de l'IXOR® comprimé effervescent;

- Médicaments anti-coagulants pour fluidifier le sang tel que la

IXOR® 20 mg 28 comprimés effervescents

PPU 118DH50

EXP 06/2025

LOT 35026

ce qui peut temporairement arrêter l'effet de l'IXOR® comprimé effervescent.

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec l'IXOR® comprimé effervescent pour le traitement d'un ulcère à Helicobacter pylori, il est important que vous informez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

- Aliments et boissons (Interactions avec les aliments et les boissons)

l'IXOR® comprimé effervescent avec les aliments et les boissons

Les comprimés effervescent peuvent être pris avec de la nourriture ou du jus.

- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives

Sans objet.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous prenez l'IXOR® comprimé effervescent, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'oméprazole est excrété dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé dans des thérapies.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre l'IXOR® comprimé effervescent pendant l'allaitement.

- Sporifique

Sans objet.

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

l'IXOR® comprimé effervescent n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire. Si c'est le cas, vous ne devrez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

- Exipients à effets notoires :

- Aspartam

- Sodium : en cas de régime désodé ou hyposodé, tenir compte de la teneur en sodium :

- l'IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent

- l'IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg de sodium par comprimé effervescent

3 - COMMENT PRENDRE l'IXOR® ?

- Instruction pour un bon usage

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez avec votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de comprimés effervescent vous devrez prendre et pendant combien de temps. Vous devrez prendre Cela dépend de votre état de santé et de votre âge.

- Posologie : mode et/ou voie (s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

- Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 - 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

- La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

ANDOL® 1000 mg

Tube de 8 Comprimés effervescents Paracétamol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un douleur, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourra lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1- COMPOSITION DU MÉDICAMENT

Principe actif : Paracétamol 1000 mg

Excipients : Acide citrique anhydre, Bicarbonate de sodium, Sorbitol, Carbonate de sodium anhydre, Povidone K29-30, Macrogol 6000, Arôme orange 74017-61, Arôme abricot 5751-31, Saccharine sodique, Aspartame, Beta-carotène 100, Stéarate de magnésium q.s.p un comprimé effervescent.

Excipients à effet potager : Sodium, Sorbitol, Aspartam.

2- CLASSE PHARMACO-THERAPIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGÉSIQUE ET ANTI-PYRÉTIQUE-ANILIDES – Code ATC : N02BE01

3- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

ANDOL est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrrétique (fait baisser la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol.

Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre, par exemple en cas de maux de tête, d'état grippal, de douleurs dentaires, de courbatures, de réactions dououreuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrite et de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans). Lire attentivement la rubrique Posologie.

Pour les enfants pesant moins de 50 kg, il existe d'autres présentations d'ANDOL dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- POSOLOGIE

Attention ! Cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par unité : ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant pesant plus de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans).

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 50 kg, il existe d'autres présentations d'ANDOL dont le dosage est plus adapté. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

5- CONSEILS

Posologie chez l'adulte et l'enfant à partir de 50 kg (soit à partir d'environ 15 ans)

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 1000 mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

Doit-on paracétamol à un enfant dépasser

- Chez un adulte ou un enfant pesant plus de 50 kg :

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 grammes de paracétamol par jour (soit 3 comprimés effervescents par jour).

Cependant, si vous avez des douleurs plus intenses, et uniquement sur les conseils de votre médecin, la dose totale peut être augmentée jusqu'à 4 grammes de paracétamol par jour (soit 4 comprimés effervescents par jour).

NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACÉTAMOL PAR JOUR (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).

• Situations particulières :

La dose maximale journalière ne doit pas dépasser 60 mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/jour) dans les situations suivantes :

• si vous pesez moins de 50 kg,

• si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

• si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment,

• si vous souffrez de déshydratation,

• si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans, et que vous avez des maladies de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

EN CAS DE DÉTOURNEMENT, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

• si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans, et que vous avez des maladies de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

EN CAS DE DÉTOURNEMENT, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

4- MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Vous devez dissoudre le comprimé dans un verre d'eau. Attendez la dissolution complète avant de boire immédiatement après le contenu du verre.

Fréquence d'administration

Des prises régulières permettent d'éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne : voir rubrique « Posologie ».

chez l'enfant, les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures, et d'au moins 4 heures.

chez l'adulte, les prises doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), vous devez attendre au moins 8 heures entre chaque prise.

Si vous avez l'impression que l'effet d'ANDOL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

5- DUREE DU TRAITEMENT

Sauf avis médical, la durée du traitement est limitée :

- à 5 jours en cas de douleurs,

- à 3 jours en cas de fièvre.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne continuez pas le traitement sans l'avis de votre médecin.

6- CONTRE-INDICATIONS

NE prenez JAMAIS ANDOL 1000 mg, comprimé effervescent :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique composition.

- Si vous avez une maladie grave du foie.

- En cas de phénylettonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

- Pour traiter un enfant de moins de 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer. Utilisez une autre forme.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et instructions en cas de surdosage »)

6- EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Rarement, une réaction allergique peut survenir :

- boutons et/ou des rougeurs sur la peau,

- urticaire,

- brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer (œdème de Quincke),

- malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (chof, anaphylactique).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. A l'avvenir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

- De très rares cas d'effets indésirables cutanés graves ont été rapportés.

- Exceptionnellement, ce médicament peut diminuer le nombre de certaines cellules sanguines (leucopénie, neutropénie), plaquettes (thrombopénie) pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

- Autres effets indésirables possibles (dont la fréquence ne peut être estimée sur la base de données disponibles) : troubles du

fonctionnement des globules blancs (agranulocytose)

(anémie hémolytique)

plus de 6 plaques rouges

peuvent brûler, lais-

mêmes en pigmen-

teur pigmenté vers

l'épaule (syndrome

Dans ce cas de

Déclaration

Si vous re-

vez votre méde-

cien et/ou phar-

macien

et/ou infirmier

7- MISÉ

PARTICULIERS D'EMPLOI

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ANDOL 1000 mg, comprimé effervescent.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec ANDOL

• Si la douleur persiste plus de 5 jours, ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne continuez pas le traitement sans l'avis de votre médecin.

• La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie.

• Vous devez demander l'avis de votre médecin avant de prendre de l'alcool :

- Si vous pesez moins de 50 kg,

- Si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins,

- Si vous buvez fréquemment de l'alcool récemment,

- Si vous souffrez de déshydratation,

- Si vous êtes atteint de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue durée, si vous êtes atteint du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteint de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang),

- si vous êtes allergique à l'aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens

• La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

En cas de sevrage récent d'un alcoolisme chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré.

• En cas d'administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « Posologie »).

• En cas d'aspiration virale aigüe, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

• Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

• Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Analyses de sang

Prévenez votre médecin si vous prenez ANDOL et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les résultats de votre taux d'acide urique et de sucre (glycémie) dans le sang.

Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

EN CAS DE DÉTOURNEMENT, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Enfants

Sans objet.

8- INTERACTIONS

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

NE prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par la warfarine ou un AVK), la prise d'ANDOL 1000 mg, comprimé

ANDOL®
PARACÉTAMOL

Dosages - Etats Nervieux / Pain - Fèver

Boîte de 8 comprimés effervescents

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

ANDOL® 1000 mg

Paracétamol 1000 mg

Produit de la famille ANDOL

RESPIRAN

Solutio

LOT : 0029
PER : 01/2016
PP : 45.00 DH

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Respiranor

Extrait de Primula veris, Extrait de Thym, Extrait de Glycyrhiza glabra, huile de caroube, Glycerine, Sorbitol, Sorbate de potassium

FORME ET PRÉSENTATIONS

Solution buvable, flacon de 100ml.

PROPRIÉTÉS

RESPIRANOR est un sirop composé d'extraits de plantes Extrait de Primula veris, Extrait de thym, et Extrait de Glycyrhiza glabra dont les propriétés sont bénéfiques pour la gorge et les voies respiratoires.

Il est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte et l'enfant, en particulier lorsqu'elles surviennent le soir ou pendant la nuit.

VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

Voie orale

RESPIRANOR

2 cuillères à soupe 3 à 4 fois par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser par la femme enceinte.

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Bien agiter avant l'emploi.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de chaleur.

Complément alimentaire n'est pas un médicament

N° D'enregistrement au Ministère de la santé :

N°20212103451/V1/DMP/CA/18

Agrément ONSSA n° : CAPV.5.404.17

Autorisation ONSSA n° : ES.5.381.17

Fabriqué par : PMP BIOPHARMED CASABLANCA - MAROC



EFFIPR

(Prednisolon)

PPU 40DH00
EXP 06/2026
LOT 32011 17

PRESENTATIONS

Boîte de 30 comprimés effervescents à 5 mg

Boîte de 20 comprimés effervescents à 20 mg

COMPOSITION

- Comprimés effervescents à 5 mg	
Prednisolone (sous forme de métasulfobenzoate de sodium)	5 mg
Excipient qsp	1 comprimé effervescent
- Comprimés effervescents à 20 mg	
Prednisolone (sous forme de métasulfobenzoate de sodium)	20 mg
Excipient qsp	1 comprimé effervescent

PROPRIETES

EFFIPRED® est un glucocorticoïde à usage systémique, utilisé principalement pour ses propriétés antiinflammatoire, antiallergique et immunodépressive.

INDICATIONS

Affections rhumatologiques, respiratoires, ORL, ophtalmologiques, neurologiques, néphrologiques, néoplasiques, infectieuses, hématologiques, endocrinianes, digestives, dermatologiques, et dans les connectivites et collagénoses.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

- Se conformer strictement à la prescription du médecin.
- Prendre les comprimés dissous dans un verre d'eau au cours des repas, de préférence en une prise le matin.

CONTRE-INDICATIONS

- Tout état infectieux non traité par antibiotiques ou antimycosiques.
- Certaines viroses en évolution (herpès, varicelle, zona, hépatite)
- États psychotiques encore non contrôlés par un traitement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISE EN GARDE

En cas de traitement prolongé :

- Observer un régime pauvre en sucres et enrichi en protéines et en calcium
- Réduire l'apport en sodium en tenant compte de la teneur en sodium du comprimé (43 mg de sodium par comprimé à 20 mg et 28,6 mg de sodium par comprimé à 5 mg).
- Ne jamais arrêter brutalement le traitement mais diminuer progressivement les doses en suivant la prescription de votre médecin.