

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0031427

Maladie

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 02659

Société :

Optique

Autres

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BENZEKRI JAMAL

Date de naissance :

13/11/1986

Adresse :

8 Rue Mansour 9. H 0154

Tél. : 0668 5929 27

Total des frais engagés : 1478,90

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Jamal CHRAIBI
GYNECOLOGUE - OBSTETRICIEN
1075 Bo Mdc VI

Date de consultation :

05/02/2014

Nom et prénom du malade :

BENZEKRI Othman

Age : 28.02.2006

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Etat grippal

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 05/02/2014

Signature de l'adhérent(e) :

ca54

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/02/24	Q2	2000 HT		Dr. Jamal CHRAIBI GYNECOLOGIE OBSTETRICIEN

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	05/02/24	556,70

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
	07/02/24	B5301P	720,90

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
ODF PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H	25533412	21433552	
D	00000000	00000000	G	
	00000000	00000000		
	35533411	11433553		
B				
[Création, remont, adjonction]	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DEBUT D'EXECUTION
	H	25533412	21433552	
D	00000000	00000000	G	
	00000000	00000000		
	35533411	11433553		
B				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION			FIN D'EXECUTION

Dr. CHRAIBI Jamal

الدكتور الشرايببي جمال

Gynécologie Obstétrique

اختصاصي في أمراض النساء والولادة

Accouchement, échographie

ولادة، الفحص بالصدى

Stérilité du couple

عقم الزوجين

Ex. Chef de service à la polyclinique de Settat

سابق لسلحة التوليد بمصحة الضمان

Lauréat de l'université de Toulouse

الاجتماعي بسطات

خريج كلية الطب بتولوز (فرنسا)



Casablanca, le

١٧/٩/٢٠٢٤

الدار البيضاء في

BENZEKRI اثنان

$$89,90 \times 3 = 269,70$$

PPV: 49,60 DH
LOT: 23H10
EXP: 08/2026

- Ferrell CP 45,60 x 1 = 45,60
- Ovendol 140,00
- Nebo Medical 16,60
- Ecocofred 1 31,20
- Bouglabid 556,70

PPV: 56,30 DH
LOT: 23H091
EXP: 08/2025

1075, Bd Med VI (DAR TOUZANI), Hay Ifriquia

شارع محمد السادس (دار التوزاني). حي إفريقيا

Dr. Jamal CHRAIBI
GYNECOLOGUE - OBSTETRICIEN
1075, Bd. Med. VI
ICE: 6610000000000000077

Tél : 05 22 37 85 17

Gsm : 06 61 33 22 33

LOCAPRED® 0,1%

Désonide 0,1%
Crème Voie cutanée

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez à personne d'autre.

Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

■ COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Désonide 0,100 g
Excipients : stéarate de polyoxyéthylène glycol 600 (mono et diesters), stéarate de polyoxyéthylène glycol 300, paraffine liquide légère, glycérides polyglycosylés saturés alcool cétolique propylène glycol, purifiée. Pour 100 g de crème eau

■ FORME PHARMACEUTIQUE

Crème - Tube de 15 g

■ CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

DERMOCORTICOÏDE (D : D)

■ DANS QUELS CAS UTILISER

Ce médicament est un corticoïde.

Il est préconisé dans certaines maladies de la peau : la dermatite de contact, la dermatite atopique, mais votre médecin peut le prescrire

LOCAPRED® 0,1%
Crème
Tube de 15 g



6 118000 010951

mebo

Pommade

Tube de 30g

DCI : Extrait de l'huile de sésame
(β -SITOSTEROL)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice ou par votre pharmacien ou votre médecin.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Mebo POMMADE et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mebo POMMADE ?
3. Comment prendre Mebo POMMADE ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Mebo POMMADE ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Mebo POMMADE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Introduction :

Le traitement des brûlures exposées à l'humidité a été introduit dans la pratique médicale depuis deux décennies en Chine. Le concept de cette thérapie était d'exposer la plaie à l'humidité ambiante dans le but d'augmenter le processus de cicatrisation naturel, pour que la migration des kératinoctytes, l'anxiogènes ainsi que l'interaction avec les facteurs de croissance soient facilitées.

Mebo (pommade pour le traitement des brûlures exposées à l'humidité) est donc la pommade spécialement développée pour répondre à ces critères.

Mode d'action :

Code ATC : D03A, Préparations pour le traitement des plaies et des ulcères, cicatrisants.

Mebo agit en :

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provocant un effet anti-inflammatoire et réduisant cependant l'œdème et l'erythème.
- Créant une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et fongique.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en même temps en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide de la peau endommagée (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aigües.
- Activant l'épithéllisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.

Indications thérapeutique :

- Brûlures d'épaisseur partielle et superficielle locales et des ulcères cutanés.
- Plaies aiguës superficielles, coupures et égratignures.
- Avec le pansement sur des plaies chirurgicales et sur le tissu nécrotique de la peau.
- Talons secs et fissurés, mamelons crevassés, et les plaies des muqueuses.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Mebo POMMADE ?

Contre-indications :

- **Mebo** ne doit pas être utilisé chez les personnes ayant présenté une hypersensibilité à l'un de ses composants.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

- **Mebo** ne doit pas être utilisé chez les personnes ayant présenté une hypersensibilité à l'un de ses composants.
- Pendant la conservation l'apparence physique de la pommade **Mebo** peut changer spécialement durant les saisons chaudes mais sans que cela puisse affecter l'efficacité du produit.
- Ce médicament contient l'huile de sésame. Peut, dans de rares cas, provoquer de graves réactions allergiques.

Interaction avec autres médicaments et autres formes d'interactions :

Aucune interaction médicamenteuse connue n'a été signalée.

Interaction avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Fécondité, grossesse et allaitement

Mebo est utilisé depuis plus de deux décennies, même par les femmes enceintes.

Enfant :

Mebo est sans danger pour les enfants.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines:

Il n'est pas probable que **Mebo** peut affecter l'aptitude à conduire des véhicules.

Sportifs :

Sans objet.

Excipients à effet notoire :

Huile de sésame.

3. COMMENT PRENDRE Mebo POMMADE ?

Mode d'administration:

Voie cutanée.

Composition:

Extrait de l'huile de sésame (β -sitostérol).

Excipient

Excipient à effet notoire: Huile

Conserver à une température n

Ne pas laisser à portée et à La

Pour les indications, les contre-

PPV: 140,00 Dhs

BRONCHATHIOL



FLUIDIFIANT des voies respiratoires ADULTE Solution Buvable

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

FORMULE

Carbocisteine 5,00 g

Excipients :

Saccharinate de sodium, hydroxyde de sodium, rouge cochenille A, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, glycerol, excipient aromatisé hypocolorique, hypoglucidique q.s.p..... 100 ml

Flacon de 150 ml.

EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE :

Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de Propyle, sodium, rouge cochenille A.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

MUCOLYTIQUE

[R: Système respiratoire]

Ce médicament en modifiant les sécrétions bronchiques, facilite leur évacuation par la toux.

INDICATIONS :

Ce médicament est préconisé chez l'adulte (plus de 15 ans) en cas d'affections respiratoires récentes avec difficulté d'expectoration (difficultés à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).

POSÉOLOGIE USUELLE :

voie orale.

1 cuillère à soupe 3 fois par jour.

Pour les enfants de moins de 15 ans : utiliser BRONCHATHIOL® Enfant.

- À prendre de préférence en dehors des repas.

- La durée de traitement doit être brève et ne pas excéder 5 jours.

CONTRE-INDICATIONS

La forme adulte est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 15 ans.

EFFETS INDESIRABLES

A fortes doses, on peut parfois constater l'apparition de phénomènes digestifs : gastralgies, nausées, diarrhées.

Mises en garde spéciales et Précautions d'emploi :

Faites attention avec BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

À prendre de préférence en dehors des repas.

La durée de traitement doit être brève et ne pas excéder 5 jours.

Les toux productives, qui représentent un élément fondamental de la défense broncho-pulmonaire, sont à respecter.

L'association de mucomodificateurs bronchiques avec des antitussifs et/ou des substances asséchantes les sécrétions (atropiniques) est irrégulière.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des réactions allergiques

BRONCHATHIOL®

Carbocisteine 5%

Carbocisteine 5%

Ne pas utiliser

Si vous avez

- Date de péremption

Ne pas utiliser BRONCHATHIOL® EXPECTORANT ADULTES, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

- Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.



Fabriqué par bottu s.a.

Sous licence MELISANA PHARMA

82, Allée des Casuarinas - Ain Seba - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

FERYL®

COMPOSITION :

Gluconate de Fer	100mg
Cellulose Mycrocrystal poudre.....	175mg
Stéarate de magnésium.....	8mg
Gélule Végétale	75mg

Apport par gélule : 11,8 mg de fer soit 84% des AJR

PROPRIETE :

Bien que le fer soit présent en toute petite quantité dans le corps, il joue un rôle essentiel notamment dans l'oxygénation du sang et des muscles ainsi que dans la constitution de réserves d'énergie. L'organisme ne peut synthétiser le fer et doit donc le puiser dans les aliments.

CONSEILS D'UTILISATION :

Feryl sera utilisé :

Chez les femmes,

- Pendant les menstruations (ménorragies etc...)
- Pendant la grossesse puisque les besoins en fer augmentent.
- La femme allaitante

Chez l'homme,

- En cas d'efforts physiques intenses
- Chez le sportif etc...
- Pendant la période de croissance particulièrement chez les jeunes afin de constituer leurs réserves en fer.

MODE D'UTILISATION :

Prendre 1 à 2 gélules 3 fois par jour 30 min avant le repas.

Présentation : Boite de 30 gélules, 60 gélules

à base de plantes naturelles

PRECAUTION D'EMPLOI :

- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Tenir hors de portée des enfants
- La prise de Feryl ne peut être considéré comme substitut

Lustrel Laboratoire S.A.S

Parc Marcel Dassault - 273, Rue A. Santos Dumont
34435 Saint Jean de Vedas - France

FERYL®

LOT : 156918N

DLUO : 07/2025

PPC : 89.90 DH

PROMOPHYDIS

FERYL®

COMPOSITION :

Gluconate de Fer	100mg
Cellulose Mycrocrystal poudre.....	175mg
Stéarate de magnésium.....	8mg
Gélule Végétale	75mg

Apport par gélule : 11,8 mg de fer soit 84% des AJR

PROPRIETE :

Bien que le fer soit présent en toute petite quantité dans le corps, il joue un rôle essentiel notamment dans l'oxygénation du sang et des muscles ainsi que dans la constitution de réserves d'énergie. L'organisme ne peut synthétiser le fer et doit donc le puiser dans les aliments.

CONSEILS D'UTILISATION :

Feryl sera utilisé :

Chez les femmes,

- Pendant les menstruations (ménorragies etc...)
- Pendant la grossesse puisque les besoins en fer augmentent.
- La femme allaitante

Chez l'homme,

- En cas d'efforts physiques intenses
- Chez le sportif etc...
- Pendant la période de croissance particulièrement chez les jeunes afin de constituer leurs réserves en fer.

MODE D'UTILISATION :

Prendre 1 à 2 gélules 3 fois par jour 30 min avant le repas.

Présentation : Boite de 30 gélules, 60 gélules

à base de plantes naturelles

PRECAUTION D'EMPLOI :

- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Tenir hors de portée des enfants
- La prise de Feryl ne peut être considéré comme substitut

Lustrel Laboratoire S.A.S

Parc Marcel Dassault - 273, Rue A. Santos Dumont
34435 Saint Jean de Vedas - France

FERYL®

LOT : 156918N

DLUO : 07/2025

PPC : 89.90 DH

PROMOPHYDIS

FERYL®

COMPOSITION :

Gluconate de Fer	100mg
Cellulose Mycrocrystal poudre.....	175mg
Stéarate de magnésium.....	8mg
Gélule Végétale	75mg

Apport par gélule : 11,8 mg de fer soit 84% des AJR

PROPRIETE :

Bien que le fer soit présent en toute petite quantité dans le corps, il joue un rôle essentiel notamment dans l'oxygénation du sang et des muscles ainsi que dans la constitution de réserves d'énergie. L'organisme ne peut synthétiser le fer et doit donc le puiser dans les aliments.

CONSEILS D'UTILISATION :

Feryl sera utilisé :

Chez les femmes,

- Pendant les menstruations (ménorragies etc...)
- Pendant la grossesse puisque les besoins en fer augmentent.
- La femme allaitante

Chez l'homme,

- En cas d'efforts physiques intenses
- Chez le sportif etc...
- Pendant la période de croissance particulièrement chez les jeunes afin de constituer leurs réserves en fer.

MODE D'UTILISATION :

Prendre 1 à 2 gélules 3 fois par jour 30 min avant le repas.

Présentation : Boite de 30 gélules, 60 gélules

à base de plantes naturelles

PRECAUTION D'EMPLOI :

- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Tenir hors de portée des enfants
- La prise de Feryl ne peut être considéré comme substitut

FERYL®

LOT : 156918N

DLUO : 07/2025

PPC : 89.90 DH

PROMOPHYDIS

Lustrel Laboratoire S.A.S

Parc Marcel Dassault - 273, Rue A. Santos Dumont
34435 Saint Jean de Vedas - France

Dr. CHRAIBI Jamal

Gynécologie Obstétrique

Accouchement, échographie

Stérilité du couple

Ex. Chef de service à la polyclinique de Settat

Lauréat de l'université de Toulouse

الدكتور الشرايببي جمال

اختصاصي في أمراض النساء والولادة

ولادة، الفحص بالصدى

عقم الزوجين

سابق لصلاحة التوليد بمصحة الضمان

الإجتماعي بسطات

خرج كلية الطب بتولوز (فرنسا)



Casablanca, le

5/2/2024

الدار البيضاء في

BENZEKRI Athmane

- NFS \$

- Ferritin

- Vit D.

Dr. Jamal CHRAIBI
GYNECOLOGUE - OBSTETRICIEN
1075, Bd Med VI
ICE : 3010000000000077

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES GRANDE CEINTURE

Boulevard La grande Ceinture, Résidence El Khair, N° 118, 1ère Etage
Hay El Mohammadi- Casablanca Tél : 05.22.63.86.22 - Fax : 05.22.63.86.22

Facture

Nº facture 2024-02852

Patient : Mr BENZEKRI Othmane

Date prélèvement : 07/02/2024

Analyses	Valeur en B	Montant
NUMERATION GLOBULAIRE	80	107,20
Ferritine	200	268,00
VITAMINE D (25 Hydroxycholécalciférol)D2 + D3:	250	335,00
	Total B	530,00
	Total	720,20

Arrêtée la présente facture à la somme de : SEPT CENT VINGT DIRHAMS ET 20 CENTIMES ***

LA GRANDE CEINTURE
TOURISTIQUE MOURSAÏ
TOURISTIQUE MOURSAÏ
TOURISTIQUE MOURSAÏ
TOURISTIQUE MOURSAÏ



الدكتور مرسلي عبد اللطيف
أخصائي في التحاليل الطبية

Dr. MOURSALI Abdellatif

Biologiste

Casablanca

Examen du : 07/02/2024

Heure Pvt : 8:19:00 Edité le : 07/02/2024

Mr BENZEKRI Othmane

Code Patient : 24-01476

Réf : 070224-011

Compte rendu d'analyses

070224-011

Page : 1 / 2

HEMATOLOGIE

Valeurs Usuelles

Antériorité

NUMERATION GLOBULAIRE

Erythrocytes	:	5,89	M/mm ³	(4,5 - 5,8)
Hémoglobine	:	13,60	g/dl	(13 - 18)
Hématocrite	:	41,10	%	(40 - 54)
VGM	:	69,78	fL	(80 - 100)
TCMH	:	23,09	pg	(27 - 33)
CCMH	:	33,09	g/dl	(32 - 35)
Leucocytes	:	6320	/mm ³	(4000 - 10000)
Plaquettes	:	404000	/mm ³	(150000 - 450000)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles	:	43,5 %	2749,20 /mm ³	(1700 - 7700)
Polynucléaires Eosinophiles	:	7,4 %	467,68 /mm³	(Inférieur à 400)
Polynucléaires Basophiles	:	0,3 %	18,96 /mm ³	(Inférieur à 50)
Lymphocytes	:	31,2 %	1971,84 /mm ³	(1000 - 4000)
Monocytes	:	17,6 %	1112,32 /mm³	(200 - 1000)
Au total	:	100 %		

Indice de Distribution des Globules Rouges (IDR) : **16,10** % (11,5 - 15,5)

Commentaire : Anisocytose erythrocytaire

L.A.M GRANDE CEINTURE
Dr. Abdellatif MOURSALI
Biologiste
El Hamraaia, Etage 1118 Bd
Res. Al Khair Etage 1118 Bd
La Grande ceinture H.M Casablanca



مختبر التحاليلات الطبية لحزام الْجَزَرِ

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES GRANDE CEINTURE

Dr. MOURSALI Abdellatif

Biologiste

الدكتور مرسلي عبد اللطيف
أخصائي في التحاليلات الطبية

Dossier N° : 070224-011

Mr BENZEKRI Othmane

Page : 2 / 2

BIOCHIMIE

Ferritine : 13,53 ng/ml

Valeurs Usuelles

Antériorité

Interprétation :

< 10 ng/ml : Signe une carence martiale
30 - 300 ng/ml : Normal

VITAMINES

VITAMINE D (25 Hydroxycholécalciférol)D2 + D3: 13,20 ng/ml
(COBAS E 411)

Valeurs Usuelles

Antériorité

Dossier complet

Merci de votre confiance

Le Biologiste

M. MOURSALI
L.A.M. GRANDE CEINTURE
DR. Abdellatif MOURSALI
Pharmacien Biologiste
Résidence El Khair Etage N°118 Bd
la Grande ceinture H.M.Casablanca