

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 20228154

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : GAJJAOUI Rachida / Hassani M. Bouchek

Date de naissance : 06/12/1968

Adresse : Rue 187 N° 56 oufia Casablanca

Tél. 06 17 46 57 96 Total des frais engagés : 473,30 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr. Mostafa LAHKIM**  
Spécialiste en chirurgie  
Traumatologique et Orthopédique  
Av des FAR, 11 rue de doukkala  
Mohammedia - TEL: 05 23 32 00 46

Date de consultation : 28 FEV. 2024

Nom et prénom du malade : GAJJAOUI Rachida Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

gastritis

Conjoint

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 18/03/2024

Signature de l'adhérent(e) : Rachida Gajjoui

18 MAR. 2024

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant de Paiement des Actes
18 FEV. 2024	C2		25000	<p>Dr. Moustafa LAHKIMI</p> <p>Spécialiste en Chirurgie</p> <p>Rhumatologique et Orthopédique</p> <p>Av des FAR 11 Rue de l'Indépendance</p> <p>BP 1000 - CL: 05 22 52 00 46</p>

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
INPE: 092023014	08/11/24	223,30
PHARMACIE EL LOTI		
Mme. BENJENIY NEAMA		
313, Bd. Oued Tensift El Oued		
Casablanca - Tel: 022.91.00.73		

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX





Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCOEFFICIENT DES TRAVAUX  MONTANTS DES SOINS  DEBUT D'EXECUTION  FIN D'EXECUTION  CCOEFFICIENT DES TRAVAUX  MONTANTS DES SOINS  DATE DU DEVIS  DATE DE L'EXECUTION												
																
																
<b>ODF PROTHESES DENTAIRES</b> <b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b> <table border="0"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> <p><b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>					H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	00000000	00000000														
G	35533411	11433553														
																
																
<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS</b>																
<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION</b>																



الدكتور الحكيم مصطفى  
Docteur LAHKIM Mostafa  
طبيب اختصاصي في جراحة العظام  
Specialiste en Chirurgie  
Traumatologique et Orthopédique Enfants et Adultes



Chirurgie des Os et des Articulations  
Chirurgie du Rachis  
Chirurgie de La main

جراحة العظام و المفاصل  
جراحة العمود الفقري  
جراحة اليد

Mohammedia, le .....

28.02.2024

GAGJANI RACHIDA

جذع - Doliwox 120 (٪)  
عالي لستار آر - (45)

EBAL ZAM (دو)  
عالي - (45)

Velut 40  
عالي 20 - (45)

PHARMACIE EL LOTF  
Dr. Mostafa LAHKIM  
Spécialiste en chirurgie  
Traumatologique et Orthopédique  
11 rue de doukkala  
Mohammedia - TEL: 05.23.31.13.13

PHARMACIE EL LOTF  
Mme. BENLOHNE NEAMA  
13, Bd. Omed Taha El Oulemia  
El Jadida 51000 - TEL: 05.22.91.00.22

Avenue des FAR 11 Rue Doukkala  
Mohammedia (Kasbah)

0523 32 90 46

شارع الجيش الملكي 11 زنقة دكالة  
الحمدية (القصبة)

Patente n° : 39403365 - INP : 141061127 - ICE : 001656975000015 - IF : 54505845 - CNSS : 7806849

## Composition :

Vigne rouge feuille.....	200 mg
Hamamélis Feuille.....	60 mg
ES ginkgo bio 1/1%.....	60 mg
Stéarate de magnésium végétal.....	4 mg
Gélule végétale taille 1 .....	75 mg
Poids net total/gélule.....	399 mg

## Propriétés

L'association Vigne rouge, Hamamélis, ginkgo a une action optimale sur les manifestations d'insuffisance veineuse à savoir la crise hémorroïdaire et les jambes lourdes.

- **Vigne rouge** aurait un effet protecteur sur les veines et les petits vaisseaux sanguins ainsi qu'une capacité à réduire les œdèmes (gonflements).
- **Hamamélis** serait vasculoprotecteur.
- **Ginkgo** fluidifierait le sang et protégerait la paroi des vaisseaux sanguins en augmentant leurs diamètres.

## Précaution d'emploi

- VEIN UP est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement
- Ne pas associer à un traitement d'anti-coagulant
- A partir de 18 ans

## Conseils d'utilisation :

VEIN Up est indiqué dans les manifestations d'insuffisance veineuse à savoir la crise hémorroïdaire et les jambes lourdes à raison d'une gélule matin, midi et soir

# ESAC® 20 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

## Composition

Esoméprazole..... 20,00 mg

Sous forme d'ésoméprazole magnésium trihydrate.

Excipients dont et saccharose : q.s.p 1 gélule gastro-résistante

## Qu'est-ce qu'ESAC 20 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament se présente sous forme de gélules contenant des microgranules gastro-résistantes.

ESAC est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

ESAC est utilisé dans :

- le traitement de l'oesophagite érosive par reflux (inflammation de l'oesophage),
- la prévention des rechutes de certaines oesophagites,
- le traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides),
- le traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori,
- le traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
- la prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

## Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 20 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

## Ne pas utiliser ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC,
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,
- si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH).

## Prendre des précautions particulières avec ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétoconazole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour des troubles de la coagulation sanguine), ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique).
- si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
- si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.
- si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de Helicobacter pylori avec ESAC ou si vous prenez ESAC dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres

Si vos symptômes persistent après 4 semaines, votre médecin peut vous prescrire une fois par jour, en fonction de votre état. Le traitement à la demande, en fonction des patients traités par un AINS, gastro-duodénal.

## Adultes :

### - Traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori :

La dose initiale est de 20 mg associé à deux antibiotiques (amoxicilline 1 G et clarithromycine 500 Mg) deux fois par jour pendant 7 jours.

### - Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 à 8 semaines.

### - Prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

20 mg une fois par jour.

ESAC ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.

Suivez strictement les instructions de votre médecin et si vous avez un doute, n'hésitez pas à lui demander conseil.

## Si vous avez pris plus d'ESAC 20 mg que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

## Si vous avez oublié de prendre ESAC 20 mg :

Prenez-le dès que possible.

Cependant, si vous êtes prêt à prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée mais poursuivez votre traitement normalement.

## Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ESAC 20 mg est susceptible d'entraîner occasionnellement des effets indésirables chez certaines personnes.

Ces effets indésirables sont généralement d'intensité légère et disparaissent à l'arrêt du traitement.

### Effets indésirables fréquents

(chez 1 à 10 % des patients traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, flatulence.

### Effets indésirables peu fréquents

(chez moins de 1 % des patients traités) :

Sensation vertigineuse, œdème périphérique, paresthésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, insomnie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (dermatite, rash, prurit, urticaire), malaise.

### Effets indésirables rares

(chez moins de 0,1 % des patients traités) :

Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie

46 00  
50  
33745  
46DH00



# DOLICOX®

Etoricoxib

60 mg

90 mg

120 mg

Comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition du médicament :

60mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib 60 mg

90mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib 90 mg

120mg comprimé pelliculé :

- Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise : Etoricoxib 120 mg

Excipient à effet notable : Lactose monohydrate.

## Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

DOLICOX® 60 mg 90mg et 120mg, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

La classe pharmacothérapeutique : anti-inflammatoires anti-rhumatismaux, non stéroïdiens, coxibs.

## Indications thérapeutiques :

DOLICOX® 60mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints d'arthrose.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante.

DOLICOX® 90mg, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire.

DOLICOX® 120 mg, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients atteints de goutte.

## Posologie

Les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, ne doivent être pris ni par les enfants, ni par les adolescents de moins de 16 ans.

Ne pas dépasser la dose recommandée pour le traitement de votre maladie. Il est important d'utiliser la dose la plus faible qui soulage votre douleur et de ne pas prendre DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé plus longtemps que prescrit.

## Arthrose

La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentée à 60 mg maximum une fois par jour si nécessaire.

## Patients avec problèmes hépatiques.

### Polyarthrite rhumatoïde

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour.

### Douleur aiguë

L'étoricoxib ne doit être utilisé que pendant la période de douleur aiguë.

Douleur post-opératoire après chirurgie dentaire

La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, traitement limité à 3 jours au maximum.

## Patients avec problèmes hépatiques

### Goutte

La dose recommandée est de 120 mg une fois par jour qui ne doit être utilisée que pendant la période aiguë de la douleur, limitée à 8 jours au maximum.

## Patients avec problèmes hépatiques

En cas d'insuffisance hépatique légère (maladie du foie), vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour.

Si vous avez une forme modérée d'insuffisance hépatique, la dose maximale recommandée est de 60 mg un jour sur deux, ou de 30 mg par jour.

### Mode d'administration :

Vale orale.

Le ou les comprimés pelliculés DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, doivent être avalés en une prise par jour. DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé peut être pris au cours ou en dehors des repas.

## Durée du traitement

Ne prenez jamais DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Allergie (hypersensibilité) à l'étoricoxib ou à l'un des autres composants contenus dans DOLICOX® 60mg, 90mg & 120 mg, comprimé pelliculé.
- Allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2.
- Ulcère de l'estomac évolué ou saignement gastro-intestinal.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave des reins.
- Grossesse et allaitement ou prévision de grossesse (voir Rubrique « Grossesse et allaitement »).
- Enfants et adolescents de moins de 16 ans.

PPV : 87DH40

PER : 06/26

LOT : M2013



Effets indésirables

## Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DOLICOX® 60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé peuvent provoquer des effets indésirables, mais ils ne sont pas tous connus.

Si vous présentez un de ces symptômes, voici les effets indésirables suivants :

- Apparition ou aggravation d'un essoufflement, de cheveux,

- Coloration jaune de la peau et des yeux (peut être indésirable),

- Douleur d'estomac importante ou permanente,

- Réaction allergique pouvant inclure des prurit ou de vésicules, ou gonflement du visage, de la tête ou des yeux,

- Entrainer une difficulté à respirer,

La fréquence des effets indésirables possibles suivants :

- Très fréquents (survenant chez plus de 1 patient sur 10),

- Fréquents (survenant chez 1 à 10 patients sur 100),

- Peu fréquents (survenant chez 1 à 10 patients sur 1000),

- Rares (survenant chez moins de 1 patient sur 1000),

Les effets indésirables suivants peuvent survenir chez 1 à 10 patients sur 1000 :

60mg, 90mg & 120mg, comprimé pelliculé.

Très fréquents : Douleur à l'estomac.

Fréquents :

- Alévoitée; Gonflement des jambes et/ou des pieds,

- Étouffissemens, maux de tête; Palpitations, pression artérielle; Siffllements ou difficultés respiratoires,

- Brûlures d'estomac, diarrhée, indigestion, inflammation de l'oesophage, ulcérations sanguines évaluant le fonctionnement du foie et du pancréas,

- Pseudo-grippal.

Peu fréquents :

- Gastroentérite, infection des voies respiratoires supérieures, augmentation du nombre de globules rouges, diminution du nombre de plaquettes, hypersensibilité, augmentation de l'anxiété, dépression, diminution du discernement, n'existent pas, altération du goût, insomnie, somnolence, vision trouble, irritation et rougeur des yeux, anomalie du rythme cardiaque, fréquence et sensation d'oppression, de pression ou de pression de chaleur, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, inflammation des vaisseaux sanguins, ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, nausées, vomissements, ulcère de l'estomac, inflammation de la bouche, ulcère de l'estomac, inflammation grave et aiguë jusqu'à l'hémorragie, syndrome de l'ulcère de l'estomac, gonflement du visage, éruption cutanée, crampes/ spasmes musculaires, douleur musculaire, douleur articulaire, douleur dans les jambes, modification des examens sanguins ou urinaires, troubles rénaux graves, douleur thoracique,

troubles respiratoires graves, douleur thoracique,

troubles respiratoires graves, ulcérations de la peau et des yeux.

Rares :

- Angio-oedème (réaction allergique sévère à l'étoricoxib),

- Confusion, agitation; Problèmes hépatiques (maladie du foie),

- Insuffisance hépatique, jaunissement de la peau et des yeux,

- Diminution du taux de sodium dans le sang, ulcérations de l'estomac ou de l'intestin,

Très rares pour DOLICOX® 120mg, (surveiller) :

Réactions allergiques (qui peuvent être suffisamment graves pour nécessiter un avis médical) : difficultés respiratoires, inflammation de la paroi de l'estomac ou de l'intestin, ballonnement de l'estomac ou de l'intestin, jusqu'à l'hémorragie, troubles hépatiques, troubles rénaux graves, douleur thoracique,

troubles respiratoires graves, douleur thoracique,

troubles respiratoires graves, ulcérations de la peau et des yeux.

Fréquence indéterminée (ne pouvant être évaluée) :

- Jaunissement de la peau et des yeux (jaunissement cardiaque rapide).

Si vous ressentez un des effets mentionnés ci-dessus, mais non mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

## Mises en garde spéciales et précautions

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous avez des antécédents de saignement,

- Vous êtes déshydraté(e),