

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0035032

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]
Matricule : 15295

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL AMINE SALMA

Date de naissance : 31-10-1959

Adresse :

Tél. 066 897 5226

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 07/02/20

Nom et prénom du malade : El Amine Salma Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

H-T-A

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : casab Le : 01 Fév 24
Signature de l'adhérent(e) : Salma

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/02/24				<i>EL AMINE Oussama Préfecture Médicale Ain Chock INPE 5074134</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE CHARM CHEIKH SARL DI DIANI Abouelfatah N°600 LOTS HAMRA 2 AV AL QODS AIN CHOCK - CASABLANCA CSM 0663 43 3141 FIX 06 857 16 86</i>	01 Février 2024	257,40

092076793

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	00000000
G	35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le : 01/02/24

Ordonnance

Sexe : H F

Nom/Prénom : Elamine Salsa
Age : 64

- Codarceg 80/12,5 SV 153,00
1cp mat
 - levodihydro 50 (α₂) SV 27,70 -> 55,40
1cp à je
 - Cardivo AEP. (α₂) SV 13,40 -> 26,80
1cp / jour
 - Codolipraue SV 22,20
1cp -> besoin
- Tot 257,40

PHARMACIE CHARM CHEIKH SARL
DI DIANI Abdelfatah
N°600 LOTS HAMRAZ AV AL QODS
AIN CHOCK CASABLANCA
GSM 0663 43 37 17 FIX 0808 57 16 86

Dr. EL AMINE QUESADA
Préfecture Médicale Ain Chock
INPE: 91014134

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها بانتباٰه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على
انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص
قابل للقطع ؟
 - 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
 - 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
 - 6 - محتويات العلبة و معلومات أخرى
- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي

هذا الدواء هرمونة درقية

دواء الاستعمال



NOTICE : INFORMATION DE L'UT



6 118001 102013

Lévothyrox® 50µg,

Comprimés-sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Les symptômes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Cet effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament

L'association de l'hypothyroïdie et de l'hypertension artérielle peut entraîner un risque d'accident cardiaque. En effet, les antithyroidiens peuvent augmenter la pression artérielle. L'allaitement maternel n'est pas recommandé car il peut entraîner une hypothyroïdie chez l'enfant. L'hypothyroïdie peut également affecter la fertilité féminine. donc être sous-diagnostiquée. La surdose de thyroxine peut entraîner une hyperthyroïdie.



Dénomination du médicament

COTAREG®

80/12.5 mg, 160/12.5 mg,

Comprimés pelliculés. Boîte

Valsartan / Hydrochlorothiazide



6 118001 030125

COTAREG 80/12.5 mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 153.00 DH

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que COTAREG et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COTAREG ?
3. Comment prendre COTAREG ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COTAREG ?

1. Qu'est-ce que COTAREG et dans quel cas est-il utilisé ?

COTAREG contient deux substances actives complémentaires, qui influencent le système régulant la pression artérielle dans l'organisme. Il s'agit d'une part du valsartan qui produit une baisse de la pression en dilatant les vaisseaux sanguins, et de l'hydrochlorothiazide qui réduit la teneur de l'organisme en sodium (sel) et en eau en augmentant l'excrétion urinaire.

COTAREG s'utilise pour traiter l'hypertension légère ou modérée chez des patients lorsqu'un traitement combinant deux substances actives est nécessaire.

Votre médecin en mesurera et en contrôlera l'effet en prenant votre tension artérielle.

COTAREG ne doit être pris que sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COTAREG ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Pourquoi faut-il traiter une hypertension artérielle ?

Une hypertension artérielle non traitée peut endommager les organes vitaux tels que le cœur, les reins et le cerveau. Vous pouvez vous sentir aujourd'hui en parfaite santé, sans aucune manifestation de maladie – mais une hypertension non traitée peut entraîner des séquelles ultérieures telles qu'un accident cérébral, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou la cécité.

Quand COTAREG ne doit-il pas être utilisé ?

Vous ne devez pas prendre COTAREG si vous :

le passez une hypersensibilité ou une allergie à l'hydrochlorothiazide ou à un autre diurétique. De même, vous ne devez pas prendre COTAREG si vous programmez une grossesse ou si vous souffrez d'une destruction de la bile (cirrhose bilaire) ou si vous souffrez d'un diabète de type 2, si vous souffrez d'un diabète rénale, si vous prenez des médicaments contre la pression artérielle ou de la quantité d'eau dans le corps héréditaire. Si vous souffrez d'insomnie, COTAREG peut provoquer des crises de panique ou des crises de tension artérielle.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique
P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.

6 118001 090280

ement l'intégralité de cette n
e, vous pourriez avoir besoin de
es questions, demandez plus d

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être utile.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.



CARDIO

100 mg, comprimé

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg?
2. Quelles sont les informations nécessaires pour prendre ce médicament?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg?
4. Quels sont les effets indésirables possibles?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg?
6. Informations pratiques.

1. QU'EST-CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG?

CardioAspirine 100 mg est un médicament

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique
P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.

6 118001 090280

ement l'intégralité de cette n
e, vous pourriez avoir besoin de
es questions, demandez plus d

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être utile.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.



CARDIO

100 mg, comprimé

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg?
2. Quelles sont les informations nécessaires pour prendre ce médicament?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg?
4. Quels sont les effets indésirables possibles?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg?
6. Informations pratiques.

1. QU'EST-CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG?

CardioAspirine 100 mg est un médicament

Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Paracétamol

Phosphate de codeine hémihydrate

(Quantité correspondant à codeine base)

Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.

PPV: 22 H20

PER: 03/25

LOT: M1024

sécable

400,00 mg

20,00 mg

15,62 mg

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux central)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitements chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeine,
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les patients âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison de dépendance.

PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A PHARMACIEN.

Il contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).