

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° P19- 0044201

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10452 Société : RAM
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : EL AMRAOUI SETY
Date de naissance : 26/07/1981
Adresse :
Tél. : Total des frais engagés : 1022,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 04 MARS 2024
Nom et prénom du malade : EL AMRAOUI SETY Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : HTA chronique
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 27/03/2024
Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04 MARS 2024			300	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL LOUADI Mme. BEN ELLOUADI NEAM 513, Bd. Oued Tensif El Oued Casablanca - Tél: 03 22 50 21 51	4/03/24	22240

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de tra

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coef




O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

148,00



148,00



148,00



FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

Docteur Jamal SIBAÏ

CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Paris

Horaires d'ouverture :
du Lundi au Jeudi 9h à 15h
Samedi du 9h à 11h

Fermé le vendredi, Samedi après-midi et le dimanche

الدكتور جمال السباعي

إختصاصي في أمراض القلب والشرابين

خريج كلية الطب بباريس

أوقات العمل من الإثنين إلى الخميس من 9 إلى 15
والسبت من 9 إلى 11
العيادة مغلقة يوم الجمعة والسبت بعد الزوال والأحد

N° d'identification du praticien : 091129718

Casablanca, le

04 MARS 2024

في الدار البيضاء ،

REGIME SANS SEL

148,73 Co-Vartex 80, 1/20, 14/1

TRAITEMENT DE 3 MOIS

988,0 Omepal 20, 14/1

TRAITEMENT DE 3 MOIS

72240

Dr. J. SIBAÏ

CARDIOLOGUE

Angle 38 - Bd. Lalla Yacout et
1, Rue El Araâr - Casablanca
Tél.: 05 22 48 75 79 - 05 22 48 78 90

Omepral® promopharm 20 mg

Boîtes de 7, 14 ou 28 gélules

Oméprazole

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1 - DENOMINATION DU MEDICAMENT :

Omepral promopharm 20 mg. Boîtes de 7, 14 et 28 gélules.

Oméprazole

2 - COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Oméprazole (DCI) 20 mg

Excipients :

Sphères de sucre (Saccharose, amidon de maïs), laurylsulfate de sodium (sol. 2.5%), phosphate disodique anhydre, mannitol (E421), hypromellose (E464), macrogol 6000, talc (E553b), polysorbate 80 (E433), dioxyde de titane (E171), copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (Eudragit® L30-D55).

Liste des excipients à effet notoire :

Omepral promopharm 20 mg, gélule contient du saccharose.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3 - CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Code ATC: A02BC01

Omepral promopharm 20 mg, gélule contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4 - INDICATIONS :

Omepral promopharm 20 mg, gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Omepral promopharm 20 mg, gélule peut aussi être utilisé chez les personnes âgées et chez ceux-ci si vous avez des problèmes de santé.
- Un excès d'acide dans l'estomac.

Chez les enfants :

Enfants âgés de 12 ans et plus :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- Les brûlures.

Enfants âgés de 6 à 11 ans :

- Les symptômes du RGO.

Enfants âgés de 2 à 5 ans :

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*.

Enfants âgés de 1 à 2 ans :

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*.

5 - POSOLOGIE :

Les doses habituelles :

Adultes :

Traitement des symptômes de reflux gastro-œsophagien :

- Si votre médecin recommande une dose de 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous recommander une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si

- La dose recommandée une fois que votre médecin vous l'a prescrite.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé par l'acidité.

Traitement des ulcères dans la partie haute de l'estomac :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.
- Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, votre médecin peut vous recommander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.
- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, votre médecin peut vous recommander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.

Prévention de la récurrence de l'ulcère duodénal :

- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement de l'ulcère duodénal et gastrique (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères du duodénum et de l'estomac :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg par jour.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Omepral® promopharm 20 mg

Boîtes de 7, 14 ou 28 gélules

Oméprazole

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1 - DENOMINATION DU MEDICAMENT :

Omepral promopharm 20 mg. Boîtes de 7, 14 et 28 gélules.

Oméprazole

2 - COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Oméprazole (DCI) 20 mg

Excipients :

Sphères de sucre (Saccharose, amidon de maïs), laurylsulfate de sodium (sol. 2.5%), phosphate disodique anhydre, mannitol (E421), hypromellose (E464), macrogol 6000, talc (E553b), polysorbate 80 (E433), dioxyde de titane (E171), copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (Eudragit® L30-D55).

Liste des excipients à effet notoire :

Omepral promopharm 20 mg, gélule contient du saccharose.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3 - CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Code ATC: A02BC01

Omepral promopharm 20 mg, gélule contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4 - INDICATIONS :

Omepral promopharm 20 mg, gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Omepral promopharm 20 mg, gélule peut aussi être utilisé chez les personnes âgées et chez ceux-ci si vous avez des problèmes de reflux.
- Un excès d'acide dans l'estomac.

Chez les enfants :

Enfants âgés de 12 ans et plus :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- Les brûlures.

Enfants âgés de 6 à 11 ans :

- Les symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO).

Enfants âgés de 3 à 5 ans :

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*.

Enfants âgés de 1 à 2 ans :

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*.

5 - POSOLOGIE :

Les doses habituelles sont :

Adultes :

Traitement des symptômes de reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Si votre médecin vous recommande une dose de 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous recommander une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si

- La dose recommandée une fois que votre reflux gastro-œsophagien (RGO) est guéri.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé par le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Traitement des ulcères dans la partie haute de l'estomac :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.
- Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, votre médecin peut vous recommander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.
- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, votre médecin peut vous recommander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.

Prévention de la récurrence de l'ulcère duodénal :

- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement de l'ulcère duodénal et gastrique (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg par jour.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant moins de 30 kg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant moins de 30 kg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant moins de 30 kg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant moins de 30 kg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant moins de 30 kg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant moins de 30 kg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant moins de 30 kg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant moins de 30 kg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 1 semaine.

Omepral® promopharm 20 mg

Boîtes de 7, 14 ou 28 gélules

Oméprazole

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1 - DENOMINATION DU MEDICAMENT :

Omepral promopharm 20 mg. Boîtes de 7, 14 et 28 gélules.

Oméprazole

2 - COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Oméprazole (DCI) 20 mg

Excipients :

Sphères de sucre (Saccharose, amidon de maïs), laurylsulfate de sodium (sol. 2.5%), phosphate disodique anhydre, mannitol (E421), hypromellose (E464), macrogol 6000, talc (E553b), polysorbate 80 (E433), dioxyde de titane (E171), copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (Eudragit® L30-D55).

Liste des excipients à effet notoire :

Omepral promopharm 20 mg, gélule contient du saccharose.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3 - CLASSE PHARMACO THERAPEUTIQUE :

Code ATC: A02BC01

Omepral promopharm 20 mg, gélule contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4 - INDICATIONS :

Omepral promopharm 20 mg, gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Omepral promopharm 20 mg, gélule peut aussi être utilisé chez les personnes âgées et chez ceux-ci si vous avez des problèmes de santé.
- Un excès d'acide dans l'estomac.

Chez les enfants :

Enfants âgés de 12 ans et plus :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- Les brûlures.

Enfants âgés de 6 à 11 ans :

- Les brûlures.

Enfants âgés de 2 à 5 ans :

- Les brûlures.

Enfants âgés de 1 à 5 ans :

- Les brûlures.

Enfants âgés de 6 mois à 1 an :

- Les brûlures.

5 - POSOLOGIE :

Les doses habituelles :

Adultes :

Traitement des symptômes de reflux gastro-œsophagien :

- Si votre médecin recommande une dose de 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous recommander une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore guéri.

- La dose recommandée une fois que votre œsophage est guéri.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose recommandée est de 20 mg par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de l'estomac :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.
- Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, la dose recommandée est de 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre des médicaments supplémentaires si votre ulcère n'a pas été guéri.
- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose recommandée est de 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

Prévention de la récurrence de l'ulcère duodénal :

- La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement de l'ulcère duodénal et gastrique (anti-inflammatoires non stéroïdiens) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg par jour.

- Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

Enfants et adolescents :

- La dose recommandée est de 20 mg de Omepral promopharm 20 mg, gélule une fois par jour pendant une semaine.

Votre médecin va vous prescrire en même temps la claritromycine et le métronidazole.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg par jour.

- Votre médecin peut ajuster la dose en fonction de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien :

- Les enfants âgés de plus de 1 an et pesant plus de 20 kg.

Omepral promopharm 20 mg. La posologie dépend de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères duodénal et gastrique :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.

Enfants et adolescents :

- Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule.

La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la durée pendant laquelle vous prenez le médicament.

- Votre médecin prescrira à votre enfant de prendre Omepral promopharm 20 mg, gélule et la claritromycine.