

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-0015007

199796

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : *KSSI BA EL HABIB*

Date de naissance : *1963*

Adresse : *Berrechid*

Tél. : *06 22 45 88 86* Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : *09/03/2024*

Nom et prénom du malade : *Montaz El khairi*, Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : *Catopatine*

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *Bene clinic*

Le : *09/03/2024*

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin autorisant le Paiement des Actes
09.03.24	CS		200,00	 Sarah BELGAIDA Médecin en Gynécologie Tél: 0622306888 INPE: 0611111111

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>Pharmacie NABROLAH BERRECHID ot. Nabrolah N°327 - Berrechid Tél: 05 22 51 67 19</p>	09/03/2024	21590

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX




Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Médecine Générale

- Diplôme universitaire en échographie
- Diplôme universitaire de Gynécologie suivi de grossesse et infertilité de l'université de bordeaux - France
- Electrocardiogramme
- Visite pour permis de conduire



الطب العام

- دبلوم الفحص بالصدى
- دبلوم أمراض النساء، تتبع الحمل والعمق من جامعة بوردو - فرنسا
- التخطيط الكهربائي للقلب
- فحص رخصة السيادة

Ordonnance

Berrechid le : 09/03/26

Mortazia El kelbissin

41^o

- Spasfon injectable

unij IM x 3 UJ

92^o
- Clopram injectable

98,8^o
- Neoflast

36,9^o

- Calibronat

20 شارع محمد الخامس خريطة نصر الله قرب محطة المدينة (فوق BMCE بناء)
20, Bd Mohamed V Lotissement Naser Allah (en dessus de BMCE Bank) - Berrechid
Tél.: 05 22 33 68 30



الهاتف : 05 22 33 68 30

158^o
- Doliprane 1P
14px

Pharmacie NASROLLAH
BERRECHID
ot. Nasrollah N°327 - Berrechid
Tel.: 05 22 51 67 19

Pharmacie NASROLLAH
BERRECHID
ot. Nasrollah N°327 - Berrechid
Tel.: 05 22 51 67 19

Sucre medical
Pharmacie NASROLLAH
BERRECHID
ot. Nasrollah N°327 - Berrechid
Tel.: 05 22 51 67 19

Dr. BELCAIDA,
Sarah
Nasrollah
Tel.: 05 22 33 68 30
INPE: 06 11 92 33 21

SV

Spasfon®

phloroglucinol/ triméthylphloroglucinol

Spasfon® solution in.

LOT 209435
EXP 10/2024

ZENITH Pharma
AMM N° 13/17 DMP/21/NRQ


6 11800 127115

PPV : 41,90 DH

079101501

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament important pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autrui.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Voir rubrique 4.

Quel contenu cette notice?

1. Qu'est-ce que SPASFON®, solution injectable et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SPASFON®, solution injectable?
3. Comment utiliser SPASFON®, solution injectable?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver SPASFON®, solution injectable?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QUEST-CE QUE SPASFON®, solution injectable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?

Classe pharmacothérapeutique: ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE - code ATC: A03AX12

(A: appareil digestif et métabolisme) (G: système génito-urinaire)

SPASFON® appartient à une classe de médicaments appelés antispasmodiques. Il agit contre les spasmes (contractions). Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SPASFON®, solution injectable?

N'utilisez jamais Spasfon®, solution injectable:

- si vous êtes allergique au phloroglucinol, au triméthylphloroglucinol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre



UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSÉ OU DE LA LALITÉMENT, DE TOUJOURS DEMANDER LAVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE

grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ou au cours de la grossesse.

GROSSESSÉ - ALLAITEMENT

SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

AFIN D'EVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSieurs MÉDICAMENTS, d'accide unique ou de courte durée ou de long.

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux

INTERACTIONS MÉDICATIONS ET AUTRES INTERACTIONS

VOTRE PHARMACIEN.

EN CAS DE DOULEUR, NE PAS HESITER A DEMANDER LAVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE PREScrire de solutin : 408 mg par comprimé.

En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la quantité de prendre du paracétamol.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'aviser de votre médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre Pharmacologie).

En cas de surdosage ou de prise pour erreur d'une dose trop élevée, consulter immédiatement votre médecin.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

EN CAS DE DOULEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER LAVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- maladie grave du foie.

- allergie connue au paracétamol.

Le médicament NE DOIT PAS ÊTRE MUSÉ dans les cas suivants :

DANS QUELS CAS PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

AMM N°746/15 DMP/21/NR0

6 118000 040354



16 comprimés effervescents

Paracétamol - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Compresse effervescent - AMNATRIETIQUE (N, Système nerveux central)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

CE médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de maladie grave du paracétamol.

CE médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de maladie grave du paracétamol.

Effets secondaires : acidité citrique, magnétite, saccharine sodia,

Excipients : bicarbonate de sodium, carbonata de sodium, bicarbonate de sodium, magnétite, saccharine sodia,

Paracétamol : bicarbonate de sodium, magnétite, saccharine sodia,

FORME PHARMACEUTIQUE

Paracétamol

500 mg

DO COMPOSITION

500 mg

Calcibronat® 2g

Comprimés effervescents
Bromo-galactogluconate de calcium

COMPOSITION

Un comprimé renferme 2 g de bromo-gé

Excipients : saccharose, bicarbonate de

FORME PHARMACEUTIQUE

Boîte de 20 comprimés effervescents.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

HYPNOTIQUE ET SÉDATIF.

(N: Système nerveux central).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans les tro

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament
dans les cas suivants :

- enfant de moins de 30 mois,
- sujet âgé dénutri et/ou déshydraté,
- hypercalcémie (quantité excessive de calcium dans le sang),
- lithiasie calcique (calcul de calcium),
- hypercalciurie (quantité excessive de calcium dans les urines),
- calcifications (dépôts de calcium) dans les reins,
- néphropathie glomérulaire chronique (maladie des reins),
- en raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucraseisomaltase.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

En cas de survenue de trouble neuropsychique (voir Effets indésirables), de rougeur ou démangeaisons de la peau, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

Précautions d'emploi

L'absorption d'alcool est fortement déconseillée pendant le traitement.

En cas de régime pauvre en sel, tenir compte de l'apport en sodium par comprimé : 241 mg. Chaque comprimé apporte environ 3 g de sucre. En tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Une interférence est possible avec le dosage des chlorures dans le sang.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN VOTRE PHARMACIEN.



PPV 36DH20
EXP 04/2026
LOT 200127

**Calcibronat®
2 g**

NEOFORTAN®

(phloroglucinol dihydraté)

FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATION **NEOFORTAN® 160 mg**

- Comprimés effervescents dosés à 80 mg
- Comprimés effervescents dosés à 160 mg
- Suppositoires dosés à 150 mg

COMPOSITION QUALITATIVE

- Comprimé effervescent à 80 mg

Phloroglucinol dihydraté

- Comprimé effervescent à 160 mg

Phloroglucinol dihydraté

Excipient : acide citrique, bicarbonate de sodium qsp 1 comprimé effervescent

- Suppositoire à 150 mg

Phloroglucinol dihydraté

Excipient : triméthyl phloroglucinol, silicium thérapeutiques qsp 1 suppositoire .

PPV 98DH80

EXP 03/2026

LOT 33022 2



6 118000 031697

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

NEOFORTAN® est préconisé dans :

- Le traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires (dyskinésie biliaire, colite spasmodique), colique hépatique
- Le traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques
- Le traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie (dysménorrhée)
- Le traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas suivant :

- Hypersensibilité au phloroglucinol.

EN CAS DE DOUCEUR IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

L'association de phloroglucinol avec les antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, ET NOTAMMENT les antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

Les études réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène du phloroglucinol. En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu.

En clinique, l'utilisation relativement répandue du phloroglucinol n'a apparemment révélé aucun risque malformatif à ce jour.

Toutefois, l'utilisation du phloroglucinol ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

CLOPRAME® (Métoclopramide)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- CLOPRAME®, solution injectable, boîtes de 4 et 10 ampoules de 10 mg/2 ml (Métoclopramide).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables décrits devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable ?

3. Comment prendre CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable ?

4. Quels sont les effets indésirables possibles ?

5. Comment conserver CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable ?

6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE CLOPRAME® 10 MG/2 ML SOLUTION INJECTABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable est un antispasmodique. Il contient un médicament appelé "métoclopramide". Il agit sur une partie du cerveau pour prévenir les nausées ou les vomissements.

- Indications thérapeutiques

CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable est utilisé chez les adultes dans : la prévention des nausées et vomissements retardés pouvant survenir après une opération.

- le traitement des nausées et vomissements incluant les nausées et vomissements pouvant survenir en cas de migraine.

- la prévention des nausées et vomissements induits par la radiothérapie.

2. Population pédiatrique :

CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable est utilisé chez les enfants (âgés de 1 à 18 ans) seulement si un autre traitement est inefficace ou ne peut être utilisé, dans :

- la prévention des nausées et vomissements retardés pouvant survenir après une chimiothérapie.

- le traitement des nausées et vomissements survenant après une opération.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CLOPRAME® 10 MG/2 ML SOLUTION INJECTABLE ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

- Ne prenez jamais CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable

(Contre-indications)

Ne prenez pas CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable si :

- vous êtes allergique au métoclopramide ou à l'un des composants de ce médicament.

- vous avez une hémorragie, une obstruction ou une perforation dans l'estomac ou de l'intestin.

- vous avez ou pouvez avoir une tumeur rare de la glande surrenale, située près du rein (pheochromocytome).

- vous avez eu des mouvements musculaires anormaux (dyskinésie tardive), à l'occasion d'un traitement médicamenteux.

- vous êtes diabétique

- vous avez la maladie de Parkinson

- vous prenez de la tétracycline (médicament pour la maladie de Parkinson) ou des agonistes dopaminergiques

- vous avez déjà eu dans le sang des quantités anormales d'un pigment sanguin (héthémoglobinémie) ou un déficit en NADH cytochrome-b5

- vous ne prenez pas CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable à un enfant âgé de moins de 1 an.

Ne prenez pas CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable dans les cas mentionnés ci-dessus. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable.

- Faites attention avec CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Demandez à l'un de vos médecins ou pharmacien avant de prendre CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable si :

- vous avez des antécédents de battements du cœur anormaux (allongement de l'intervalle QT) ou tout autre problème cardiaque,

- vous avez des anomalies dans votre assise du lit
- vous prenez rythme cardiaque
- vous avez
- peut être diabète



PPU 22DH30 EXP 06/2026
LOT 33051 6



Sans objet

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines Vous pouvez vous sentir somnolent, avoir des sensations vertigineuses ou avoir des mouvements saccadiques anormaux et une contracture générale causant une déformation de votre corps alors avoir pris CLOPRAME® 10 mg/2 ml solution injectable. Cela peut affecter votre vue et votre capacité à conduire des véhicules et utiliser des machines.

- Effets à effet notoire

sodium (7,15 mg/amp de 2 ml)

3. COMMENT PRENDRE CLOPRAME® 10 MG/2 ML SOLUTION INJECTABLE ?

- Instruction pour un bon usage

Sans objet

- Posologie, mode et/ou voie(s) d'administration, fréquence d'administration, et durée du traitement

Ce médicament vous sera administré par un médecin. Il sera administré en injection lente dans une veine (au moins 3 minutes) ou