

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11975 Société :

**Actif**

**Pensionné(e)**

**Autre :**

Nom & Prénom : BENTABIB

195300

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0661.16.12.38 Total des frais engagés :

6775,50 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 08/02/24

Nom et prénom du malade : BENTABIB NISRINE Age :

Lien de parenté :

**Lui-même**

**Conjoint**

**Enfant**

Nature de la maladie :

**Affection**

**Pathologie**

neurologique


Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare également ma connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Le : ..... / ..... / .....



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
8/19/2020	Cas 002		Constant	Dr. ADL

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE D'ABDERRAHMANE BOUAZI Dar Bouazza Ouled Aissa BP 43 Dar Bouazza Tél. 02 22 43 43 43</i>	08/02/24	775.50

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	8/2/24	Electro Neuro. Myogramme E.I. G.	1000 DHS

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
<b>GRARI Samia</b> Kinésithérapeute 14, Rue El Moudira Val Fleuri Tél.: 08 22 25 50 24 - Casablanca	6/3/26	27	3m 29s		27	xd 17000

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
<b>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</b>	<b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b>			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATÉ DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Cabinet de Neurologie

Dr Adil ARAQI-HOUSSAINI

Neurologue

Electro-encéphalogramme ( EEG )

Vidéo EEG

Electro-Neuro-Myogramme ( EMG )

الدار البيضاء

Résidence Infitah – Angle Brahim Roudani et Nahass Nahoui (Ex Pelvoux) 2<sup>ème</sup> étage- Maarif- Casablanca

Tel/Fax : 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 – WhatsApp : 06 23 819 721

Email : adilaraqi@hotmail.com Site web : www.neurologue.ma



# عيادة أمراض الدماغ والأعصاب

د. عادل العراقي الحسيني

اختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب

التحفيظ الكهربائي للدماغ ( الشبكيه )

التحفيظ الكهربائي للأعصاب والمعتقدات

اقامة الافتتاح

زاوية براهيم الروداني

أقامه الانفتاح

زاوية براهيم الروداني

casablanca le : 08/02/2024

BENTALEB NIRINE

*3x/149.50*

- DULOPHI 30 mg  
1 Gélule, midi, pendant 3 mois



*2x/109.10*

- GAPREX 25 mg  
2 GELULES LE SOIR 1 MOIS ENSUITE 1 GELULE LE SOIR 1 MOIS ENSUITE 1 GELULE 1 JOUR SUR 2 PENDANT 1 MOIS PUIS ARRET

*122.80*

- Esac 40 mg  
1 gélule PAR JOUR 14 JOURS

*775.50*

Dr. ADIL ARAQI HOUSSAINI  
Neurologue EEG - EMG  
Résidence Infitah, Angle Brahim Roudani  
et Nahass Nahoui, 2e étage Maarif Casablanca  
Tél: 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - WhatsApp: 06 23 819 721



PHARMACIE DAB BOUAZZA  
ZAHZOUHI AMINA  
Dar Bouazza Ouled Jerrar  
BP.93 Dar Bouazza  
Tel: 05 22 79 01 74

# 30 برشامات مقاومة للعصارة المعدية

Pharmaceutical Institute  
R.S. 203 OUM AZZA Région Rabat  
LOT :013  
PER : OCT 2025  
PPV :149 DH 50

## Information de l'utilisateur

### DULOPHI® 20mg, 30mg et 60mg

(Duloxetine chlorhydrate)

Boîtes de 30 Gélules gastro résistantes



#### avant de prendre ce médicament.

demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
ne donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.  
marquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Qu'est-ce que DULOPHI® ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DULOPHI® ?
- Comment prendre DULOPHI® ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver DULOPHI® ?
- Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE DULOPHI® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**Classe pharmacothérapeutique** - antidépresseurs, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. code ATC : N06AX21.

#### Indications thérapeutiques :

DULOPHI® est indiqué chez l'adulte pour :

- Traitement du trouble dépressif majeur.
- Traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique.
- Traitement du trouble anxiete généralisée.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DULOPHI®?

Ne prenez jamais DULOPHI® en cas de :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients de ce médicament.
- Association aux inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) non sélectifs, irréversibles.
- Maladie hépatique entraînant une insuffisance hépatique.
- Association à la fluvoxamine, à la ciprofloxacine ou à l'énoxacine (inhibiteurs puissants du CYP1A2), associations entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques de duloxétine.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

L'instauration du traitement par DULOPHI® est contre-indiquée chez les patients présentant une hypertension artérielle non équilibrée qui pourrait les exposer à un risque potentiel de crise hypertensive.

#### Faites attention avec DULOPHI®:

Épisodes maniaques et convulsions :

DULOPHI® doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant un antécédent d'épisode maniaque ou un diagnostic de trouble bipolaire et/ou des convulsions.

#### Mydriase :

Des cas de mydriase ayant été rapportés avec la duloxétine, DULOPHI® doit être prescrit avec prudence chez les patients présentant une pression intra-oculaire élevée ou un risque de glaucome aigu à angle fermé.

#### Pression artérielle et fréquence cardiaque :

La duloxétine a été associée à une hypertension artérielle cliniquement significative chez certains patients. Ceci peut être dû à l'effet noradrénnergique de la duloxétine. Par conséquent, chez les patients présentant une hypertension artérielle et/ou une cardiopathie, une surveillance de la pression artérielle est recommandée, particulièrement pendant le premier mois de traitement.

#### Insuffisance rénale :

Les concentrations plasmatiques de duloxétine augmentent chez les patients dialysés pour insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

#### Utilisation en association avec d'autres antidépresseurs :

La prudence s'impose en cas d'utilisation de DULOPHI® en association avec d'autres antidépresseurs. En particulier, l'association avec les IMAO sélectifs réversibles est déconseillée.

#### Millepertuis :

Lors de la prise concomitante de DULOPHI® avec des préparations à base de plantes contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*), les effets indésirables peuvent être plus fréquents.

#### Trouble dépressif majeur et trouble bipolaire

Ces patients doivent être suivis soigneusement jusqu'à obtention d'une amélioration clinique et jusqu'à ce que le risque de récidive soit évalué.

3. C

Veill

P

La

Pa

La

Pop

Suje

Auci

posoi

Insuf

DULC

Insuf

Aucun

une in

Arrêt d

L'arrêt b

Mode d

Voie ora

Si vous

Contact

d'autres i

Si vous c

Si vous av

prenez pa

Si vous ar

N'arrêtez p

vement la

4. QUELS S

Comme tou

disparaiss

lent

# 30 برشامات مقاومة للعصارة المعدية

Pharmaceutical Institute  
R.S. 203 OUM AZZA Région Rabat  
LOT :013  
PER : OCT 2025  
PPV :149 DH 50

## Information de l'utilisateur

### DULOPHI® 20mg, 30mg et 60mg

(Duloxetine chlorhydrate)

Boîtes de 30 Gélules gastro résistantes



#### avant de prendre ce médicament.

demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.  
marquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Qu'est-ce que DULOPHI® ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DULOPHI® ?
- Comment prendre DULOPHI® ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver DULOPHI® ?
- Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE DULOPHI® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**Classe pharmacothérapeutique** - antidépresseurs, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. code ATC : N06AX21.

#### Indications thérapeutiques :

DULOPHI® est indiqué chez l'adulte pour :

- Traitement du trouble dépressif majeur.
- Traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique.
- Traitement du trouble anxiete généralisée.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DULOPHI®?

Ne prenez jamais DULOPHI® en cas de :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients de ce médicament.
- Association aux inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) non sélectifs, irréversibles.
- Maladie hépatique entraînant une insuffisance hépatique.
- Association à la fluvoxamine, à la ciprofloxacine ou à l'énoxacine (inhibiteurs puissants du CYP1A2), associations entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques de duloxétine.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

L'instauration du traitement par DULOPHI® est contre-indiquée chez les patients présentant une hypertension artérielle non équilibrée qui pourrait les exposer à un risque potentiel de crise hypertensive.

#### Faites attention avec DULOPHI®:

Épisodes maniaques et convulsions :

DULOPHI® doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant un antécédent d'épisode maniaque ou un diagnostic de trouble bipolaire et/ou des convulsions.

#### Mydriase :

Des cas de mydriase ayant été rapportés avec la duloxétine, DULOPHI® doit être prescrit avec prudence chez les patients présentant une pression intra-oculaire élevée ou un risque de glaucome aigu à angle fermé.

#### Pression artérielle et fréquence cardiaque :

La duloxétine a été associée à une hypertension artérielle cliniquement significative chez certains patients. Ceci peut être dû à l'effet noradrénnergique de la duloxétine. Par conséquent, chez les patients présentant une hypertension artérielle et/ou une cardiopathie, une surveillance de la pression artérielle est recommandée, particulièrement pendant le premier mois de traitement.

#### Insuffisance rénale :

Les concentrations plasmatiques de duloxétine augmentent chez les patients dialysés pour insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

#### Utilisation en association avec d'autres antidépresseurs :

La prudence s'impose en cas d'utilisation de DULOPHI® en association avec d'autres antidépresseurs. En particulier, l'association avec les IMAO sélectifs réversibles est déconseillée.

#### Millepertuis :

Lors de la prise concomitante de DULOPHI® avec des préparations à base de plantes contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*), les effets indésirables peuvent être plus fréquents.

#### Trouble dépressif majeur et trouble bipolaire

Les patients doivent être suivis soigneusement jusqu'à obtention d'une amélioration clinique et jusqu'à ce que le risque de récidive soit évalué.

3. C  
Veill  
P

La  
La  
Pop  
La d  
Pop  
Suje  
Auct  
posoi  
Insuf  
DULC  
Insuf  
Aucun  
une in  
Arrêt d  
L'arrêt b  
Mode d  
Voie ora  
Si vous  
Contact  
d'autres i  
Si vous c  
Si vous av  
prenez pa  
Si vous ar  
N'arrêtez P  
vement la

#### 4. QUELS S

Comme tou  
disparaiss  
fectu

# 30 برشامات مقاومة للعصارة المعدية

Pharmaceutical Institute  
R.S. 203 OUM AZZA Région Rabat  
LOT :013  
PER : OCT 2025  
PPV :149 DH 50

## Information de l'utilisateur

### DULOPHI® 20mg, 30mg et 60mg

(Duloxetine chlorhydrate)

Boîtes de 30 Gélules gastro résistantes



#### avant de prendre ce médicament.

demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.  
marquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Qu'est-ce que DULOPHI® ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DULOPHI® ?
- Comment prendre DULOPHI® ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver DULOPHI® ?
- Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE DULOPHI® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**Classe pharmacothérapeutique** - antidépresseurs, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. code ATC : N06AX21.

#### Indications thérapeutiques :

DULOPHI® est indiqué chez l'adulte pour :

- Traitement du trouble dépressif majeur.
- Traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique.
- Traitement du trouble anxiete généralisée.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DULOPHI®?

Ne prenez jamais DULOPHI® en cas de :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients de ce médicament.
- Association aux inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) non sélectifs, irréversibles.
- Maladie hépatique entraînant une insuffisance hépatique.
- Association à la fluvoxamine, à la ciprofloxacine ou à l'énoxacine (inhibiteurs puissants du CYP1A2), associations entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques de duloxétine.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

L'instauration du traitement par DULOPHI® est contre-indiquée chez les patients présentant une hypertension artérielle non équilibrée qui pourrait les exposer à un risque potentiel de crise hypertensive.

#### Faites attention avec DULOPHI®:

Épisodes maniaques et convulsions :

DULOPHI® doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant un antécédent d'épisode maniaque ou un diagnostic de trouble bipolaire et/ou des convulsions.

#### Mydriase :

Des cas de mydriase ayant été rapportés avec la duloxétine, DULOPHI® doit être prescrit avec prudence chez les patients présentant une pression intra-oculaire élevée ou un risque de glaucome aigu à angle fermé.

#### Pression artérielle et fréquence cardiaque :

La duloxétine a été associée à une hypertension artérielle cliniquement significative chez certains patients. Ceci peut être dû à l'effet noradrénnergique de la duloxétine. Par conséquent, chez les patients présentant une hypertension artérielle et/ou une cardiopathie, une surveillance de la pression artérielle est recommandée, particulièrement pendant le premier mois de traitement.

#### Insuffisance rénale :

Les concentrations plasmatiques de duloxétine augmentent chez les patients dialysés pour insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

#### Utilisation en association avec d'autres antidépresseurs :

La prudence s'impose en cas d'utilisation de DULOPHI® en association avec d'autres antidépresseurs. En particulier, l'association avec les IMAO sélectifs réversibles est déconseillée.

#### Millepertuis :

Lors de la prise concomitante de DULOPHI® avec des préparations à base de plantes contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*), les effets indésirables peuvent être plus fréquents.

#### Trouble dépressif majeur et trouble bipolaire

Les patients doivent être suivis soigneusement jusqu'à obtention d'une amélioration clinique et jusqu'à ce que le risque de récidive soit jugé acceptable.

3. C  
Veill  
P

La  
La  
Pop  
La d  
Pop  
Suje  
Auct  
posoi  
Insuf  
DULC  
Insuf  
Aucun  
une in  
Arrêt d  
L'arrêt b  
Mode d  
Voie ora  
Si vous  
Contact  
d'autres i  
Si vous c  
Si vous av  
prenez pa  
Si vous ar  
N'arrêtez P  
vement la

#### 4. QUELS S

Comme tou  
disparaiss  
fectu



## Information de l'utilisateur

### DULOPHI® 20mg, 30mg et 60mg

(Duloxetine chlorhydrate)

Boîtes de 30 Gélules gastro résistantes



#### Avant de prendre ce médicament.

Lire.

Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

N'allez pas le donner jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si vous avez des effets indésirables, marquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DULOPHI® ?

3. Comment prendre DULOPHI® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DULOPHI® ?
6. Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE DULOPHI® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**Classe pharmacothérapeutique** - antidépresseurs, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. code ATC : N06AX21.

#### Indications thérapeutiques :

DULOPHI® est indiqué chez l'adulte pour :

- Traitement du trouble dépressif majeur.
- Traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique.
- Traitement du trouble anxie généralisée.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DULOPHI®?

##### Ne prenez jamais DULOPHI® en cas de :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients de ce médicament.
- Association aux inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) non sélectifs, irréversibles.
- Maladie hépatique entraînant une insuffisance hépatique.
- Association à la fluvoxamine, à la ciprofloxacine ou à l'énoxacine (inhibiteurs puissants du CYP1A2), associations entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques de duloxétine.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

L'instauration du traitement par DULOPHI® est contre-indiquée chez les patients présentant une hypertension artérielle non équilibrée qui pourrait les exposer à un risque potentiel de crise hypertensive.

##### Faites attention avec DULOPHI® :

##### Épisodes maniaques et convulsions :

DULOPHI® doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant un antécédent d'épisode maniaque ou un diagnostic de trouble bipolaire et/ou des convulsions.

##### Mydriase :

Des cas de mydriase ayant été rapportés avec la duloxétine, DULOPHI® doit être prescrit avec prudence chez les patients présentant une pression intra-oculaire élevée ou un risque de glaucome.

##### Pression artérielle et fréquence cardiaque :

La duloxétine a été associée à une hypertension artérielle cliniquement significative chez certains patients. Ceci peut être dû à l'effet noradrénérégique de la duloxétine. Par conséquent, chez les patients présentant une hypertension artérielle et/ou une cardiopathie, une surveillance de la pression artérielle est recommandée, particulièrement pendant le premier mois de traitement.

##### Insuffisance rénale :

Les concentrations plasmatiques de duloxétine augmentent chez les patients dialysés pour insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).

##### Utilisation en association avec d'autres antidépresseurs :

La prudence s'impose en cas d'utilisation de DULOPHI® en association avec d'autres antidépresseurs. En particulier, l'association avec les IMAO sélectifs réversibles est déconseillée.

##### Millepertuis :

Lors de la prise concomitante de DULOPHI® avec des préparations à base de plantes contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*), les effets indésirables peuvent être plus fréquents.

##### Suicide :

##### Trouble dépressif majeur et trouble anxie généralisée :

Le risque pour ne pas améliorer, avant plusieurs semaines de traitement, les patients devront être surveillés étroitement jusqu'à obtention de cette amélioration. L'expéri-

# ESAC® 40 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre.

122,80

1725

FAT 122DH80

diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

ESAC est utilisé dans :

- Reflux gastro-oesophagien : traitement de l'oesophagite érosive par reflux.
- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

## Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 40 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

## Ne pas utiliser ESAC 40 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC,
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,
- si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH).

## Prendre des précautions particulières avec ESAC 40 mg dans les cas suivants :

- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kôtoconazole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour des troubles de la coagulation sanguine), ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique).
- si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
- si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.
- si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de *Helicobacter pylori* avec ESAC ou si vous prenez ESAC dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.

En cas de traitement à la demande, vous devez informer votre médecin de toutes modifications des symptômes.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

Grossesse

# GA~~A~~REX® 25 mg, 75 mg et 150 mg

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules

Prégabaline

60

Ge de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

avoir besoin de la relire.  
mandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien,  
lement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait  
leur maladie sont identiques aux vôtres.  
grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans  
ou à votre pharmacien.

LOT 2318

EXP 12/2

PPV 102

uels cas est-il utilisé ?  
naître avant de prendre GAPREX® ?

entuels ?

## ANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

apeutique ou le type d'activité:

GAPREX appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte (Code ATC: N03AX16).

### Indications thérapeutiques :

**Douleurs neuropathiques:** GAPREX est indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l'adulte.

**Epilepsie:** GAPREX est indiqué chez l'adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.

**Trouble Anxieux Généralisé :** GAPREX est indiqué dans le traitement du Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GAPREX ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

### Contre-indications :

Ne prenez jamais GAPREX :

Si vous êtes allergique à la prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

### Faites attention avec GAPREX :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre GAPREX.

Quelques patients prenant GAPREX ont fait état de symptômes évocateurs d'une réaction allergique. Il s'agissait d'un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge ainsi que d'un rash cutané diffus. Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez l'une de ces réactions.

GAPREX a été associé à des étourdissements et de la somnolence, pouvant au

blessures accidentelles (chutes) chez les patients âgés. Vous devez par conséquent faire attention

ce que vous soyez habitué aux événements et ne pas faire de choses que vous n'avez pas faites auparavant.

Ce médicament peut faire apparaître des hallucinations, des délusions et des confusions. Si cela vous arrive, ne conduisez pas de véhicule et ne faites pas d'activités qui nécessitent une grande vigilance.

la vue, la plupart desquelles sont temporaires. Si cela vous arrive, ne conduisez pas de véhicule et ne faites pas d'activités qui nécessitent une grande vigilance.

Une adaptation à ce médicament peut prendre plusieurs semaines. Si cela vous arrive, ne conduisez pas de véhicule et ne faites pas d'activités qui nécessitent une grande vigilance.

GAPREX peut être pris  
Interactions avec les  
Les gélules de GAPREX  
La prise simultanée de  
Interactions avec les  
Sans objet.

Utilisation pendant la  
GAPREX ne doit pas  
Les femmes en âge  
ou que vous allaitez  
médecin ou pharmacien  
**Sportifs :**  
Sans objet.

**Effets sur l'aptitude**  
GAPREX peut entraîner  
Vous ne devez ni com-  
lement dangereuses  
telles activités.

**Mentions relatives**  
Sans objet.

**3. COMMENT PRENDRE GAPREX**  
Instruction pour une prise  
Veillez à toujours prendre  
auprès de votre médecin.  
Votre médecin détermine  
Posologie, mode et  
Posologie

**Douleurs neuropathiques :**  
Prenez le nombre de gélules  
La dose habituelle, c'est à dire  
Votre médecin vous prescrira  
prises par jour, prenez-  
chaque jour. En cas de manque, prenez  
fois le soir, environ 1 heure avant  
Si vous avez l'impression de dormir  
votre pharmacien.  
Si vous êtes un patient diabétique, prenez  
maladie des reins, prenez  
Votre médecin peut vous prescrire  
reins.

**Mode d'administration :**  
Voie orale.  
Avez la gélule dans la main et ouvrez  
la gélule. Remplissez la gélule avec la poudre  
et buvez la poudre avec de l'eau.

# GA~~A~~REX® 25 mg, 75 mg et 150 mg

Boîtes de 10, 30 et 60 gélules

Prégabaline

60

Ge de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

avoir besoin de la relire.  
mandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien,  
lement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait  
leur maladie sont identiques aux vôtres.  
grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans  
ou à votre pharmacien.

LOT 2318

EXP 12/2

PPV 102

uels cas est-il utilisé ?  
naître avant de prendre GAPREX® ?

entuels ?

## ANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

apeutique ou le type d'activité:

GAPREX appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte (Code ATC: N03AX16).

### Indications thérapeutiques :

**Douleurs neuropathiques:** GAPREX est indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l'adulte.

**Epilepsie:** GAPREX est indiqué chez l'adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.

**Trouble Anxieux Généralisé :** GAPREX est indiqué dans le traitement du Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE GAPREX ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

### Contre-indications :

Ne prenez jamais GAPREX :

Si vous êtes allergique à la prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

### Faites attention avec GAPREX :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre GAPREX.

Quelques patients prenant GAPREX ont fait état de symptômes évocateurs d'une réaction allergique. Il s'agissait d'un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge ainsi que d'un rash cutané diffus. Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez l'une de ces réactions.

GAPREX a été associé à des étourdissements et de la somnolence, pouvant au

blessures accidentelles (chutes) chez les patients âgés. Vous devez par conséquent faire attention

ce que vous soyez habitué aux événements et ne pas faire de choses que vous n'avez pas faites auparavant.

Ce médicament peut faire apparaître des hallucinations, des délusions et des confusions. Si cela vous arrive, ne conduisez pas de véhicule et ne faites pas d'activités qui nécessitent une grande vigilance.

la vue, la plupart desquelles sont temporaires. Si cela vous arrive, ne conduisez pas de véhicule et ne faites pas d'activités qui nécessitent une grande vigilance.

Une adaptation à ce médicament peut prendre plusieurs semaines. Si cela vous arrive, ne conduisez pas de véhicule et ne faites pas d'activités qui nécessitent une grande vigilance.

GAPREX peut être pris  
Interactions avec les  
Les gélules de GAPREX  
La prise simultanée de  
Interactions avec les  
Sans objet.

Utilisation pendant la  
GAPREX ne doit pas  
Les femmes en âge  
ou que vous allaitez  
médecin ou pharmacien  
**Sportifs :**  
Sans objet.

**Effets sur l'aptitude**  
GAPREX peut entraîner  
Vous ne devez ni com-  
lement dangereuses  
telles activités.

**Mentions relatives**  
Sans objet.

**3. COMMENT PRENDRE GAPREX**  
Instruction pour une prise  
Veillez à toujours prendre  
auprès de votre médecin.  
Votre médecin détermine  
Posologie, mode et  
Posologie

**Douleurs neuropathiques :**  
Prenez le nombre de gélules  
La dose habituelle, c'est à dire  
Votre médecin vous prescrira  
prises par jour, prenez-  
chaque jour. En cas de manque, prenez  
fois le soir, environ 1 heure avant  
Si vous avez l'impression de dormir  
votre pharmacien.  
Si vous êtes un patient diabétique, prenez  
maladie des reins, prenez  
Votre médecin peut vous prescrire  
reins.

**Mode d'administration :**  
Voie orale.  
Avez la gélule dans la main et ouvrez  
la gélule. Remplissez la gélule avec la poudre  
et buvez la poudre avec de l'eau.

# GRARI SAMIA

## kinésithérapeute

REEDUCATION FONCTIONNELLE  
MOTRICE ET RESPIRATOIRE

14, Rue El Moubarid Rés. Claude Noël  
Val Fleuri  
Tél : 05 22 25 50 24 Casablanca



# غراري سامية

اختصاصية في الطب الجسماي

معالجة كهربائية  
دلاك طبي

14 زنقة المبرد  
اقامة كلود نوبل - قال فلوري  
الهاتف : 05 22 25 50 24 الدار البيضاء

Sur Rendez-Vous

Soins à Domicile

بأطوطع

Casablanca, le ..... 6/3/24 ..... الدار البيضاء في

pon n° Fachie BENTALER - NISRINE

25 sens x 200 = 5000

(Cip - ill dhr)

GRARI Samia  
Kinésithérapeute  
14, Rue El Moubard Val Fleuri  
Tél.: 05 22 25 50 24 - Casablanca

# GRARI SAMIA

## kinésithérapeute

REEDUCATION FONCTIONNELLE  
MOTRICE ET RESPIRATOIRE

14, Rue El Moubardid Rés. Claude Noël  
Val Fleuri  
Tél : 05 22 25 50 24 Casablanca



# ڭراري سامية

اختصاصية في الطب الجسmany

معالجة كهربائية  
دلاك طبي

14 دنقة امبريد  
اقامة كلود نوبل - قفال فلوري  
الهاتف : 05 22 25 50 24 الدار البيضاء

Sur Rendez-Vous

Soins à Domicile

با موعد

Casablanca, le

6/3/24 الدار البيضاء في

Alexis de Saxe Directeur de  
N° 1 SENTACEB - NASSIRINE

17/02/24  
18/02/24  
22/02/24  
23/02/24  
26/02/24  
27/02/24  
28/02/24  
1/03/24  
2/03/24  
3/03/24

05/03/24  
06/03/24  
08/03/24  
09/03/24  
10/03/24  
11/03/24  
12/03/24  
13/03/24  
14/03/24  
15/03/24  
17/03/24

18/03/24  
19/03/24  
20/03/24  
21/03/24  
22/03/24

GRARI Samia  
Kinésithérapeute  
14, Rue El Moudardid Val Fleuri  
Tél.: 05 22 25 50 24 - Casablanca

# Cabinet de Neurologie

Dr Adil ARAQI-HOUSSAINI

Neurologue

Electro-encéphalogramme ( EEG )

Vidéo EEG

Electro-Neuro-Myogramme ( EMG )

الطباق الثاني فوق البنك العقلي والسيahi - المعاري - الدار البيضاء  
Résidence Infitah - Angle Brahim Roudani et Nahass Nahoui (Ex Pelvoux) 2<sup>ème</sup> étage - Maarif- Casablanca

Tel/Fax : 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - Whatsapp : 06 23 819 721

Email : adilaraqi@hotmail.com Site web : www. neurologue.ma



# عيادة أمراض الدماغ والأعصاب

د. عادل العراقي الحسيني

اختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب

المخطيط الكهربائي للدماغ ( الشبكة )

المخطيط الكهربائي للأعصاب والمعقلات

إقامة الإنفاس

زاوية براهيم الروداني

والنحاس النجوي - الطابق الثاني فوق البنك العقلي والسيahi - المعاري - الدار البيضاء



casablanca le : 08/02/2024

BENTALEB NISRINE

**EMG**

Dr. ARAQI-HOUSSAINI ADIL

Dr. ADIL ARAQI HOUSSAINI  
أخصادي في أمراض الدماغ والأعصاب  
Neurologue EEG - EMG  
Résidence Infitah, Angle Brahim Roudani  
et Nahass Nahoui, 2e Etg, Maârif - Casablanca  
Tél: 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - Gsm: 06 23 819 721

# Cabinet de Neurologie

Dr Adil ARAQI-HOUSSAINI

Neurologue

Electro-encéphalogramme ( EEG )

Vidéo EEG

Electro-Neuro-Myogramme ( EMG )


أخصاص في أمراض الدماغ والأعصاب  
التطبيط الكهربائي للعصابات والعصيات

اقامة الانفاس - زاوية براهيم الروداني والناصي التحفيزي - الطابق الثاني فوق البنك العقاري والسيادي - الدار البيضاء

Résidence Infitah - Angle Brahim Roudani et Nahass Nahoui (Ex Pelvoux) 2<sup>ème</sup> étage - Maarif - Casablanca

Tel/Fax : 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - WhatsApp : 06 23 819 721

Email : adilaraqi@hotmail.com Site web : www.neurologue.ma



# عيادة أمراض الدماغ والأعصاب

د. عادل العراقي الحسيني

أخصاص في أمراض الدماغ والأعصاب

التطبيط الكهربائي للعصابات والعصيات

اقامة الانفاس - زاوية براهيم الروداني والناصي التحفيزي



casablanca le : 08/02/2024

BENTALEB NIRINE

## Facture

Acte Honoraire

EMG 1000.00 Dh

Total 1000.00 Dh

Arrêté la présente facture à la somme de :

1000.00 Dirhams

Dr. ARAQI-HOUSSAINI ADIL

د. عادل العراقي الحسيني  
Dr. ADIL ARAQI HOUSSAINI  
أخصاص أمراض الدماغ والأعصاب  
Neurologue EEG EMG  
Résidence Infitah, Angle Brahim Roudani  
et Nahass Nahoui, 2<sup>e</sup> Etg, Maârif - Casablanca  
Tél: 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - Gsm: 06 23 819 721

# Cabinet de Neurologie

Dr Adil ARAQI-HOUSSAINI

Neurologue

Electro-encéphalogramme ( EEG )

Vidéo EEG

Electro-Neuro-Myogramme ( EMG )

الطبخ

الطريق الثاني فوق البنك العقاري والسياحي - المعاريف - الدار البيضاء

Résidence Infitah - Angle Brahim Roudani et Nahass Nahoui (Ex Pelvoux) 2<sup>ème</sup> étage- Maarif- Casablanca

Tel/Fax : 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - Whatsapp : 06 23 819 721

Email : adilaraqi@hotmail.com Site web : www. neurologue.ma



# عيادة أمراض الدماغ والأعصاب

د. عادل العراقي الحسيني

اختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب

الخطيب الخطيب بابى للاعصاب والجعات

اقامة الانفتاح - زاوية براهيم الروانى ( الشبهة )



casablanca le : 08/02/2024

BENTALEB NISRINE

## COMPTE RENDU D'ELECTRO-NEURO-MYOGRAMME (EMG)

Renseignements Cliniques : douleurs neuropathiques, recherche de signe de syndrome du canal tarsien

**ETUDE ELECTROPHYSIOLOGIQUE DE STIMULO DETECTION ET DE DETECTION AUX 4 MEMBRES OBJECTIVE :**

### INTERPRETATION :

- LES PARAMETRES DE REPONSE NERVEUSE MOTRICE ET SENSITIVE SONT NORMAUX par examen des nerfs SPI, SPE, sural, plantaire médial, médian, ulnaire, radial et brachial cutané interne des deux côtés;
- LES LATENCES PROXIMALES SONT NORMALES.
- DETECTION REALISEE DES muscles jambier antérieur, jumeau externe, brachioradial, biceps brachial des deux côtés; Silence au repos, neurogène à l'effort sur les myotomes C ET C6 DES 2 COTES, L5 ET S1 DU COTE DROIT.

### Conclusion :

EXAMEN ENMG en faveur d'une souffrance pluriradiculaire cervicale et lombo-sacrée qui restent globalement légère sur le plan électrophysiologique avec prédominance sur C5 et C6 des deux côtés, et légèrement sur L5 et S1 du côté droit;

Dr ARAQI-HOUSSAINI Adil

د. عادل العراقي الحسيني  
Dr. ADIL ARAQI HOUSSAINI  
اختصاصي أمراض الدماغ والأعصاب  
Neurologus EEG - EMG  
Résidence Infitah, Angle Brahim Roudani  
et Nahass Nahoui, 2e Etg, Maârif - Casablanca  
Tél: 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - Gsm: 06 23 819 721

# Cabinet de Neurologie

Dr Adil ARAQI-HOUSSAINI

Neurologue

Electro-encéphalogramme ( EEG )

Vidéo EEG


Electro-Neuro-Myogramme ( EMG )

الطباطيط الكهربائي للدماغ والاعصاب  
اقامة الافتتاح - زاوية براهيم الروداني و النحاس النحوي - الطابق الثاني فوق المبنك العقاري والملاحي - المعاريف - الدار البيضاء

Résidence Infitah - Angle Brahim Roudani et Nahass Nahoui (Ex Pelvoux) 2<sup>eme</sup> étage- Maarif- Casablanca

Tel/Fax : 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - Whatsapp : 06 23 819 721

Email : adilaraqi@hotmail.com Site web : www. neurologue.ma



# عيادة أمراض الدماغ والأعصاب

د. عادل العراقي الحسيني

اختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب

الطباطيط الكهربائي للدماغ ( الشبيكة )

الطباطيط الكهربائي للأعصاب والمعصبات

اقامة الافتتاح

- زاوية براهيم الروداني

والنحاس النحوي

- الطابق الثاني فوق المبنك العقاري والملاحي

- المعاريف - الدار البيضاء



casablanca le : 08/02/2024

## BENTALEB NISRINE

Douleurs neuropathiques des quatre membres  
avec au niveau de l'électromyogramme des signes de souffrance radiculaire en cervicale et lombo-sacrée avec au niveau cervical plusieurs protrusions discales étagées  
travail à risque pour le rachis

rééducation

25 séances

د. عادل العراقي الحسيني  
Dr. ADIL ARAQI-HOUSSAINI  
اختصاصي في أمراض الدماغ والأعصاب  
Neurologue EEG EMG  
Résidence Infitah, Angle Brahim Roudani  
et Nahass Nahoui, 2e Etg, Maârif - Casablanca  
Tél: 0522 25 02 02 / 05 222 555 66 - Gsm: 06 23 819 721