

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-0026586

201608

Optique

Autres


Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 10583 Société :  
 Actif  Pensionné(e)  Autre :  
 Nom & Prénom : EL AOUAO BIHI  
 Date de naissance : 1964  
 Adresse : Hay Nissi MIR Rue 3 anq 225 H. #  
 Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :  
  
 Dr. Abdellatif TLEM  
Médecin Général  
Echographie  
155, Av. Afghanistan H.H.  
Casablanca - Tel: 05 22 20 45 45  
 Date de consultation : 06/04/2014  
 Nom et prénom du malade : EL AOUAO BIHI Age : .....  
 Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant  
 Nature de la maladie : Dermatose  
 Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : 



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/04/24			200.00	

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Remiseur	Date	Montant de la Facture
	06/04/24	448.00

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
	H	25533412	21433552	MONTANTS DES SOINS	
D	00000000	00000000			
35533411	00000000	11433553			
	B	[Création, remont, adjonction]			
G	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				DATE DU DEVIS
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				

Dr. ABDELALI TLEMÇANI

MEDECINE GENERALE

Echographie

155, Avenue Afghanistan

Hay El Hassani - Casablanca

Tél. : 05.22.90.33.90

الدكتور عبد العالى التلمسانى

الطب العام

أمراض النساء والرجال والأطفال

الفحص بالتلفزة

155، شارع أفغانستان

حي الحسني - الدار البيضاء

الهاتف: 05.22.90.33.90

Casablanca, le ..... - 6 AVR. 2021

54.20 x 5 EL NORAD BIDI

Tricel (m)

1) 171 (i)

3.50 x 5

5

27.100

17.5

- Fucovite ero

- 0

14 2x1

- onifine crème

14.71/1

Docteur Abdelali TLEMÇANI  
Médecine Générale  
Echographie

155, Av. Afghanistan H.H  
Casablanca. Tél. 05.22.90.33.90

34.00

44.820

REVEAL SARL  
PHARMACIE CHIFA  
10 Avc. Afghanistan  
Hay Hassani - Casablanca  
Tél. : 05.22.90.32.63

المرجو إحضار الوصفة عند المراقبة

39810

## Notice : Information de l'utilisateur

TRICEF® 1g / 10ml

TRICEF® 1g/ 3,5 ml

TRICEF® 500 mg/ 5 ml

TRICEF® 500 mg/ 2 ml

Poudre et solvant pour solution injectable  
Boîte de 1 flacon de poudre  
et 1 ampoule de solvant  
Ceftriaxone

50,20

Veuillez lire attentivement cette notice d'utiliser ce médicament car elle contient informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?

3. Comment utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment injecter ?

6. Informations supplémentaires.

### 1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Antibactérien à usage systémique, céphalosporines de troisième génération - code ATC : J01DD04.

TRICEF est un antibiotique indiqué chez les adultes et chez les enfants (y compris les nouveau-nés). Il agit en tuant des bactéries responsables d'infections. Il appartient à un groupe de médicaments appelés céphalosporines.

**TRICEF poudre et solvant pour solution injectable (IM)** est administré par une injection dans le muscle d'une solution contenant de la lidocaïne, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

TRICEF est utilisé pour traiter les infections :

- du cerveau (méningeite) ;
- des poumons ;
- de l'oreille moyenne ;
- de l'abdomen et de la paroi de l'abdomen (péritonite) ;
- urinaires et des reins ;
- des os et des articulations ;
- de la peau et des tissus mous ;
- du sang ;
- du cœur.

Il peut être donné pour :

- traiter des infections sexuellement transmissibles spécifiques (gonorrhée et syphilis) ;
- traiter des patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause ;
- traiter des exacerbations aiguës chez des adultes ayant une bronchite chronique ;
- traiter la maladie de Lyme (due à des morsures de tiques) chez les adultes et les enfants, y compris chez les nouveau-nés à partir de l'âge de 15 jours ;
- prévenir des infections liées à une opération chirurgicale.

En plus, n'utilisez pas TRICEF 1g / 10ml et 500 mg/ 2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous êtes allergique à la lidocaïne et que vous devez utiliser TRICEF en injection dans un muscle.
- Si vous présentez une anomalie de la conduction cardiaque, entraînant une diminution de la pression artérielle et un ralentissement du rythme cardiaque (bloc cardiaque complet) ;
- Si vous présentez un volume sanguin réduit (hypovolémie).

TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable, ne doit pas être utilisé chez les bébés dans les cas suivants :

- Prématuré ;
- Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins (une jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux) ou si un produit contenant du calcium doit être injecté dans la veine).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant d'utiliser TRICEF :

- Si vous avez récemment pris ou si vous êtes sur le point de prendre des produits qui contiennent du calcium ;

• Si vous avez récemment eu une diarrhée après avoir pris un antibiotique. Si vous avez déjà eu des problèmes d'intestin, en particulier une colite (inflammation de l'intestin) ;

• Si vous avez des problèmes de foie ou de rein ;

• Si vous avez des calculs biliaires ou des calculs au niveau des reins ;

• Si vous avez d'autres maladies, comme une anémie hémolytique (diminution de vos globules rouges, ce qui peut rendre votre peau jaune pâle et vous donner une faiblesse ou un essoufflement) ;

• Si vous suivez un régime pauvre en sodium ;

• Si vous présentez ou avez déjà présenté une association des symptômes suivants : éruption cutanée, rougeurs, cloques au niveau des lèvres, des yeux et de la bouche, peau qui pèle, fièvre élevée, symptômes pseudo-grippaux, augmentation des taux d'enzymes hépatiques dans les tests sanguins et augmentation d'un type de globules blancs (éosinophilie) et un gonflement des ganglions lymphatiques (signes de réactions cutanées sévères, voir également rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »)

En plus pour TRICEF 1g/3,5 ml et 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous souffrez d'une perte de la fonction musculaire et d'une faiblesse musculaire (myasthénie) ;
- Si vous souffrez de crises convulsives (épilepsie) ;
- Si vous souffrez d'un quelconque problème cardiaque, en particulier s'il touche le rythme cardiaque ;
- Si vous avez des problèmes respiratoires ;
- Si vous présentez une porphyrine (maladie héréditaire rare qui touche la peau et le système nerveux).

### Si vous devez faire un test sanguin ou urinaire

Si vous utilisez TRICEF pendant une longue durée, il faudra peut-être que vous fassiez des examens sanguins régulièrement. TRICEF peut modifier les résultats de tests urinaires permettant de dépister la présence de sucre dans les urines, et du test sanguin appelé test de Coombs. Si vous devez faire des tests :

Autres pour solu  
informe v  
avez reç  
médicame  
En particu  
suvants,  
pharmacie

• Un type  
• Un antib  
traiter les

En plus p  
poudre et  
Un grand  
avec la lid  
effets. Ces

• Des mé  
ulcères de  
• De pui  
codéine  
opiacés ;

• Des mo  
battement  
tocaïnide

Grosse  
Si vous  
pensez  
demand  
médica

Le médi  
TRICEF

Condui  
TRICEF  
avez la  
conduise  
Si vous  
médecin,

TRICEF p  
chlorhydr  
Ce médi  
doit être  
régime co

3. Comm  
solution  
Veillez à  
exacteme  
pharmac  
pharmac  
TRICEF  
ou une i  
en inject  
IV, il peut  
intravei  
veine. TR  
pharmac  
avec des  
en même

## Notice : Information de l'utilisateur

TRICEF® 1g / 10ml

TRICEF® 1g/ 3,5 ml

TRICEF® 500 mg/ 5 ml

TRICEF® 500 mg/ 2 ml

Poudre et solvant pour solution injectable  
Boîte de 1 flacon de poudre  
et 1 ampoule de solvant  
Ceftriaxone

50,20

Veuillez lire attentivement cette notice d'utiliser ce médicament car elle contient informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?
3. Comment utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment injecter ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Antibactérien à usage systémique, céphalosporines de troisième génération - code ATC : J01DD04.

TRICEF est un antibiotique indiqué chez les adultes et chez les enfants (y compris les nouveau-nés). Il agit en tuant des bactéries responsables d'infections. Il appartient à un groupe de médicaments appelés céphalosporines.

**TRICEF poudre et solvant pour solution injectable (IM)** est administré par une injection dans le muscle d'une solution contenant de la lidocaïne, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

TRICEF est utilisé pour traiter les infections :

- du cerveau (méningeite) ;
- des poumons ;
- de l'oreille moyenne ;
- de l'abdomen et de la paroi de l'abdomen (péritonite) ;
- urinaires et des reins ;
- des os et des articulations ;
- de la peau et des tissus mous ;
- du sang ;
- du cœur.

Il peut être donné pour :

- traiter des infections sexuellement transmissibles spécifiques (gonorrhée et syphilis) ;
- traiter des patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause ;
- traiter des exacerbations aiguës chez des adultes ayant une bronchite chronique ;
- traiter la maladie de Lyme (due à des morsures de tiques) chez les adultes et les enfants, y compris chez les nouveau-nés à partir de l'âge de 15 jours ;
- prévenir des infections liées à une opération chirurgicale.

En plus, n'utilisez pas TRICEF 1g / 10ml ou 500 mg/ 2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous êtes allergique à la lidocaïne et que vous devez utiliser TRICEF en injection dans un muscle.
- Si vous présentez une anomalie de la conduction cardiaque, entraînant une diminution de la pression artérielle et un ralentissement du rythme cardiaque (bloc cardiaque complet) ;
- Si vous présentez un volume sanguin réduit (hypovolémie).

TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable, ne doit pas être utilisé chez les bébés dans les cas suivants :

- Prématuré ;
- Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins (une jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux) ou si un produit contenant du calcium doit être injecté dans la veine).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant d'utiliser TRICEF :

- Si vous avez récemment pris ou si vous êtes sur le point de prendre des produits qui contiennent du calcium ;
- Si vous avez récemment eu une diarrhée après avoir pris un antibiotique. Si vous avez déjà eu des problèmes d'intestin, en particulier une colite (inflammation de l'intestin) ;
- Si vous avez des problèmes de foie ou de rein ;
- Si vous avez des calculs biliaires ou des calculs au niveau des reins ;
- Si vous avez d'autres maladies, comme une anémie hémolytique (diminution de vos globules rouges, ce qui peut rendre votre peau jaune pâle et vous donner une faiblesse ou un essoufflement) ;
- Si vous suivez un régime pauvre en sodium ;
- Si vous présentez ou avez déjà présenté une association des symptômes suivants : éruption cutanée, rougeurs, cloques au niveau des lèvres, des yeux et de la bouche, peau qui pèle, fièvre élevée, symptômes pseudo-grippaux, augmentation des taux d'enzymes hépatiques dans les tests sanguins et augmentation d'un type de globules blancs (éosinophilie) et un gonflement des ganglions lymphatiques (signes de réactions cutanées sévères, voir également rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »)

En plus pour TRICEF 1g/3,5 ml et 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous souffrez d'une perte de la fonction musculaire et d'une faiblesse musculaire (myasthénie) ;
- Si vous souffrez de crises convulsives (épilepsie) ;
- Si vous souffrez d'un quelconque problème cardiaque, en particulier s'il touche le rythme cardiaque ;
- Si vous avez des problèmes respiratoires ;
- Si vous présentez une porphyrine (maladie héréditaire rare qui touche la peau et le système nerveux).

### Si vous devez faire un test sanguin ou urinaire

Si vous utilisez TRICEF pendant une longue durée, il faudra peut-être que vous fassiez des examens sanguins régulièrement. TRICEF peut modifier les résultats de tests urinaires permettant de dépister la présence de sucre dans les urines, et du test sanguin appelé test de Coombs. Si vous devez faire des tests :

Inform...  
ave...  
us é...  
jillan...  
par ce...  
ier vo...  
vous l...  
d'app...  
nez v...  
tier...  
ent et...  
nts  
ssez-  
infirm...  
le a...  
Autres m...  
pour solu...  
informe...  
avez reç...  
médicame...  
En particu...  
suvants,  
pharmacie...  
• Un type...  
• Un antibi...  
traiter les...  
En plus p...  
poudre et...  
Un grand...  
avec la lid...  
effets. Ces...  
• Des mé...  
ulcères de...  
• De pui...  
codéine, i...  
• Des mo...  
battement...  
tocaïnid...  
Grosse...  
Si vous...  
pensez...  
demand...  
médical...  
Le méd...  
TRICEF...  
Condut...  
TRICEF...  
avez la...  
conduse...  
Si vous...  
médecin...  
TRICEF...  
pour so...  
chlorhyd...  
Ce méd...  
doit être...  
régime co...  
3. Comm...  
solution...  
Veillez à...  
exacteme...  
pharmac...  
pharmac...  
TRICEF...  
ou une i...  
en inject...  
IV, il pe...  
intravei...  
veine. TR...  
pharmac...  
avec des...  
en même...

## Notice : Information de l'utilisateur

TRICEF® 1g / 10ml

TRICEF® 1g/ 3,5 ml

TRICEF® 500 mg/ 5 ml

TRICEF® 500 mg/ 2 ml

Poudre et solvant pour solution injectable  
Boîte de 1 flacon de poudre  
et 1 ampoule de solvant  
Ceftriaxone

50,20

Veuillez lire attentivement cette notice d'utiliser ce médicament car elle contient informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?
3. Comment utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment injecter ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Antibactérien à usage systémique, céphalosporines de troisième génération - code ATC : J01DD04.

TRICEF est un antibiotique indiqué chez les adultes et chez les enfants (y compris les nouveau-nés). Il agit en tuant des bactéries responsables d'infections. Il appartient à un groupe de médicaments appelés céphalosporines.

**TRICEF poudre et solvant pour solution injectable (IM)** est administré par une injection dans le muscle d'une solution contenant de la lidocaïne, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

TRICEF est utilisé pour traiter les infections :

- du cerveau (méningeite) ;
- des poumons ;
- de l'oreille moyenne ;
- de l'abdomen et de la paroi de l'abdomen (péritonite) ;
- urinaires et des reins ;
- des os et des articulations ;
- de la peau et des tissus mous ;
- du sang ;
- du cœur.

Il peut être donné pour :

- traiter des infections sexuellement transmissibles spécifiques (gonorrhée et syphilis) ;
- traiter des patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause ;
- traiter des exacerbations aiguës chez des adultes ayant une bronchite chronique ;
- traiter la maladie de Lyme (due à des morsures de tiques) chez les adultes et les enfants, y compris chez les nouveau-nés à partir de l'âge de 15 jours ;
- prévenir des infections liées à une opération chirurgicale.

En plus, n'utilisez pas TRICEF 1g / 10ml ou 500 mg/ 2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous êtes allergique à la lidocaïne et que vous devez utiliser TRICEF en injection dans un muscle.
- Si vous présentez une anomalie de la conduction cardiaque, entraînant une diminution de la pression artérielle et un ralentissement du rythme cardiaque (bloc cardiaque complet) ;
- Si vous présentez un volume sanguin réduit (hypovolémie).

TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable, ne doit pas être utilisé chez les bébés dans les cas suivants :

- Prématuré ;
- Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins (une jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux) ou si un produit contenant du calcium doit être injecté dans la veine).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant d'utiliser TRICEF :

- Si vous avez récemment pris ou si vous êtes sur le point de prendre des produits qui contiennent du calcium ;
- Si vous avez récemment eu une diarrhée après avoir pris un antibiotique. Si vous avez déjà eu des problèmes d'intestin, en particulier une colite (inflammation de l'intestin) ;
- Si vous avez des problèmes de foie ou de rein ;
- Si vous avez des calculs biliaires ou des calculs au niveau des reins ;
- Si vous avez d'autres maladies, comme une anémie hémolytique (diminution de vos globules rouges, ce qui peut rendre votre peau jaune pâle et vous donner une faiblesse ou un essoufflement) ;
- Si vous suivez un régime pauvre en sodium ;
- Si vous présentez ou avez déjà présenté une association des symptômes suivants : éruption cutanée, rougeurs, cloques au niveau des lèvres, des yeux et de la bouche, peau qui pèle, fièvre élevée, symptômes pseudo-grippaux, augmentation des taux d'enzymes hépatiques dans les tests sanguins et augmentation d'un type de globules blancs (éosinophilie) et un gonflement des ganglions lymphatiques (signes de réactions cutanées sévères, voir également rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »)

En plus pour TRICEF 1g/3,5 ml et 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous souffrez d'une perte de la fonction musculaire et d'une faiblesse musculaire (myasthénie) ;
- Si vous souffrez de crises convulsives (épilepsie) ;
- Si vous souffrez d'un quelconque problème cardiaque, en particulier s'il touche le rythme cardiaque ;
- Si vous avez des problèmes respiratoires ;
- Si vous présentez une porphyrie (maladie héréditaire rare qui touche la peau et le système nerveux).

### Si vous devez faire un test sanguin ou urinaire

Si vous utilisez TRICEF pendant une longue durée, il faudra peut-être que vous fassiez des examens sanguins régulièrement. TRICEF peut modifier les résultats de tests urinaires permettant de dépister la présence de sucre dans les urines, et du test sanguin appelé test de Coombs. Si vous devez faire des tests :

Autres pour solu

informez v

avez reç

médicame

En particu

suivants,

pharmacie

• Un type

• Un antib

traiter les

En plus p

poudre et

Un grand

avec la lid

effets. Ces

• Des mé

ulcères de

• De pui

codéine, i

opiacés, i

• Des mo

battement

tacainide

Grosse

Si vous

pensez,

demandé

médica

TRICEF

Condui

TRICEF

avez la

conduse

Si vous

médecin,

TRICEF

pour so

chlorhyd

Ce médic

doit être

régime co

3. Comm

solution

Veillez à

exacteme

pharmac

TRICEF,

ou une i

en injecti

IV, il peut

intraveine

veine. TR

pharmacie

avec des

en même

## Notice : Information de l'utilisateur

TRICEF® 1g / 10ml

TRICEF® 1g/ 3,5 ml

TRICEF® 500 mg/ 5 ml

TRICEF® 500 mg/ 2 ml

Poudre et solvant pour solution injectable  
Boîte de 1 flacon de poudre  
et 1 ampoule de solvant  
Ceftriaxone

50,20

Veuillez lire attentivement cette notice d'utiliser ce médicament car elle contient informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?
3. Comment utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment injecter ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Antibactérien à usage systémique, céphalosporines de troisième génération - code ATC : J01DD04.

TRICEF est un antibiotique indiqué chez les adultes et chez les enfants (y compris les nouveau-nés). Il agit en tuant des bactéries responsables d'infections. Il appartient à un groupe de médicaments appelés céphalosporines.

**TRICEF poudre et solvant pour solution injectable (IM)** est administré par une injection dans le muscle d'une solution contenant de la lidocaïne, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

TRICEF est utilisé pour traiter les infections :

- du cerveau (méningeite) ;
- des poumons ;
- de l'oreille moyenne ;
- de l'abdomen et de la paroi de l'abdomen (péritonite) ;
- urinaires et des reins ;
- des os et des articulations ;
- de la peau et des tissus mous ;
- du sang ;
- du cœur.

Il peut être donné pour :

- traiter des infections sexuellement transmissibles spécifiques (gonorrhée et syphilis) ;
- traiter des patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause ;
- traiter des exacerbations aiguës chez des adultes ayant une bronchite chronique ;
- traiter la maladie de Lyme (due à des morsures de tiques) chez les adultes et les enfants, y compris chez les nouveau-nés à partir de l'âge de 15 jours ;
- prévenir des infections liées à une opération chirurgicale.

En plus, n'utilisez pas TRICEF 1g / 10ml ou 500 mg/ 2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous êtes allergique à la lidocaïne et que vous devez utiliser TRICEF en injection dans un muscle.
- Si vous présentez une anomalie de la conduction cardiaque, entraînant une diminution de la pression artérielle et un ralentissement du rythme cardiaque (bloc cardiaque complet) ;
- Si vous présentez un volume sanguin réduit (hypovolémie).

TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable, ne doit pas être utilisé chez les bébés dans les cas suivants :

- Prématuré ;
- Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins (une jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux) ou si un produit contenant du calcium doit être injecté dans la veine).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant d'utiliser TRICEF :

- Si vous avez récemment pris ou si vous êtes sur le point de prendre des produits qui contiennent du calcium ;
- Si vous avez récemment eu une diarrhée après avoir pris un antibiotique. Si vous avez déjà eu des problèmes d'intestin, en particulier une colite (inflammation de l'intestin) ;
- Si vous avez des problèmes de foie ou de rein ;
- Si vous avez des calculs biliaires ou des calculs au niveau des reins ;
- Si vous avez d'autres maladies, comme une anémie hémolytique (diminution de vos globules rouges, ce qui peut rendre votre peau jaune pâle et vous donner une faiblesse ou un essoufflement) ;
- Si vous suivez un régime pauvre en sodium ;
- Si vous présentez ou avez déjà présenté une association des symptômes suivants : éruption cutanée, rougeurs, cloques au niveau des lèvres, des yeux et de la bouche, peau qui pèle, fièvre élevée, symptômes pseudo-grippaux, augmentation des taux d'enzymes hépatiques dans les tests sanguins et augmentation d'un type de globules blancs (éosinophilie) et un gonflement des ganglions lymphatiques (signes de réactions cutanées sévères, voir également rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »)

En plus pour TRICEF 1g/3,5 ml et 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous souffrez d'une perte de la fonction musculaire et d'une faiblesse musculaire (myasthénie) ;
- Si vous souffrez de crises convulsives (épilepsie) ;
- Si vous souffrez d'un quelconque problème cardiaque, en particulier s'il touche le rythme cardiaque ;
- Si vous avez des problèmes respiratoires ;
- Si vous présentez une porphyrine (maladie héréditaire rare qui touche la peau et le système nerveux).

### Si vous devez faire un test sanguin ou urinaire

Si vous utilisez TRICEF pendant une longue durée, il faudra peut-être que vous fassiez des examens sanguins régulièrement. TRICEF peut modifier les résultats de tests urinaires permettant de dépister la présence de sucre dans les urines, et du test sanguin appelé test de Coombs. Si vous devez faire des tests :

Inform...  
ave...  
us é...  
jillan...  
par ce...  
ier vo...  
vous l...  
d'app...  
nez v...  
tier...  
ent et...  
nts  
ssez-  
infirm...  
le a...  
Autres m...  
pour solu...  
informe...  
avez reç...  
médicame...  
En particu...  
suvants,  
pharmacie...  
• Un type...  
• Un antibi...  
traiter les...  
En plus p...  
poudre et...  
Un grand...  
avec la lid...  
effets. Ces...  
• Des mé...  
ulcères de...  
• De pui...  
codéine, i...  
• Des mo...  
battement...  
tocaïnid...  
Grosse...  
Si vous...  
pensez...  
demand...  
médical...  
Le méd...  
TRICEF...  
Condut...  
TRICEF...  
avez la...  
conduse...  
Si vous...  
médecin...  
TRICEF...  
pour so...  
chlorhyd...  
Ce méd...  
doit être...  
régime co...  
3. Comm...  
solution...  
Veillez à...  
exacteme...  
pharmac...  
pharmac...  
TRICEF...  
ou une i...  
en inject...  
IV, il pe...  
intravei...  
veine. TR...  
pharmac...  
avec des...  
en même...

## Notice : Information de l'utilisateur

TRICEF® 1g / 10ml

TRICEF® 1g/ 3,5 ml

TRICEF® 500 mg/ 5 ml

TRICEF® 500 mg/ 2 ml

Poudre et solvant pour solution injectable  
Boîte de 1 flacon de poudre  
et 1 ampoule de solvant  
Ceftriaxone

50,20

Veuillez lire attentivement cette notice d'utiliser ce médicament car elle contient informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?
3. Comment utiliser TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment injecter ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. Qu'est-ce que TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique : Antibactérien à usage systémique, céphalosporines de troisième génération - code ATC : J01DD04.

TRICEF est un antibiotique indiqué chez les adultes et chez les enfants (y compris les nouveau-nés). Il agit en tuant des bactéries responsables d'infections. Il appartient à un groupe de médicaments appelés céphalosporines.

**TRICEF poudre et solvant pour solution injectable (IM)** est administré par une injection dans le muscle d'une solution contenant de la lidocaïne, qui va réduire la douleur associée à l'injection.

TRICEF est utilisé pour traiter les infections :

- du cerveau (méningeite) ;
- des poumons ;
- de l'oreille moyenne ;
- de l'abdomen et de la paroi de l'abdomen (péritonite) ;
- urinaires et des reins ;
- des os et des articulations ;
- de la peau et des tissus mous ;
- du sang ;
- du cœur.

Il peut être donné pour :

- traiter des infections sexuellement transmissibles spécifiques (gonorrhée et syphilis) ;
- traiter des patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause ;
- traiter des exacerbations aiguës chez des adultes ayant une bronchite chronique ;
- traiter la maladie de Lyme (due à des morsures de tiques) chez les adultes et les enfants, y compris chez les nouveau-nés à partir de l'âge de 15 jours ;
- prévenir des infections liées à une opération chirurgicale.

En plus, n'utilisez pas TRICEF 1g / 10ml et 500 mg/ 2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous êtes allergique à la lidocaïne et que vous devez utiliser TRICEF en injection dans un muscle.
- Si vous présentez une anomalie de la conduction cardiaque, entraînant une diminution de la pression artérielle et un ralentissement du rythme cardiaque (bloc cardiaque complet) ;
- Si vous présentez un volume sanguin réduit (hypovolémie).

TRICEF, poudre et solvant pour solution injectable, ne doit pas être utilisé chez les bébés dans les cas suivants :

- Prématuré ;
- Nouveau-né (jusqu'à 28 jours) présentant certains problèmes sanguins (une jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux) ou si un produit contenant du calcium doit être injecté dans la veine).

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant d'utiliser TRICEF :

- Si vous avez récemment pris ou si vous êtes sur le point de prendre des produits qui contiennent du calcium ;
- Si vous avez récemment eu une diarrhée après avoir pris un antibiotique. Si vous avez déjà eu des problèmes d'intestin, en particulier une colite (inflammation de l'intestin) ;
- Si vous avez des problèmes de foie ou de rein ;
- Si vous avez des calculs biliaires ou des calculs au niveau des reins ;
- Si vous avez d'autres maladies, comme une anémie hémolytique (diminution de vos globules rouges, ce qui peut rendre votre peau jaune pâle et vous donner une faiblesse ou un essoufflement) ;
- Si vous suivez un régime pauvre en sodium ;
- Si vous présentez ou avez déjà présenté une association des symptômes suivants : éruption cutanée, rougeurs, cloques au niveau des lèvres, des yeux et de la bouche, peau qui pèle, fièvre élevée, symptômes pseudo-grippaux, augmentation des taux d'enzymes hépatiques dans les tests sanguins et augmentation d'un type de globules blancs (éosinophilie) et un gonflement des ganglions lymphatiques (signes de réactions cutanées sévères, voir également rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »)

En plus pour TRICEF 1g/3,5 ml et 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM) :

- Si vous souffrez d'une perte de la fonction musculaire et d'une faiblesse musculaire (myasthénie) ;
- Si vous souffrez de crises convulsives (épilepsie) ;
- Si vous souffrez d'un quelconque problème cardiaque, en particulier s'il touche le rythme cardiaque ;
- Si vous avez des problèmes respiratoires ;
- Si vous présentez une porphyrine (maladie héréditaire rare qui touche la peau et le système nerveux).

### Si vous devez faire un test sanguin ou urinaire

Si vous utilisez TRICEF pendant une longue durée, il faudra peut-être que vous fassiez des examens sanguins régulièrement. TRICEF peut modifier les résultats de tests urinaires permettant de dépister la présence de sucre dans les urines, et du test sanguin appelé test de Coombs. Si vous devez faire des tests :

Inform...  
ave...  
us é...  
jillan...  
par ce...  
ier vo...  
vous l...  
d'app...  
nez v...  
tier...  
ent et...  
nts  
ssez-  
infirm...  
le a...  
Autres m...  
pour solu...  
informe...  
avez reç...  
médicame...  
En particu...  
suvants,  
pharmacie...  
• Un type...  
• Un antibi...  
traiter les...  
En plus p...  
poudre et...  
Un grand...  
avec la lid...  
effets. Ces...  
• Des mé...  
ulcères de...  
• De pui...  
codéine, i...  
• Des mo...  
battement...  
tocaïnid...  
Grosse...  
Si vous...  
pensez...  
demand...  
médical...  
Le méd...  
TRICEF...  
Condut...  
TRICEF...  
avez la...  
conduse...  
Si vous...  
médecin...  
TRICEF...  
pour so...  
chlorhyd...  
Ce méd...  
doit être...  
régime co...  
3. Comm...  
solution...  
Veillez à...  
exacteme...  
pharmac...  
pharmac...  
TRICEF...  
ou une i...  
en inject...  
IV, il pe...  
intravei...  
veine. TR...  
pharmac...  
avec des...  
en même...

## QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Effets indésirables fréquents pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 :**

douleurs abdominales,

digestion difficile (dyspepsie),

jaunisse, augmentation de la bilirubine (pigment jaune) dans le sang,

léthargie, fatigue, perte de force et d'énergie (asthénie).

**Effets indésirables peu fréquents, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :**

diminution de la quantité de certains éléments du sang (pancytopenie, neutropénie, agranulocytose, thrombopénie, anémie dont anémie sidéroblastique),

maux de tête,

somnolence,

éruptions cutanées de divers types, en particulier maculo-papuleuses ou érythématouses, ittique,

insuffisance rénale,

**Effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000 :**

hypersensibilité, perte de force et d'énergie (asthénie).

**Effets indésirables avec une fréquence indéterminée (ne pouvant être estimée sur la base données disponibles) :**

réaction allergique, exceptionnellement grave, hypersensibilité, anamolie des tests hépatiques,

éruption exanthématique aiguë généralement (syndrome de Stevens-Johnson et de

syndrome de toxicodermie aiguë généralement), éruption de la peau (purpura vasculaire),

éruption de bulles, de cloques ou un décollement de la peau, en particulier autour de la che, du nez, des yeux et dans la région génitale (syndrome de Stevens-Johnson et de

DRESS), réaction allergique grave (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse/syndrome DRESS)

et/ou augmentation de la taille des ganglions, une fatigue importante, une atteinte d'un organe interne, et des anomalies des examens sanguins telles qu'une augmentation du

nombre de certains globules blancs (eosinophilie), éruption de la peau, éruption de la peau, éruption et douleurs musculaires potentiellement graves (rhabdomyose).

**Éviction des effets secondaires :**

Essentiez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans ce.

## MENT CONSERVER FUCIDINE® 250 mg, comprimé pelliculé ?

Évidemment hors de la vue et de la portée des enfants.

pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP.

La péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Précautions particulières de conservation.

aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères.

## MATIONS SUPPLEMENTAIRES

sur ordonnance médicale

pelliculé ?

PPV:125DH70