

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR

## ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :


- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique
Cadre réservé à l'adhérent (e)		
Matricule : <u>13257</u>		
Société : <u>Royal Air Maroc</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :
Nom & Prénom : <u>SERROUKH DEYAE</u>		
Date de naissance : <u>22/02/1990</u>		
Adresse : <u>Rue des Capibaris, Immeuble Capibaris, Etage 1, App. N° 3, Casablanca, 1<sup>er</sup> Etage, Bourguiba</u>		
Tél. : <u>06 48 36 18 29</u>	Total des frais engagés :	Dhs

Cadre réservé au Médecin		
Cachet du médecin :		
		
Date de consultation : <u>03/03/2014</u>		
Nom et prénom du malade : <u>M. DEYAE SERROUKH</u> Age: .....		
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint
Nature de la maladie :	<u>Suis. de Cancer</u>	
Affection longue durée ou chronique :	<input type="checkbox"/> ALD	<input type="checkbox"/> ALC
Pathologie : .....		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....		
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.		

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) : Serroukh

Le : 03/03/2014

VOLET ADHÉRENT

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/03/2024	Consultation	100,00		Dr. ENNABOUCHE Gynécologue 168 Avenue Caid Eddine Tel: Etage 2, Casablanca

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE D'YSEF Asmaâ AMOR 15 bis, Rue Tariq Ferhat es-Séïdi Beaujelouz Casablanca Tél/Fax: 0527 75 55 62 INPE: 09 204 59 62	09/03/24	480,20

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE BENJELLOUN 09, Rue Omar Al Khayam Beaujelouz Casablanca 04000 503 40 - 0522 39 32 441K	09/03/24	B: 190 HMO	279,60

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Montant des Honoraires	COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412	21433552	00000000	
	D	00000000	00000000	35533411	
	G	00000000	11433553	B	
		(Création, remont, adjonction)	Montant des Honoraires		
		Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Edderdabi Zineb

## **Spécialiste en Gynécologie-Obstétrique**



الدكتورة الدرولابي زينب

خصائص في أمراض النساء والتوليد

الطباطبائي والشافعي والجعفي والمرتضوي

Lauréate de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca  
Ancien médecin interne du CHU Ibn Rochd de Casablanca

مدونة كلية الحلب و الصيدلة بالدار البيضاء

**عقم اقامة الحمل - الولادة - الفحص بالصدى الصوتي - جراحة أمراض النساء - التشخيص والراحة بالمنظار - أمراض سرطان الثدي - سين الياس - عقم الزوجين**

Suivi de Grossesse - Accouchement - Echographie - Chirurgie Gynécologique - Cœlioscopie - Hystéroscopie - Colposcopie

**Maladies et cancer du Sein - Ménopause - Infertilité du Couple**

Maladies et cancer du Sein - Ménopause - Infertilité du Couple

Casablanca, le : 09/03/1944

LOT:V49  
PER:12/2025  
PPV:233.00 DH

DEYAS SERRAICHI

233,00

① - Cerebro → TM  
red  
le sin  
(cerebro → ejes  
→ fascios de la  
siguiente)

99,00

$$\textcircled{2} \quad \frac{12\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = 4$$

66,60

$$\textcircled{3} - \quad \frac{y = 0.5x^2 + 1}{-y + 1}$$

56, M

3 - see over

25,70

⑤. Work against ~~for~~

158. شارع عمر المختار الطابق الأول، رقم 2. بوسيجور - الدار البيضاء  
158 Avenue Omar El Khayam, 1er étage, N° 2, Beauséjour - Casablanca

06 20 45 39 25 - 06 70 28 62 80 - z.edderdabi@gmail.com

PPV:56.10 DH

## LES UTILISATEURS

Orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Contenu de la notice :

- Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.
- Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.
- Quels sont les effets indésirables éventuels.
- Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.
- Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmacothérapeutique : Fer trivalent, préparations orales. FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine, ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinylate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique aux protéines lactées.
- Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).
- Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.
- Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

### Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

- En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre

médecin ou à votre pharmacien.

FERPLEX 40 mg solution buvable peut réduire l'absorption intestinale et donc l'effet de certains médicaments, tels que : Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates.

La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Throxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbipoda utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétol, utilisé en prévention de rejet de greffe. L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques : Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

### Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

L'absorption des dérivés de fer peut être augmentée suite à l'ingestion de jus citrique (orange, citron, etc.) fraîchement pressé.

### Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

FERPLEX est indiqué pendant la grossesse et l'allaitement pour le traitement des carences en fer, il n'y a donc aucune précaution particulière à prendre.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines n'a été observé.

### Informations importantes concernant certains composants de FERPLEX 40 mg solution orale :

Ce médicament contient 1400 mg de sorbitol par flacon.

Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a dit que vous (ou votre enfant) avez une intolérance à certains sucre, ou si vous avez reçu un diagnostic d'intolérance héréditaire au fructose (IFH), une maladie génétique rare, dans laquelle le patient ne peut pas décomposer le fructose, vous (ou votre enfant) consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. Le sorbitol peut

Re  
P  
rés  
Aver  
trop l  
Si vou  
vous n'  
Contacte  
Anti Pois  
05 37 68

réso  
Aver  
trop l  
Si vou  
vous n'  
Contacte  
Anti Pois  
05 37 68  
Si vous i  
Ne pren  
prenez jan  
Si vous ave  
plus rapio  
normalemen  
Si vous ave  
médecin.

4. QUELES SONT  
Comme tous les  
susceptible d'avoir  
n'y soit pas sujet.  
Les effets seconda  
inconnue);

Troubles gastro-  
constipation ou dia  
diminuant la dose

# Spasfon® 80 mg Comprimé enrobé

Phloroglucinol/Triméthylphloroglucinol



Spasfon®  
30 comprimés enrobés



6 118000 33026

Si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

## Grossesse

L'utilisation de ce médicament, ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

## Allaitement

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

SPASFON® n'a aucun effet ou qu'un effet gênant sur l'aptitude à conduire des voitures et à utiliser des machines.

## SPASFON®, comprimé enrobé contient du glucose, du saccharose et de l'amidon de blé

Votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Le médicament contient une très faible teneur en gluten (provenant de l'amidon de blé). Il est considéré comme « sans gluten » et est donc peu susceptible d'entrainer des problèmes en cas de maladie cœliaque. Un comprimé ne contient pas plus de 2,4 microgrammes de gluten. Si vous avez une allergie au blé (différente de la maladie cœliaque), vous ne devez pas prendre ce médicament.

## 3. Comment prendre SPASFON®, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

SPASFON® est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

## Posologie

### Chez l'adulte :

Prendre 2 comprimés par prise, trois fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Tous les comprimés pourront prendre le relais d'un traitement d'attaque sous forme injectable, à la posologie maximale de 6 comprimés par 24 heures.

## Utilisation chez les enfants

Cette présentation n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans.

Chez l'enfant de plus de 6 ans : 1 comprimé par prise, deux fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 comprimés par 24 heures.

Chez l'enfant de plus de 6 ans, il conviendra de s'assurer que les comprimés peuvent être avalés sinon une autre forme sera préférée.

## Mode et voie d'administration

### Voie orale.

Tous les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

Si vous avez pris plus de SPASFON®, comprimé enrobé que vous n'auriez dû Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre SPASFON®, comprimé enrobé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre SPASFON®, comprimé enrobé

Sans objet.

## Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans certains cas une allergie peut survenir.

Vous reconnaîtrez les signes d'une allergie :

- par des boutons et/ou des rougeurs sur la peau, démangeaisons,
- par un brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke),
- ou par un malaise brutal dû à une chute de la pression artérielle (choc anaphylactique).

Une éruption étendue squameuse rouge avec des masses sous la peau et des cloques accompagnée de fièvre à l'instaration du traitement (pustulose exanthémate aiguë généralisée).

Si vous développez ces symptômes, arrêtez d'utiliser ce médicament et contactez immédiatement votre médecin.

## Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Ainsi, pour signaler un effet indésirable ou pour toute question relative à la sécurité du médicament, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse suivante :

pv.pharmacovigilance@zenithpharma.ma

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. Comment conserver SPASFON®, comprimé enrobé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

Aucune condition particulière de conservation.

Ne jetez aucun médicament au « tout-à-l'égout » ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient SPASFON®, comprimé enrobé

- Les substances actives sont : Phloroglucinol dihydraté 80.000 mg Quantité correspondant en phloroglucinol anhydre 62.233 mg Triméthylphloroglucinol 80.000 mg Pour un comprimé enrobé.

- Les autres composants sont : Lactose monohydraté, saccharose, acétate de polyvinyle, amidon de blé, acide stéarique, stéarate de magnésium.

Enrobage : acétate de polyvinyle, talc, saccharose, gomme arabique, gélatine, dioxyde de titane (E171), érythrosine (E127), cire de carnauba.

Qu'est-ce que SPASFON®, comprimé enrobé et contient-il l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé en boîte de 30.

Date de la notice : Novembre 2021

Fabriqué et distribué par ZENITHPHARMA  
96, Zone Industrielle Tassila Inezgane Agadir  
Maroc

Sous licence Acino France SAS

Dr M.E. BOUHMADI

Pharmacien Responsable

# magmine

MBA9 0426  
LOT PER  
Prix 99.00

MBA9 23- 114  
2026-04'21:32

Magnésium 300 mg  
Vitamine B<sub>6</sub>

SANS SUCRES, SANS SEL ET SANS GLUTEN

COMPOSITION

Par comprimé :

Oxyde de magnésium d'origine marine	.....	300 mg
Soit un apport en magnésium élément de	.....	2mg
Vitamine B6 .....	.....	

## PROPRIETES

Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement du cœur, des nerfs, des muscles et des différentes phases du métabolisme de l'organisme. **MAGMINE** à base de 300 mg de magnésium et de vitamine B<sub>6</sub>, permet de couvrir les besoins quotidiens en magnésium dans certaines situations :

- Effort physique intense
- Crampes et tensions musculaires, fatigue physique,

LOT:13123004  
PER:05-2026  
PPV:66.40 DH

# Yodocefol®

0,2 microgrammes, Boîte de 28 comprimés  
Iode, Acide folique, Vitamine B<sub>12</sub>

Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Garder cette notice. Vous pourriez avoir besoin à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si il partage un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## SOMMAIRE DE LA NOTICE :

1. Quelle classe pharmaco-thérapeutique de YODOCEFOL® ?
2. Qu'est-ce que YODOCEFOL® et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre YODOCEFOL® ?
4. Comment prendre YODOCEFOL® ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver YODOCEFOL® ?
7. Informations supplémentaires.

## 1. QUELLE CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE D'YODOCEFOL® ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Thérapie d'iode

Code ATC : H03CA

## 2. QU'EST-CE QUE YODOCEFOL®, ET DANS QUELS CAS-IL UTILISÉ ?

YODOCEFOL® comprimés est indiqué pour la prévention des troubles dus à la carence en iode (TCI), acide folique et vitamine B<sub>12</sub>, chez les femmes enceintes pendant le premier trimestre de grossesse et durant 1 mois après la conception à titre de prévention des altérations dans le développement du système nerveux central du fœtus (défauts du tube neural et troubles neurologiques).

## 3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE YODOCEFOL® ?

**Ne pas prendre YODOCEFOL®, comprimé dans les cas suivants :**  
Si vous êtes allergiques à l'iode de potassium, acide folique, vitamine B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients de YODOCEFOL® (Énumérés dans la section 7). En particulier celle liée à l'iode de potassium ;

Si vous souffrez de bronchite aigüe (En particulier celle liée à l'iode de potassium). (avec symptômes).

Si vous souffrez d'hypothyroïdie (augmentation de la fonction thyroïde) manifestée par une dose d'iode supérieure à 150 microgrammes par jour.

### Faites spécialement attention avec YODOCEFOL® :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre YODOCEFOL®. Le traitement par YODOCEFOL® chez des patients épileptiques doit se faire sous contrôle médical strict.

Ce médicament contient de l'iode de potassium, la thérapie doit être initiée avec précaution chez les personnes sensibles à l'iode.

Ce médicament en contenant de l'iode de potassium, peut affecter la glande thyroïdienne. Son action sur la glande thyroïde, qui contient de l'iode de potassium, peut affecter la fonction de cette glande (hypothyroïdie).

Ne pas prendre

## Si vous avez pris plus de YODOCEFOL® que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris une dose supérieure de YODOCEFOL® à celle que vous devez prendre ou en cas de surdosage accidentel ou ingestion accidentelle,appelez le centre Anti Poison et de Pharmacovigilance au téléphone suivant : 05 37 68 64 64. L'intoxication intentionnelle ou accidentelle par ce médicament est très peu probable. La prise de doses très supérieures à celles indiquées par ce prospectus ou durant de longues périodes de temps peut provoquer une saveur métallique, démangeaison de la bouche et la gorge, sensibilité douloureuse aux dents et gencives, hypersalivation, irritation de la muqueuse nasale, éternuements et irritation oculaire avec gonflement des paupières (symptômes connus sous le nom de « iodisme »).

Il peut également provoquer de fortes migraines, toux, œdème pulmonaire (accumulation du liquide), ainsi que le gonflement et la sensibilisation des glandes parotidales et submaxillaires peuvent également se produire.

L'inflammation du pharynx, du larynx, et des amygdales peut également se produire. Des éruptions modérées peuvent se développer dans les zones séborrhéiques ; les éruptions graves sont rares.

L'irritation gastrique est fréquente avec des doses extrêmement élevées. Une diarrhée - parfois une diarrhée sanguinolente - peut se produire.

Les signes et les symptômes de l'iodisme normalement diminuent spontanément quelques jours après l'arrêt du traitement.

Les grandes doses d'iode de potassium pendant une longue période peuvent causer l'hyperplasie de la glande thyroïde (agrandissement), le goitre, et l'hypothyroïdisme grave.

## Si vous avez oublié de prendre une dose de YODOCEFOL® :

Ne prenez pas une dose double pour compenser les doses oubliées, prenez simplement la dose oubliée quand vous vous rappelez et prenez la dose suivante avec la séparation entre prises indiquée dans chaque cas (24 heures).

## Si vous interrompez le traitement de YODOCEFOL® :

Votre médecin vous indiquera la durée du traitement. Ne suspendez votre traitement avant, cela risque d'altérer l'efficacité espérée.

En cas de doute supplémentaire concernant ce produit, veuillez consulter votre médecin ou pharmacien.

## 5. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS :

Comme tous les médicaments, YODOCEFOL® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'en soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants ont été observés, classés par organes, systèmes et par fréquences. Les effets indésirables observés après le traitement par YODOCEFOL® sont considérés comme rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) ; fréquence incertaine (ne peut pas être estimée à partir des données disponibles).

Le tableau ci-dessous indique les effets indésirables du sang caractérisé

*Dr Edderdabi Zineb*

Spécialiste en Gynécologie-Obstétrique

Lauréate de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca  
Ancien médecin interne du CHU Ibn Rochd de Casablanca



الدكتورة للدردابي زينب

اختصاصية في أمراض النساء والتوليد

خريجة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

طبيبة داخلية سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء

تتبع ومراقبة الحمل - الولادة - الفحص بالصدى الصوتي - جراحة أمراض النساء - التشخيص والجراحة بالمنظار - أمراض سرطان الثدي - سن اليأس - عقم الزوجين

Suivi de Grossesse - Accouchement - Echographie - Chirurgie Gynécologique - Cœlioscopie - Hystéroskopie - Colposcopie

Maladies et cancer du Sein - Ménopause - Infertilité du Couple

Casablanca, le : ٠٩١٥٣١٢٦٤

DEYAE SERROUKH

②-Seroukh Toxoplasm

② - ECRU

LABORATOIRE BENJELLOU

Mme SERROUKH DEYAE

DDN 22-02-1990



Ordonnance

الدكتور للدردابي زينب  
LABORATOIRE BENJELLOU  
109, Bd. Omar Al Khayam, Beauséjour  
Tel : 06000.503.40 - 0622.39.33.66  
Fax : 0622.39.33.66

DR EDDERDABI ZINEB  
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE  
158 Avenue Omar El Khayam,  
1er Etage, N° 2, Beauséjour,  
Casablanca

158. شارع عمر الخيام الطابق الأول، رقم 2. بوسيجور - الدار البيضاء  
158, Avenue Omar El Khayam, 1<sup>er</sup> étage, N° 2, Beauséjour - Casablanca

📞 05 20 45 39 25 📞 06 70 28 62 90 📩 z.edderdabi@gmail.com

# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR 20200 CASABLANCA

Tel: 05 22 39 32 84/53 - 06000 503 40 - Whatsapp Accueil 06 63 790 723

Fax: 05.22.39.33.65 www.labobenjelloun.ma

IF 51759668-CNSS 6441662- TP 36004769 - INPE Labo093001360 INP Dr097159024-ICE002980177000019

INPE\_Dr Benjelloun



097159024

INPE Laboratoire



093001360

**FACTURE N°: 2403262025**

**ORGANISME: RAM MUPRAS**

**Mme DEYAE SERROUKH**

Date: 26/03/2024



Récapitulatif des analyses				
CN	Analyse	Clé	Clé	Total
PS	Prélèvement Sanguin	E25	E	25.00 MAD
B241	Cytologie. Culture. Identification	B90	B	120.60 MAD
B307	Toxoplasmose IgG	B100	B	134.00 MAD
<b>Total</b>				<b>279.60 MAD</b>

Total des B: 190

Total des HN: 0

Montant total de la facture: 279.6 Dirhams.

Arrêtée la présente facture à la somme de **deux cent soixante-dix-neuf dirhams soixante centimes.**





مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales  
Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon

Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**SANS ORDONNANCE**

Date de l'examen: 26/03/2024

**Mme SERROUKH DEYAE**

Date de naissance: 22/02/1990

Dossier N°: 2403262025



**SEROLOGIES INFECTIEUSES**

Cobas E411(ROCHE) – Alegria (ORGENTEC) – Techniques Immuno-chromatographiques – F200 (SD BIOSENSOR)

**Sérologie de la Toxoplasmose (IgG)**

22/02/2024

<0,13

<0,13 UI/mL

(<1,00)

Titre:


(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

**Conclusion:** Absence d'anticorps spécifiques antitoxoplasmose.  
A contrôler tous les mois jusqu'à la fin de la grossesse.

Interprétation des résultats Toxo (IgG):

< 1 UI/mL	Négatif
1 à < 3 UI/mL	Douteux
>= 3 UI/mL	Positif

Les résultats suivants ont été obtenus avec le test ROCHE Toxoplasmose IgG. Ils ne sont pas interchangeables avec les résultats obtenus avec les tests des autres fabricants.



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Blvd-Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06008.503.40 / 0622.38.30.84/85  
Fax : 0622.39.33.66



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)  
Tél.: 05 22 39 32 53/84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)



# مختبر بنجلون للتحاليل الطبية

## Laboratoire Benjelloun d'Analyses Médicales

Beauséjour

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

**Dr. Najib BENJELLOUN**

Médecin Biologiste  
Ancien Interne des Hôpitaux - Lyon  
Maîtrise en Cytogénétique - Grenoble

**SANS ORDONNANCE**

Date de l'examen: 26/03/2024

**Mme SERROUKH DEYAE**

Date de naissance: 22/02/1990

Dossier N°: 2403262025



### BACTÉRIOLOGIE – PARASITOLOGIE – MYCOLOGIE

Lecture interprétative des Antibiogrammes (I2A SIRSCAN Micro) – Lecteur automatique des bandelettes réactives (URIT 50)

#### Examen cytobactériologique des urines (ECBU)

Recueil	2ème jet
Signes fonctionnels	Rien à Signaler
Contexte clinique	Grossesse
Antibiothérapie en cours	Non
Aspect	Légèrement trouble
Culot	Faible

#### Examen chimique (recherche)

Glucose	Recherche négative	
Protéines	Recherche négative	
Acétone	Recherche négative	
Nitrites	Recherche négative	
pH (potentiel hydrogène) <small>(Lecteur de bandelette automatisé (URIT 50))</small>	5,5	(4,5–8,0)
Densité Urinaire (SG)	1,025 g/ml	(1,003–1,030)

#### Examen cytologique

Cellules épithéliales	<u>Assez nombreuses.</u>	
Leucocytes	8 000 / mL	(0–10 000)
Hématies	0 / mL	(0–0)
Cylindres	Absence	
Cristaux	Absence	

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Ben Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06 008 50 149 - 06 22 39 32 84/53  
Fax : 06 22 39 33 66



Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

109, Boulevard Omar Al Khayam - Beauséjour - 20200 Casablanca (en face du CACF)  
Tél.: 05 22 39 53 84 - 06000 503 40 - Fax : 05 22 39 33 65 - WhatsApp : 06 63 790 723  
benjelloun@labobenjelloun.ma - www.labobenjelloun.ma - Tramway : Ligne 2 (Arrêt Beauséjour)