

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

10549

Société :

RAXI

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

RAFIK MUSTAPHA

Date de naissance :

Adresse :

0665375505

Total des frais engagés :

228

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : _____ Age : _____

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 08/10/2024

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
.....	INP : <input type="text"/>
.....	
.....	
.....	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p style="text-align: right;">ARMACIE OMNIA SARL MÉDICAL HAMMADOUNI DÉCLARANT ETAT FINANCIER AVENUE MARCKEIN 651 QG 22 33 05 22 33 651</p> 	10/12/2014	228,-

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ANF

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553



[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Pharmacie OMNIA SARL - Berrechid

Dr HAMMOUMI MEHDI

0522336151

83,Avenue Marrakech , BerreCHID



Facture N° FAC-192188

Date : 01/04/2024

Rafik Mustapha

Maroc

Produit	Qté.	P.U	TVA	Total
COLCHICINE OPOCALCIUM CO 1MG B20 COMP	3	13,40	2	40,20
ZYLORIC CO 200MG B28 COM	6	31,30	2	187,80

PHARMACIE OMNIA SARL
MEHDI HAMMOUMI
Docteur en Pharmacie
83 Avenue Marrakech BERRECHID
Tel : 05 22 33 61 51

Code de TVA	1	2	3	4
Taux	0%	7%	20%	10%
Montant (DHS)	0	14,92	0	0

Total HT	213,08 DHS
TVA	14,92 DHS
Total Organisme	0 DHS
Total Client	228,00 DHS
Total	228,00 DHS

Arrêté la présente facture à la somme de : deux cent vingt-huit DHS



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimé

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de médicament car elle contient des informations importantes pour

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère
- Ce médicament va d'autres personnes. sont identiques aux
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous paraissent étranges, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC ?
2. Quelles sont les indications de ZYLORIC ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables de ZYLORIC ?
5. Comment stocker ZYLORIC ?
6. Informations pratiques

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC UTILISE POUR?

Les comprimés de ZYLORIC

agit en ralentissant la vitesse de conversion de l'acide urique dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et le rein. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies rénales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE ZYLORIC comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de la tablette).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle. Dans ce cas, prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients traités par l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves et graves, tels que la fièvre, la douleur articulaire et musculaire (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont généralement précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut être accompagnée d'apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimé

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de médicament car elle contient des informations importantes pour

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère
- Ce médicament vaut d'autres personnes. Les sont identiques aux
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous paraissent étranges, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC ?

3. Comment prendre ZYLORIC comprimé ?

4. Quels sont les effets indésirables ?

5. Comment se débarrasser des effets indésirables ?

6. Informations pratiques

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC UTILISE POUR?

Les comprimés de ZYLORIC

agit en ralentissant la vitesse de conversion de l'acide urique dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et le rein. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies rénales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de la tablette).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle importante.
- Prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients traités par l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves et graves (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut être accompagnée d'apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 62 DMP/21/INV/

SOTHEMA BOUKOURA

Produit sous licence AMO



6 118000 022244

LOT 222633

EXP 08 2026

PPV 31.30



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimé

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de médicament car elle contient des informations importantes pour

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère
- Ce médicament vaut pour d'autres personnes. Les effets sont identiques aux autres personnes.
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous survient, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC ?
2. Quelles sont les indications et les contre-indications ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment stocker ZYLORIC ?
6. Informations pratiques

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC UTILISE POUR?

Les comprimés de ZYLORIC

agit en ralentissant la vitesse de production d'acide urique dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et le rein. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies rénales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE ZYLORIC comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de la pilule).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle importante. Dans ce cas, il est recommandé de prendre des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients traités par l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves tels que la fièvre, la douleur articulaire et musculaire, la conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont généralement précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut être accompagnée d'une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si vous présentez une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez immédiatement de prendre ZYLORIC et consultez votre médecin.

ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 62 DMP/21/INV/

SOTHEMA BOUKOURA

Produit sous licence AMO



6 118000 022244

LOT 222633

EXP 08 2026

PPV 31.30



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimé

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de médicament car elle contient des informations importantes pour

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère
- Ce médicament vaut pour d'autres personnes. Les effets sont identiques aux autres personnes.
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous survient, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC ?
2. Quelles sont les indications et les contre-indications ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment stocker ZYLORIC ?
6. Informations pratiques

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC UTILISE POUR?

Les comprimés de ZYLORIC

agit en ralentissant la vitesse de production d'acide urique dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et le rein. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies rénales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE ZYLORIC comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de la pilule).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle importante. Dans ce cas, il est recommandé de prendre des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients traités par l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves tels que la fièvre, la douleur articulaire et musculaire, la conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont généralement précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut être accompagnée d'une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si vous présentez une éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez immédiatement de prendre ZYLORIC et consultez votre médecin.

ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 62 DMP/21/INV/

SOTHEMA BOUKOURA

Produit sous licence AMO



6 118000 022244

LOT 222633

EXP 08 2026

PPV 31.30



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimé

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de médicament car elle contient des informations importantes pour

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère
- Ce médicament vaut d'autres personnes. Les sont identiques aux
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous paraissent être liés à ce médicament, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC ?
2. Quelles sont les indications de ZYLORIC ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables de ZYLORIC ?
5. Comment empêcher les effets indésirables de ZYLORIC ?
6. Informations pratiques

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC UTILISE POUR?

Les comprimés de ZYLORIC agit en ralentissant la vitesse de conversion de l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et le liquide corporel. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies des reins.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE ZYLORIC comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de la tablette).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle. Dans ce cas, prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients traités par l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves et graves, tels que la fièvre, la douleur articulaire et musculaire (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont généralement précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut se caractériser par une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si vous présentez ces symptômes, arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et consultez votre médecin.

ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 62 DMP/21/INV/

SOTHEMA BOUKOURA



6 118000 022244

LOT 222633

EXP 08 2026

PPV 31.30



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimé

ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de médicament car elle contient des informations importantes pour

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.
- Ce médicament vaut d'autres personnes. Les sont identiques aux
- Si l'un des effets indésirables non mentionnés ci-dessous vous paraissent être liés à ce médicament, contactez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC ?
2. Quelles sont les indications de ZYLORIC ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables de ZYLORIC ?
5. Comment empêcher les effets indésirables de ZYLORIC ?
6. Informations pratiques

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC UTILISE

Les comprimés de ZYLORIC

agit en ralentissant la vitesse de conversion de l'acide urique dans l'organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et le rein. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de maladies rénales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE ZYLORIC comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme de la tablette).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle importante. Dans ce cas, prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients traités par l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des symptômes graves et graves, tels que la fièvre, la douleur articulaire et musculaire (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont généralement précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, mal de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut se caractériser par une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. Si vous présentez ces symptômes, arrêtez immédiatement de prendre ce médicament et consultez votre médecin.

ZYLORIC 200 mg

Boîte de 28 comprimés

A.M.M. N° 62 DMP/21/INV/

SOTHEMA BOUKOURA

Produit sous licence AMO



6 118000 022244

LOT 222633

EXP 08 2026

PPV 31.30

COLCHICINE OPOCALCIUM 1mg, comprimé sécable, boîte de 20 (Colchicine cristallisée)

MISE EN GARDE SPECIALES

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Comment prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Colchicine Opocalcium 1 mg, comprimé sécable ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIGOUTTEUX, Anti-inflammatoire

Ce médicament est préconisé dans :

- Le traitement et la prévention des crises de goutte,
- La maladie périodique,
- La maladie de Behcet,
- Autres accès aigus microcristallins.
- Traitement de la péricardite aiguë idiopathique en association d'un premier épisode de péricardite ou d'une récidive.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains aliments, il vous conseille de faire attention avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie rénale grave (défaillance du fonctionnement du rein),
- Si vous avez une maladie grave du foie (défaillance du fonctionnement du foie),
- Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine).
- Si vous êtes enceinte (dans l'indication péricardite).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable.

Mise en garde spéciales

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, ou un déficit en lactase (de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques (voir rubrique « Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ») est contre-indiquée.

Précautions d'emploi

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament. Ce médicament ne doit pas être pris en même temps que certains antibiotiques (comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine)).

Si vous prenez l'un de ces médicaments, vous ne devez pas prendre de la colchicine en même temps. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

En cas de péricardite survenant au cours de la grossesse, la colchicine est contre-indiquée compte-tenu de l'association avec les AINS. Dans les autres indications, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable contient du lactose et du saccharose



COLCHICINE OPACALCIUM 1mg, comprimé sécable, boîte de 20 (Colchicine cristallisée)

MISE EN GARDE SPECIALES

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COLCHICINE
- Comment prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Colchicine Opocalcium 1 mg, comprimé sécable ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIGOUTTEUX, Anti-inflammatoire

Ce médicament est préconisé dans :

- Le traitement et la prévention des crises de goutte,
- La maladie périodique,
- La maladie de Behcet,
- Autres accès aigus microcristallins.
- Traitement de la péricardite aiguë idiopathique en association d'un premier épisode de péricardite ou d'une récidive.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains aliments, il vous conseille de faire attention avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie rénale grave (défaillance du fonctionnement du rein),
- Si vous avez une maladie grave du foie (défaillance du fonctionnement du foie),
- Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine).
- Si vous êtes enceinte (dans l'indication péricardite).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable.

Mise en garde spéciales

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, ou un déficit en lactase (de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques (voir rubrique « Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ») est contre-indiquée.

Précautions d'emploi

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament. Ce médicament ne doit pas être pris en même temps que certains antibiotiques (comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine)).

Si vous prenez l'un de ces médicaments, vous ne devez pas prendre de la colchicine en même temps. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

En cas de péricardite survenant au cours de la grossesse, la colchicine est contre-indiquée compte-tenu de l'association avec les AINS. Dans les autres indications, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable contient du lactose et du saccharose

Colchicine 1mg
OPOCALCIUM

20 comprimés sécables

6 118000 082156

13,40

tre nocif,
ue aussi

au cours
1 mg.

COLCHICINE OPACALCIUM 1mg, comprimé sécable, boîte de 20 (Colchicine cristallisée)

MISE EN GARDE SPECIALES

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien ou à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COLCHICINE
- Comment prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE Colchicine Opocalcium 1 mg, comprimé sécable ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIGOUTTEUX, Anti-inflammatoire

Ce médicament est préconisé dans :

- Le traitement et la prévention des crises de goutte,
- La maladie périodique,
- La maladie de Behcet,
- Autres accès aigus microcristallins.
- Traitement de la péricardite aiguë idiopathique en association d'un premier épisode de péricardite ou d'une récidive.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains aliments, il vous conseille de faire attention avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une maladie rénale grave (défaillance du fonctionnement du rein),
- Si vous avez une maladie grave du foie (défaillance du fonctionnement du foie),
- Si vous prenez un traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine).
- Si vous êtes enceinte (dans l'indication péricardite).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable.

Mise en garde spéciales

L'apparition de diarrhées (selles liquides plus de 3 fois par jour) pendant le traitement, accompagnées ou non de nausées et de vomissements, peuvent être les premiers signes de surdosage, pouvant être grave.

Si vous constatez ces signes, prenez rapidement contact avec votre médecin qui sera amené à diminuer la dose ou à suspendre le traitement par la colchicine.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, ou un déficit en lactase (de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques (voir rubrique « Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable ») est contre-indiquée.

Précautions d'emploi

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament. Ce médicament ne doit pas être pris en même temps que certains antibiotiques (comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (à l'exception de la spiramycine)).

Si vous prenez l'un de ces médicaments, vous ne devez pas prendre de la colchicine en même temps. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

En cas de péricardite survenant au cours de la grossesse, la colchicine est contre-indiquée compte-tenu de l'association avec les AINS. Dans les autres indications, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé sécable contient du lactose et du saccharose

