

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Réditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

W21-831891

201904

Maladie

Dentaire

Optique

A

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1442

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BANOURI TOUREYA

Date de naissance : 24/10/1949

Adresse : 163, KSOUR AGNEF MAGIRAL MARRAKECH

Tél. : 0666193177 Total des frais engagés : 1786,10 DH

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Hajouji Idrissi Mahmoud
Gastro-entérologue
Route de Targa. Guéliz Marrakech
Tél : 05 24 43 31 32

Date de consultation : 26/10/2019

Nom et prénom du malade : BANOURI TOUREYA

Age : 76/10/1949

Lien de parenté : Lui-même Comptoir

Nature de la maladie :



Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'até médico conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 26/10/2019

Signature de l'adhérent(e) : TOUREYA



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
109191 C3		200,00	Route de Targa Guéliz Marrakech Tél: 05 24 43 31 32

EXECUTION DES ORDONNANCES

achet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>J.S</i>	<i>06 MAR 2024</i>	<i>286,10</i>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

achet et signature du ratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Hajouji Idrissi Mahmoud Gastro-entérologue te de Targa Guéliz Marrakech Tél : 05 24 43 31 32	26/10/2024	Dr Hajouji Idrissi Mahmoud Gastro-entérologue Route de Targa Guéliz Marrakech Tél : 05 24 43 31 32	3000,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉ

Dr. Mahmoud HAJOUJI IDRISI

SPECIALISTE

des Maladies de l'Appareil Digestif
Foie - Estomac - Intestins - Hémorroïdes

Diplômé de la Faculté de Médecine de
Montpellier (FRANCE)

Vidéo-Endoscopie Digestive
Echographie Abdominale
Proctologie



الدكتور محمود الحاجوجي الإدريسي

أخصائي

في أمراض الجهاز الهضمي
الكبد . المعدة . الأمعاء . البروستير

خريج كلية الطب

مونتيلبي (فرنسا)

التقطير الداخلي بالكاميرا

الفحص بالصدى الصوتي

Marrakech, le 26 FEV. 2024 مراكش في

N°me R0AN QDUR Touniya

38,50

U NEUTRAL 87
1ccs x 31 f



52,80

95,30

U AUCER 20 ml (28 SV 4 fil)

180/f m otu Aucer



99,50

U THERAMAG 325 fil

180/f snr



286,10

Dr Hajouji Idrissi Mahmoud
Gastro-entérologue
Route de Targa Guéliz Marrakech
Tél : 05 24 43 31 32

طريق تارگة. زاوية شارع الكولونيل گرubi. مركز الأعمال فكتور هيگو (30متر بعد ثانوية فكتور هيگو) گلیز . مراكش

Route de Targa, Angle Av. du Colonel Gazeille. Centre d'affaires Victor Hugo (30 m après Lycée Victor Hugo)

Guéliz - Marrakech

الهاتف : 05.24.43.31.32

ICE : 001628250000075



Gélules
Voie orale

THERAMAG®

LOT : CA380
EXP : 12/26
PPC : 99,50 DH

**THERAMAG®
375 mg**

00 mg/
glomérant :
6 : 2 mg/1gélule,

PROPRIÉTÉS :

THERAMAG® est à base de Magnésium d'origine marine et de vitamine B6.

THERAMAG® contribue au bon fonctionnement nerveux et musculaire.

Il aide à réduire la fatigue physique et émotionnelle (nervosité, irritabilité, stress, surmenage, difficultés d'endormissement et de concentration), et à maintenir une bonne fonction musculaire (un déficit en magnésium peut être la source de crampes musculaires et de fourmillements).

CONSEILS D'UTILISATION :

-THERAMAG® B6 300 mg : 1 gélule par jour avec un grand verre d'eau.

-THERAMAG® 375 mg : 1 gélule par jour avec un grand verre d'eau.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament .

-THERAMAG® B6 300 mg : Fabriqué par ADP Laboratoire Reventin-Vaugris - France Importé et distribué au Maroc par THERAPHARM - Casablanca

-THERAMAG® 375 mg : Fabriqué par Laboratoire IRCOS - Marrakech, Maroc
Autorisation sanitaire ONSSA N° : CAPV.19.257.19
Distribué par THERAPHARM - Casablanca

-THERAMAG® B6 300 mg :

Numéro d'enregistrement au Ministère de la Santé et de la protection sociale :
20231710048/RQv2/CA/DPS/DMP/18

-THERAMAG® 375 mg :

Numéro d'enregistrement au Ministère de la Santé et de la protection sociale :
2022211753/V1/CA/DPS/DMP/18.



Gélules
Voie orale

THERAMAG®

LOT : CA380
EXP : 12/26
PPC : 99,50 DH

**THERAMAG®
375 mg**

00 mg/
glomérant :
6 : 2 mg/1gélule,

PROPRIÉTÉS :

THERAMAG® est à base de Magnésium d'origine marine et de vitamine B6.

THERAMAG® contribue au bon fonctionnement nerveux et musculaire.

Il aide à réduire la fatigue physique et émotionnelle (nervosité, irritabilité, stress, surmenage, difficultés d'endormissement et de concentration), et à maintenir une bonne fonction musculaire (un déficit en magnésium peut être la source de crampes musculaires et de fourmillements).

CONSEILS D'UTILISATION :

-THERAMAG® B6 300 mg : 1 gélule par jour avec un grand verre d'eau.

-THERAMAG® 375 mg : 1 gélule par jour avec un grand verre d'eau.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament .

-THERAMAG® B6 300 mg : Fabriqué par ADP Laboratoire Reventin-Vaugris - France Importé et distribué au Maroc par THERAPHARM - Casablanca

-THERAMAG® 375 mg : Fabriqué par Laboratoire IRCOS - Marrakech, Maroc
Autorisation sanitaire ONSSA N° : CAPV.19.257.19
Distribué par THERAPHARM - Casablanca

-THERAMAG® B6 300 mg :

Numéro d'enregistrement au Ministère de la Santé et de la protection sociale :
20231710048/RQv2/CA/DPS/DMP/18

-THERAMAG® 375 mg :

Numéro d'enregistrement au Ministère de la Santé et de la protection sociale :
2022211753/V1/CA/DPS/DMP/18.

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

Veuillez lire :

- Gardez cette notice pour toute question d'information.
- Ce médicament n'est pas destiné à quelqu'un d'autre, même si ce dernier pourra être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

AMM N° : 569/17 DMP/21/NR Orient.

110066-03

LOT : 22270

PER : 06/2025

PPU : 52,80 DH

plus

is à

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez les prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en continu.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien et régurgitation acide :

- Si votre médecin constate que votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre des doses supplémentaires si votre œsophage n'a pas été complètement cicatrisé.
- La dose usuelle une fois que votre œsophage a été complètement cicatrisé est de 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de l'estomac (duodénal) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander des doses supplémentaires si votre ulcère n'a pas été complètement cicatrisé.

Traitement des ulcères de l'estomac :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander des doses supplémentaires si votre ulcère n'a pas été complètement cicatrisé.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose recommandée est de 20 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique et des ulcères inflammatoires non stéroïdiens :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Prévention des ulcères de l'estomac et des pancréas :

- La dose usuelle est de 20 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères provoqués par la prise d'anticoagulants et prévention des récidives :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par semaine.

Votre médecin va vous prescrire entre 1 et 2 gélules par jour.

Traitement d'un excès d'acide dans l'estomac et les pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) :

- La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour.

• Votre médecin peut ajuster la dose et également de la durée pendant laquelle le médicament est pris.

Utilisation chez l'enfant :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien et régurgitations acides.

Les enfants âgés de plus de 1 an et de plus de 20 kg peuvent prendre AULCER®. La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la dose correcte à administrer.

Traitement et prévention des ulcères associés à l'infection par Helicobacter pylori.

• Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre AULCER®. La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la dose correcte à administrer.

• Votre médecin prescrira à votre enfant entre 1 et 2 gélules par jour.

Mode d'administration :

• Il est recommandé de prendre vos gélules avec de l'eau.

• Les gélules peuvent être prises au petit déjeuner.

• Elles doivent être avalées entières avec de l'eau.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents.

Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

5. POSOLOGIE :

Voie d'administration : voie orale.

Veillez à toujours prendre AULCER® en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Neutral®

Hydroxyde d'aluminium + Hydroxyde de magnésium

FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS :

- Suspension buvable : flacon de 250 ml
- Comprimés à croquer ou à sucer : boîtes de 20 et 40 comprimés

PPV 38DH50

EXP 09/2025

LOT 26055 12

4,220 g

5,200 g

ucose, parahydroxybenzoate de
l'hydrogène à 30 % (110V),
é, qsp 100 ml

400 mg

400 mg

ence de menthe, magnésium

Neutral®

Hydroxyde d'aluminium - Hydroxyde de magnésium

Anti-Acide Suspension buvable 250 ml

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE

Prendre un avis médical en cas de :

- Perte de poids
- Gêne abdominale persistante ou difficulté à avaler.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas de :

- Insuffisance rénale
- Dialyse chronique
- Prise d'antihistaminique H₂, furosémide, glucocorticoïdes, fluoroquinolones.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, ET NOTAMMENT Tétracycline, Chlorpromazine, Isoniazide, Fluoroquinolones, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

- L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.
- Eviter les prises prolongées et à fortes doses de ce médicament
- L'allaitement peut être poursuivi lors de ce traitement.

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

DCI : oméprazole

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez les prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en continu.

Adultes :

Traitements des symptômes du reflux gastro-régurgitation acide :

• Si votre médecin constate que votre enfant a la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de semaines supplémentaires si votre enfant n'a pas été endormi par jour.

• Si votre œsophage n'a pas été endommagé par jour. Traitements des ulcères dans la paroi œsophagienne :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été complètement cicatrisé.

Traitements des ulcères de l'estomac :

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été complètement cicatrisé.

• Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

• La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Traitements de l'ulcère gastrique et duodénal inflammatoires non stéroïdiens :

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Prévention des ulcères de l'estomac et duodénal :

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Traitements des ulcères provoqués par une infection prévention des récidives :

• La dose recommandée est de 20 mg d'AULCER® une fois par semaine.

• Votre médecin va vous prescrire en même temps l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole.

Traitements d'un excès d'acide dans l'estomac dû à un pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison) :

• La dose recommandée est de 60 mg (3 gélules de 20 mg).

• Votre médecin peut ajuster la dose en fonction également de la durée pendant laquelle vous prenez.

Utilisation chez l'enfant :

Traitements des symptômes du reflux gastro-régurgitations acides :

Les enfants âgés de plus de 1 an et peuvent prendre AULCER®. La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la dose correcte à administrer.

Traitements et prévention des ulcères Helicobacter pylori :

• Les enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre AULCER®. La posologie dépendra du poids de l'enfant et de la dose correcte à administrer.

• Votre médecin prescrira à votre enfant l'amoxicilline et la clarithromycine.

Mode d'administration :

• Il est recommandé de prendre vos gélules.

• Les gélules peuvent être prises au cou.

• Elles doivent être avalées entières avec de l'eau.

V

•

C

•

I

•

M

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SPECIALISTE

des Maladies de l'Appareil Digestif
Foie - Estomac - Intestins - Hémorroïdes

Diplômé de la Faculté de Médecine de
Montpellier (FRANCE)

Vidéo-Endoscopie Digestive
Echographie Abdominale
Proctologie



Marrakech le 26/02/2024

الدكتور محمود الحاججي الإدريسي

حصانى

في أمراض الجهاز الهضمي
الكبد . المعدة . الأمعاء . البواسير

خريج كلية الطب

مونبولي (فرنسا)

التنظير الداخلي بالكاميرا

الفحص بالصدى الصوتي

COMpte RENDU D'ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

PRENOM: Touriya NOM: BANQOUR D.N.: 1950

INDICATION: Douleur abdominale.

Echographe: General Electric, Versana.

- Le foie est de taille normale, de contours réguliers et d'échostructure homogène, sans lésion focale ou diffuse.
- Les veines sus hépatiques sont de calibre normal et normalement réparties.
- Le système porte est perméable, de calibre normal.
- La vésicule biliaire est libre, à paroi fine.
- La voie principale est fine, non dilatée et libre.
- Pas de dilatation des voies biliaires intra-hépatiques.
- Le pancréas est de taille et d'échostructure normales.
- La rate est de taille normale, homogène.
- Les reins sont de taille normale, de contours réguliers, présentant une bonne différenciation cortico-médullaire, sans dilatation des cavités pyélo-calicielles et sans lithiasis décelable.
- NB: Légère distension colique.

CONCLUSION: Echographie abdominale sans particularités.

DR M. HAJOUJI IDRISI

Dr Hajouji Idrissi Mahmoud
Gastro-entérologue
Route de Targa Guéliz Marrakech
tél: 0524 43 31 32