

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

201936

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)	
Matricule : <u>560</u>	Société : <u>R.A.M</u>
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)
Nom & Prénom : <u>MR ABAKIL</u>	
Date de naissance : <u>1-07-1943</u>	
Adresse : <u>LOT. BNI-YAKHLEF N°49</u>	
<u>Rue ALGHOFRAINE MOHAMMEDIA</u>	
Tél. : <u>Idem</u>	Total des frais engagés : <u>9518.30</u> Dhs

Cadre réservé au Médecin		
Endocrinologue Diabetologue		
Rue SAIFI, Imm ISMAIL 1 Etg		
Appt 4 Mohammedia		
Tél : 05 23 31 47 47		
Cachet du médecin :		
Dr. Leila BELHADI BENSAM		
Date de consultation : <u>16/03/2024</u>	Age:	
Nom et prénom du malade : <u>ABAKIL HAFED</u>		
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint
Nature de la maladie : <u>Diabète + Hyperuricémie</u>		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances		
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.		

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
 Fait à RA. Mohammedia Le : / /
 Signature de l'adhérent(e) : [Signature]



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/3/2024	CS + 300 DH	Endocrinologue Diabetologue	RUE S.AFI, Imm ISMAIL 1 Etg APP 4 - Mohammedia	DR BELHADJI BENSAM
23/3/2024	Contrôle #0	Endocrinologue Diabetologue	RUE S.AFI, Imm ISMAIL 1 Etg APP 4 - Mohammedia	DR BELHADJI BENSAM

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/03/2024	1818,30
APPEL M 23 31 47 47		

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
INPE 093063717	19/03/2024	Baldo	1000,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553
D	00000000		B	
	00000000			
	35533411			
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				

A ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Leïla BELHADI BENSAMI

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca

Spécialiste Endocrinologie - Diabétologie

Nutrition et Maladies Métaboliques

(Diabète , Cholesterol, Hormones, Thyroïde , Hypophyse , Surrénale)

Troubles de Croissance et de puberté, Stérilité, Obésité ...)



الدكتورة ليلى بلهادي بنسامي

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

أخصائية في أمراض الغدد، السكري والتغذية

(السكري ، الكولسترول ، الهرمونات ، الغدة الدرقية ،

الغدة النخامية ، أمراض النمو والبلوغ ، العقم ، السمنة ...)

23 mars 2024

Mohammedia, le

Mr. ABAKIL HAFED

M

1/ NOVOMIX 30 FLEXPEN OU HUMALOG MIX 25

28 U LE MATIN

8 U LE SOIR

259.5

2/ AIGUILLES MICROFINES 4 MM

2x103.5

3/ ULORIC 40

0-0-1 UNE NUIT/2

Traitement pendant : 3 Mois

1.
2x)



Une app

Dr. Leïla BELHADI BENSAMI Endocrinologue Diabetologue
Rue Safi, Imm ISMAIL 1 Etg
Appt 4 - Mohammedia
Tél : 05 23 31 47 47



Rue Safi, Imm. Ismaïl, 1er étage Appat 4 - Mohammedia

Tél : 05.23.31.47.47 - Urgence : 06.61.93.20.28

E-mail : leilabelhadi3@gmail.com

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. Il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire en rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné ou la cicatrisation. Le risque de ne pas agir correctement peut entraîner une grossesse (voir rubrique 3 : Si vous prenez Humalog Mix25 KwikPen). Contactez votre médecin si vous trouvez une zone présentant des grosses tumeurs ou une autre zone. Votre médecin peut ajuster votre régime alimentaire et votre glycémie de plus près et d'ajuster les autres médicaments anti-diabétiques.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent varier lors de l'utilisation de certains médicaments. Ces médicaments peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline. Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
 - une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta-2 stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyméptase, ou
 - les antagonistes des récepteurs.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament sans ordonnance. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les médicaments peuvent diminuer généralement la glycémie pendant la grossesse et augmenter les besoins en insuline. Consultez votre médecin pour l'administration de votre insuline et pour votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5

UT AV 09 2025

PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose quotidienne devrez-vous faire plus d'une injection.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente, il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. Il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire en rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné, l'urticaire et le risque de ne pas agir correctement. Si vous présentez des modifications cutanées, contactez votre médecin. Il existe une zone présentant des grosses papules et une autre zone. Votre médecin peut vous conseiller de faire varier la glycémie de plus près et d'ajuster les autres médicaments anti-diabétiques.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent varier lors de l'utilisation de certains médicaments. Ces médicaments peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline. Ils comprennent :
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta₂-stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE),
 - les antagonistes des récepteurs des angiotensin II.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament sans ordonnance. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les insulines diminuent généralement le taux de sucre dans le sang pendant la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut nécessiter des ajustements de votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5
UT AV 09 2025
PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre dans un pays où l'insuline n'est pas disponible, il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire ou vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné, l'urticaire et le risque de ne pas agir correctement. Si vous présentez des modifications cutanées, contactez votre médecin. Il existe une zone présentant des grosses papules et une autre zone. Votre médecin peut vous conseiller de faire des modifications cutanées au site d'injection.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent varier lors de l'utilisation de certains médicaments. Ces médicaments peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline. Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
 - une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta₂-stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE),
 - les antagonistes des récepteurs de l'angiotensin II.

Informez votre médecin si vous prenez tout autre médicament, y compris les plantes et les vitamines. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les besoins en insuline diminuent généralement pendant la grossesse et augmentent au cours de l'administration de votre insuline. Consultez votre médecin pour votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5
UT AV 09 2025
PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. Il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire en rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné, l'urticaire et le risque de ne pas agir correctement. Si vous présentez des modifications cutanées, contactez votre médecin. Il existe une zone présentant des grosses papules et une autre zone. Votre médecin peut vous conseiller de faire des modifications cutanées au site d'injection.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent être augmentés par les médicaments suivants :
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta₂-stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyméptase, ou
 - les antagonistes des récepteurs.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament sans ordonnance. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les insulines diminuent généralement le taux de sucre dans le sang pendant la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut nécessiter des modifications de votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5
UT AV 09 2025
PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. Il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire en rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné, l'urticaire et le risque de ne pas agir correctement. Si vous présentez des modifications cutanées, contactez votre médecin. Il existe une zone présentant des grosses papules et une autre zone. Votre médecin peut vous conseiller de faire des modifications cutanées au site d'injection.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent être augmentés par les médicaments suivants :
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta₂-stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyméptase, ou
 - les antagonistes des récepteurs.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament sans ordonnance. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les insulines diminuent généralement le taux de sucre dans le sang pendant la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut nécessiter des modifications de votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5
UT AV 09 2025
PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre dans un pays où l'insuline n'est pas disponible, il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire ou vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent de maladie cardiaque traités avec la pioglitazone ont une augmentation inhabituelle ou une augmentation localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné ou l'urticaire. Le risque de ne pas agir correctement peut entraîner une grossesse (voir rubrique 3 : Si vous prenez Humalog Mix25 KwikPen). Contactez votre médecin si vous notez une zone présentant des grossesses ou des modifications cutanées dans une autre zone. Votre médecin peut ajuster votre régime alimentaire et votre glycémie de plus près et d'ajuster les autres médicaments anti-diabétiques.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent varier lors de l'utilisation de certains médicaments. Ces médicaments peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline. Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
 - une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta₂-stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyméptase, ou
 - les antagonistes des récepteurs.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament, y compris les plantes et les vitamines. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les besoins en insuline diminuent généralement pendant la grossesse et augmentent au cours de l'administration de votre insuline. Votre régime alimentaire et votre régime doivent être adaptés. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5

UT AV 09 2025

PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre dans un pays où l'insuline n'est pas disponible, il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire ou vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné ou la sécheresse. Le risque de ne pas agir correctement peut entraîner une grossesse (voir rubrique 3 : Si vous prenez Humalog Mix25 KwikPen). Contactez votre médecin si vous constatez une zone présentant des grossesses ou des modifications cutanées dans une autre zone. Votre médecin peut vous conseiller de faire varier la glycémie de plus près et d'ajuster les autres médicaments anti-diabétiques.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent varier lorsque vous prenez certains médicaments. Ces médicaments peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline. Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
 - une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta-2 stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine,
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzymé de l'acétylcholinestérase,
 - certains antagonistes des récepteurs de l'acétylcholine.

Ne prenez pas d'autre médicament sans consulter votre médecin. Si vous prenez d'autres médicaments, contactez votre pharmacien pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous l'êtes, contactez immédiatement votre médecin. Les besoins en insuline diminuent généralement pendant la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. Consultez votre pharmacien pour obtenir des renseignements supplémentaires.

LOT D587581M.5
UT AV 09 2025
PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. Il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire en rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné, l'urticaire et le risque de ne pas agir correctement. Si vous présentez des modifications cutanées, contactez votre médecin. Il existe une zone présentant des grosses papules et une autre zone. Votre médecin peut vous conseiller de faire des modifications cutanées au site d'injection.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent être augmentés par les médicaments suivants :
- une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta₂-stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyméptase, ou
 - les antagonistes des récepteurs.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament sans ordonnance. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les insulines diminuent généralement le taux de sucre dans le sang pendant la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut nécessiter des modifications de votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5
UT AV 09 2025
PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. Il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire en rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné ou l'urticaire. Le risque de ne pas agir correctement peut entraîner une grossesse (voir rubrique 3 : Si vous prenez Humalog Mix25 KwikPen). Contactez votre médecin si vous constatez une zone présentant des grossesses ou des modifications cutanées dans une autre zone. Votre médecin peut ajuster votre régime alimentaire et votre glycémie de plus près et d'ajuster les autres médicaments anti-diabétiques.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent varier lorsque vous prenez certains médicaments. Ces médicaments peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline. Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
 - une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta-2 stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyméptase, ou
 - les antagonistes des récepteurs.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament, y compris les plantes et les vitamines. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les médicaments peuvent diminuer généralement la glycémie pendant la grossesse et augmenter les besoins en insuline. Consultez votre médecin pour l'administration de votre insuline et pour votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5
UT AV 09 2025
PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel de santé.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel de santé. Il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire en rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné ou la cicatrisation. Le risque de ne pas agir correctement peut entraîner une grossesse (voir rubrique 3 : Si vous prenez Humalog Mix25 KwikPen). Contactez votre médecin si vous trouvez une zone présentant des grosses tumeurs ou une autre zone. Votre médecin peut ajuster votre régime alimentaire et votre glycémie de plus près et d'ajuster les autres médicaments anti-diabétiques.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent varier lors de l'utilisation de certains médicaments. Ces médicaments peuvent augmenter ou diminuer vos besoins en insuline. Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :
 - une pilule contraceptive,
 - des corticostéroïdes,
 - un traitement substitutif par hormone,
 - des hypoglycémiants oraux,
 - de l'acide acétysalicylique,
 - des sulfamides antibactériens,
 - de l'octréotide,
 - des «bêta-2 stimulants» (ex. rimiterpine),
 - des bêtabloquants ou
 - certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
 - du danazol,
 - certains inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE),
 - les antagonistes des récepteurs de l'angiotensin II.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament sans ordonnance. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les besoins en insuline diminuent généralement pendant la grossesse et augmentent au cours de l'administration de votre insuline. Votre régime alimentaire et votre régime doivent être adaptés. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5

UT AV 09 2025

PPY 111.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog Mix25 100 unités/mL KwikPen suspension injectable en stylo pré-rempli insuline lispro 25% et insuline lispro protamine 75%

Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen
3. Comment utiliser Humalog Mix25 KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog Mix25 KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog Mix25 KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog Mix25 KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. C'est une suspension pré-mélangée. Son principe actif est l'insuline lispro. Humalog Mix25 KwikPen contient 25 % d'insuline lispro en solution dans l'eau dont l'action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée. Humalog Mix25 KwikPen contient 75 % d'insuline lispro en suspension avec du sulfate de protamine dont l'action est prolongée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog Mix25 remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et dure plus longtemps que celle d'une insuline rapide. Vous utiliserez normalement Humalog Mix25 dans les 15 minutes qui précèdent ou qui suivent un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog Mix25 KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture toujours avant votre injection. Vous pouvez donner plusieurs unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez faire plusieurs injections.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog Mix25 KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog Mix25 KwikPen

- Si vous estimatez qu'une hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 3 : Si vous avez pris plus d'Humalog Mix25 que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Vérifiez toujours la désignation, la date de fabrication, le conditionnement et l'étiquette du médicament avec votre pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir les symptômes de l'hypoglycémie. Ces symptômes sont différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie fréquente ou si vous reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant.
 - Etes-vous récemment tombé malade?
 - Avez-vous des problèmes rénaux?
 - Faites-vous davantage d'exercice physique?
- Vos besoins en insuline pourront varier.
- Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou personnel soignant. Il pourrait vous contraindre à modifier votre régime alimentaire en rapport à vos habitudes.
- Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'infarctus ont été traités avec la pioglitazone et l'insuline. Informez votre médecin si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque, inhabituel ou une augmentation de la pression artérielle localisée (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes utilisant ce stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection pour éviter les modifications cutanées telles que l'acné, l'urticaire et le risque de ne pas agir correctement. Si vous présentez des modifications cutanées, contactez votre médecin. Il existe une zone présentant des grosses papules et une autre zone. Votre médecin peut vous conseiller de faire des modifications cutanées au site d'injection.

Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen

- Vos besoins en insuline peuvent augmenter ou diminuer.
- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par hormone,
- des hypoglycémiants oraux,
- de l'acide acétysalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'octréotide,
- des «bêta₂-stimulants» (ex. ritonavir),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline),
- du danazol,
- certains inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine II (ACE),
- certains antagonistes des récepteurs de l'angiotensin II.

Parlez à votre médecin si vous prenez tout autre médicament, y compris les plantes et les vitamines. (voir rubrique «Autres médicaments et Humalog Mix25 KwikPen»)

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, informez votre médecin. Les insulines diminuent généralement le taux de sucre dans le sang pendant la grossesse et augmentent au cours de l'allaitement. L'administration de votre insuline peut nécessiter des modifications de votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin.

LOT D587581M.5
UT AV 09 2025
PPY 111.00 DH

Uloric®

40 & 80 mg (Febuxostat)

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :

ULORIC 40 mg, comprimé pelliculé.
ULORIC 80 mg, comprimé pelliculé.
(Febuxostat)

Formes/Présentation :

ULORIC 40 mg, comprimé pelliculé, Boîtes de 30.
ULORIC 80 mg, comprimé pelliculé, Boîtes de 30.

Veuillez Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Composition quantitative et qualitative :

Pour un comprimé pelliculé : ULORIC 40 mg ULORIC 80 mg
Principe Actif : 40 mg 80 mg
Febuxostat

Excipients :

Lactose NF Fast flow, Cellulose microcristalline, Silice colloïdale dioxyde, Croscarmellose sodique, Stéarate de magnésium, hydroxypropylcellulose. Opadry OY- 37202 Dark Tan.

Excipients à effet notable : Lactose.

3. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITE :

ULORIC, comprimé pelliculé contient une substance active appelée « Febuxostat ». Celle-ci appartient à un groupe de médicaments nommés inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique.

4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Les comprimés d'ULORIC contiennent utilisées pour traiter la goutte, qui est une quantité excessive d'un composé à personnes, l'acide urique s'est accumulé trop élevé pour rester soluble. Ils peuvent former dans les articulations et les peuvent provoquer des douleurs et un gonflement d'une articulation déposés plus volumineux appelés tophi peuvent se former dans et autour des articulations. Ces tophi peuvent provoquer des lésions articulaires et osseuses. La concentration quotidienne d'ULORIC, le taux d'acide urique dans le sang (uricémie), peut diminuer progressivement. Les

- Envie impérieuse d'uriner
- Modification ou diminution de la quantité d'urine dues à une inflammation des reins (nephrite tubulo-interstitielle)
- Inflammation du foie (hépatite)
- Jaunissement de la peau (jaunisse)
- Lésion du foie

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

8. Mise en garde spéciales et / Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ULORIC, comprimé pelliculé :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant de prendre ULORIC, comprimé pelliculé :

- Si vous avez ou avez eu une insuffisance cardiaque ou des problèmes cardiaques
- Si vous avez ou avez eu une maladie des reins et/ou une réaction allergique grave à l'allopurinol (un médicament utilisé pour le traitement de la goutte)
- Si vous avez ou avez eu une maladie du foie ou une anomalie des paramètres de la fonction hépatique.
- Si vous êtes traité(e) pour une uricémie élevée due à un cancer ou un syndrome de Lesch-Nyhan (affection héréditaire rare, au cours de laquelle le taux d'acide urique dans le sang est trop élevé)
- Si vous avez des problèmes thyroïdiens.

En cas de réaction allergique à ULORIC, arrêtez de prendre ce médicament.

Les symptômes d'une réaction allergique au Fébuxostat peuvent être :

- Une éruption cutanée pouvant être des formes graves (avec des cloques, des nodules, des démangeaisons, une éruption exfoliative), des démangeaisons,
- Un gonflement des membres ou de la face,
- Une difficulté à respirer,
- De la fièvre avec un gonflement des ganglions lymphatiques.
- Mais également des manifestations allergiques graves, potentiellement fatales par arrêt cardiaque ou circulatoire.

Votre médecin peut décider l'arrêt définitif de votre traitement par ULORIC.

De rares cas d'éruption cutanée pouvant être fatales (syndrome de Stevens-Johnson), ont été observés. Ces réactions peuvent être mortelles. ULORIC, apparaissant au début de l'administration, peuvent être localisées ou des S.

au des parties génitales et également apparaître. Les réactions vers la formation de ulcers lors de l'utilisation de ULORIC n'ont jamais été réintroduites. Si vous avez des ulcers, vous devez cesser de prendre ce médicament.



LOT 1149297

MFG 08 2023

EXP 08 2025

SN IZQWXVE94AHQK0

PPV

103DH50

Si vous avez actuellement une crise de goutte (survenue subite de douleurs intenses, d'une sensibilité, d'une rougeur, d'une chaleur et d'un gonflement d'une articulation), attendez que la crise de goutte disparaîtse totalement avant de débuter le traitement par ULORIC. Chez certains

and Pentapoint are trademarks of
or its affiliates. ©2020 BD. All

являются товарными знаками
© 2020 BD и её дочерних

и товарными знаками Becton,
BD ії дочірніх компаній. Всі

нетоксично.
чения.
етоксично.
ування.
ытты емес.
ан.

е • Биопен • Biopen

Co
stri
sec
cti

IN
L
AH
B
b
p
2



BD Micro-Fine™ Plus

Pen Ne
نسولین
Kalem İ
Agulhas

Ypsopen, Dongbao Pen, Biomatik Pen

EN ISO 11608-2

REF 320497

LOT 2187374

2027-07



0382903204977

4 mm / 4 ММ

BD Micro-Fine™ Plus
BD Микро-Файн Плюс®

Pen Needles

ابر قلم الأنسولين

Kalem İğnesi

Akulhas para canetas

Еккіш-қаламға арналған ине

Голки для шприц-ручки

Иглы для шприц-ручки

Оригинальные расходные материалы

TM

BILAN BIOLOGIQUE

Le : 16/3/2024

Nom / Prénom : ABAKYE Hamed

Age :

Sexe : H F

Hématologie

- NFS
- Plaquettes
- VS
- CRP
- Hémoculture + Antibiogramme

Bilan martial

- Fer sérique
- CTF
- Ferritine
- Transferrine

Hémostase

- Temps de prothrombine
- TCK
- Fibrinogène
- INR

Bilan glycémique

- Glycémie à jeun
- HGPO
- Hémoglobine glyquée

Ionogramme sanguin

- Na⁺
- K⁺
- Cl⁻
- Ca⁺⁺
- Phosphore
- Mg⁺⁺
- Bicarbonates (HCO₃⁻)
- Urée
- Crétatnine
- Acide urique

Examen des urines

- Protéinurie des 24h
- ECBU + Antibiogramme

Autres :

Fonction hépatique et enzymologie

- Amylasémie
- Bilirubine libre et conjuguée
- Phosphatases ACIDES
- Phosphatases Alcalines
- Lactate Déshydrogénase LDH
- Transaminases ASAT, ALAT
- Gamma-GT
- CPK (Créatine Phosphokinase)
- Troponine
- Electrophorèse des protéines EPP

Sérologie et immunologie

- TPHA-VDRL
- Hépatite B
 - Antigène Hbs
 - Anticorps Anti-Hbs
 - Anticorps Anti-Hbc
 - Anticorps Anti-Hbe
- Hépatite C
 - Anticorps Anti-HVC
- Serologie Toxoplasmose
- Serologie Rubéole
- Facteur Rhumatoïde (Latex, Waaler Rose)
- Anticorps anti-nucléaires
- Anticorps anti-DNA natif
- ASLO
- Dosage du complément
- Serologie HIV

Examen parasitologique des selles + Coproculture

Bilan lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

Groupage sanguin et AC irréguliers

- ABO
- Rhésus
- RAI

Bilan de la fonction thyroïdienne

- T3
- T4
- TSH

Bilan de la fonction rénale

- Crétatnine
- Urée plasmatique

Exploration de la prostate

- PSA

Enzymes musculaires

- LDH
- CPK
- CPK-mb

Ionogramme urinaire

- Ca⁺⁺
- Phosphore
- Na⁺
- K⁺
- Cl⁻
- Urée
- Crétatnine

CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE LOUIZIA

Dr. HIND EL BAYED SAKALLI

Facture

N° facture 24-1730

Mohammedia , le 19/03/2024

Date de prélèvement 19/03/2024

Mr ABAKIL Hafed

Code Acte	Designation Acte	Cotation
NFS	NUMERATION FORMULE SANGUINE AVEC PLAQUETTES	80
GLY	GLYCEMIE	30
HBA1C	Hémoglobine glyquée	90
U	Urée	30
CREA	Créatinine	30
AU	Acide Urique	30

Total B	290
Total en dirhams	400,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre cent dirhams***

IF 45977059

ICE 002637614000076

INPE 093063717

LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUIZIA
RDC 60 F CEE Ben Yakklef
Centre Mohammedia
Tél: 05 23 33 78 78
Fax: 05 23 33 77 22

LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUIZIA
RDC 60 F CEE Ben Yakklef
Centre Mohammedia
Tél: 05 23 33 78 78
Fax: 05 23 33 77 22

CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE LOUZIA

Dr. HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résident au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologie au CHU Ibn Rochd

Du de Management de Qualité de l'université de BORDEAUX



مختبر الوليزية للتحاليل الطبية

د. هند البيض الصقلية

أخصائية تحاليل طبية

خريجة كلية الطب وصيدلة بالرباط

مقيمة سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

إجازة سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو فرنسا

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 19/03/2024



Mr ABAKIL Hafed

Demandé par Dr: LEILA BELHADI BENSAM

Prélèvement du: 19/03/2024 9:08

Page : 1 / 5

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE AVEC PLAQUETTES

Hématies	3,77	M/mm ³	(4,2 - 5,7)	4,02 (02/05/23)
Hémoglobine	11,5	g/dL	(14 - 17)	12,4 (02/05/23)
Hématocrite	36,4	%	(40 - 52)	38,5 (02/05/23)
VGM	97	fL	(80 - 100)	96 (02/05/23)
TCMH	31	pg	(27 - 32)	31 (02/05/23)
CCMH	32	%	(30 - 35)	32 (02/05/23)
Leucocytes	7 330	/mm ³	(4000 - 10000)	4840 (02/05/23)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles	64,0 %		(1500 - 7500)	2614 (02/05/23)
	Soit 4691	/mm ³	(1500 - 7500)	
Lymphocytes	24,7 %		(1500 - 4000)	1510 (02/05/23)
	Soit 1811/mm ³		(1500 - 4000)	
Monocytes	8,6 %		(100 - 900)	542 (02/05/23)
	Soit 630/mm ³		(100 - 900)	
Polynucléaires Eosinophiles	2,2 %		(50 - 500)	91,96 (02/05/23)
	Soit 161,26/mm ³		(50 - 500)	
Polynucléaires Basophiles	0,5 %		(Inférieur à 50)	82,28 (02/05/23)
	Soit 36,65/mm ³		(Inférieur à 50)	
Plaquettes	226 000	/mm ³	(150000 - 400000)	216 000 (02/05/23)

LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUZIA
Dr Hind EL BAYED SAKALLI
Spécialiste en Biologie Médicale
Lot Smikref N° 16000 Mohammedia
Tél. 05 23 33 78 78/Fax. 05 23 33 77 77
Bilan validé Biologiquement Le 19/03/2024

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1
Beni Yakhlef - Mohammedia
labolouzia@gmail.com

05 23 33 78 78
05 23 33 77 22
Urgence : 06 51 89 18 63

IF:45977059
ICE: 002637614000076
INPE :093063717

CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE LOUZIA

Dr. HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat
Ex Résident au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologie au CHU Ibn Rochd

Du Management de Qualité de l'université de BORDEAUX



مختبر الوليزيه للتحاليل الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

دكتورة هند البيض صيدلانية بالبرلمان

مقدمة سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

احيائنية سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو فرنسا

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 19/03/2024

Mr ABAKIL Hafed

Page : 2 / 5

BIOCHIMIE

GLYCEMIE

1,32
7,26 g/L
mmol/L

- Taux normal : de 0.60 à 1.10 g / L
- Diminution de la tolérance au glucose : de 1.10 à 1.26 g / L
- Sujet diabétique : > à 1.26 (sur deux pélevements distincts)



LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUZIA
Dr HIND EL BAYED SAKALLI
Spécialiste en Biologie
Lot Smikref N°1 Beni Yakhlef Mohammedia
Tél: 05 23 33 78 78 / Fax: 05 23 33 77 22

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1
Beni Yakhlef - Mohammedia
labolouzia@gmail.com

05 23 33 78 78
05 23 33 77 22
Urgence : 06 51 89 18 63

IF:45977059
ICE: 002637614000076
INPE :093063717

CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE LOUZIA

Dr. HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résident au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologie au CHU Ibn Rochd

Du Management de Qualité de l'université de BORDEAUX



مختبر الوليزي للتحاليل الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

دكتورة هند البيض الصقلي و ميدللة بالرباط

مقيمة سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

إبليانية سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو فرنسا

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 19/03/2024

Mr ABAKIL Hafed

Page : 3 / 5


BIOCHIMIE

Hémoglobine glyquée

(Technique : HPLC D10 -Biorad)

interprétation des résultats selon la standardisation du NGSP

- HbA1c entre 4 et 6 % : intervalle non diabétique normale.
- HbA1c inférieur à 6.5 % : excellent équilibre glycémique (DNID)
- HbA1c inférieur à 7 % : excellent équilibre glycémique (DID).
- HbA1c supérieur à 7 % : action corrective suggérée.



LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUZIA
Dr. Hind EL BAYED SAKALLI
Spécialiste en Biologie Médicale
Lot Smikref N°1, Beni Yakhlef, Mohammedia
Tél. 05 23 33 78 78 / 05 23 33 77 22
Bilan valide Biologiquement Le 19/03/2024

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1
Beni Yakhlef - Mohammedia
labolouzia@gmail.com

05 23 33 78 78
05 23 33 77 22
Urgence : 06 51 89 18 63

IF:45977059
ICE: 002637614000076
INPE:093063717

CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE LOUZIA

Dr. HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat

Ex Résident au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologie au CHU Ibn Rochd

Du Management de Qualité de l'université de BORDEAUX



مختبر الوعزية للتحاليل الطبية

د. هند البيض الصقلي

أخصائية تحاليل طبية

خريجة كلية الطب وصيدلة بالرباط

مقيمة سابقاً بالمستشفي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

إيجابية سابقاً بالمستشفي الجامعي ابن رشد

حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو فرنسا

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 19/03/2024

Mr ABAKIL Hafed


Page : 5 / 5

BIOCHIMIE

Acide Urique

48,2
286,8 mg/L
μmol/L

(35 - 70)
(208 - 416)



Dr HIND EL BAYED SAKALLI

LABORATOIRE d'Analyses
Médicales LOUZIA
Dr. Hind EL BAYED SAKALLI
Spécialiste en Biologie Médicale
Bilan validé Biologiquement Le 19/03/2024

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1
Beni Yakhlef - Mohammedia
labolouzia@gmail.com

05 23 33 78 78
05 23 33 77 22
Urgence : 06 51 89 18 63

IF:45977059
ICE: 002637614000076
INPE :093063717

CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE LOUZIA

Dr. HIND EL BAYED SAKALLI

Spécialiste en Biologie Médicale

Lauréate de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat
Ex Résident au CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancienne Biologie au CHU Ibn Rochd
Du Management de Qualité de l'université de BORDEAUX



مختبر اللوزية
للتحاليل الطبية
د. هند البيض الصقلي
أخصائية تحاليل طبية
خبرة كبيرة في مجال التحاليل الطبية وصيدلة بالرباط
مقيمة سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء
احيائنة سابقاً بالمستشفى الجامعي ابن رشد
حاصلة على دبلوم تسيير الجودة من جامعة بوردو فرنسا

BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Compte rendu d'analyses

Mohamedia le : 19/03/2024

Mr ABAKIL Hafed


Page : 5 / 5

BIOCHIMIE

Acide Urique

48,2
286,8 mg/L
μmol/L

(35 - 70)
(208 - 416)



Dr HIND EL BAYED SAKALLI

LABORATOIRE d'Analyses
Biologiques LOUZIA
Dr. HIND EL BAYED SAKALLI
Spécialiste en Biologie Médicale
Tél: 05 23 33 78 78 / Fax: 05 23 33 78 79
E-mail: labolouzia@gmail.com
Bilan valide Biologiquement Le 19/03/2024

Biologie de qualité à proximité

Lotissement Smikref N°1
Beni Yakhlef - Mohammedia
labolouzia@gmail.com

05 23 33 78 78
05 23 33 77 22
Urgence : 06 51 89 18 63

IF:45977059
ICE: 002637614000076
INPE :093063717