

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-505373

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : 1060		Société :	
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	MAKHLOUKI AHMED 202536
Nom & Prénom : MAKHLOUKI AHMED 202536			
Date de naissance : 01.01.1950			
Adresse : HAY DOUMA 96 Rue 10 N°41 S/RY			
Tél. : 06 41 61 08 34		Total des frais engagés : 620 DHS	

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> DR. OUDRHIRI NAIMA Expert Assermenté Derb Inani Rue 29 N°3 Hay Mohammadi - Casablanca Tél : 05 22 62 02 38 </div>			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade : MAKHLOUKI AHMED Age : _____			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : Diabète			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Diabète			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : **1/1/2024**

ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15			1500	INP : 09 M 6772
04				
10/2011	09 M 0226			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE DOLIMA 22, Bd. Hassan II, Casablanca Sidi Mountaz - Casablanca Tél.: 05 22 70 22 22	15-04-2014	577.10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

Docteur Naïma OUDRHIRI
MEDECINE GENERALE

Médecin Assermenté
Expert près les Tribunaux

الدكتورة نحيمة وعديري

الطب العام

طبيبة محلفة

خبيرة لدى المحاكم

PHARMACEUTIQUE D'OUIMA
22 Bd Annabéda Hay Douma
Sidi Moumen - Casablanca
Tél.: 05.22.70.26.40
الدكتورة نحيمة وعديري

85.00
x2

Casablanca. le

15-04-2024

11 Un Sulek.

MT



10 ut maf

10 ut

III 02



III 02

138.10 x 2

21 Pne 2an 100

51.40

31 A medri

Ne L



137.0

11c Dolip



000

66.10

15.20

Ne 26



577.40

00

Ne 18

DR. OUDHIRI NAIMA
DÉPOT ASSERMENTÉ - RUE 29 N°3
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél.: 05.22.62.02.35

I 100 UI/ml, suspensi
B0 100 UI/ml, suspensi
PIDE 100 UI/ml, solutio
insuline humaine ADNr

ILLISSEN INSULEN

La dénomination et le type d'insuline figurant sur l'étiquette et l'étiquette du flacon délivré par votre assurez-vous que vous avez la forme d'INSULINE **médecin**.
la posologie indiquée par votre médecin. En cas de
nécessité, demandez à votre pharmacien.

vous aura avisé du type d'insuline à utiliser, de la dose n. à. de son heure et de sa fréquence. Ces consignes vous sont réservées. Observez-les scrupuleusement et rendez-vous votre médecin.

INSULET NPH ou INSULET MIX 30 par une autre voie dans les 30 minutes suivantes. N'injectez jamais INSULET NPH ou INSULET MIX 30 par une autre voie. N'injectez jamais INSULET NPH ou INSULET MIX 30 par une autre voie.

avant utilisation, faites rouler le facon d'INSUL ET NPH ou plusieurs fois entre la paume des mains, afin de remettre l'insuline, jusqu'à ce qu'elle prenne un aspect uniformément clair. Si cet aspect n'est pas obtenu, répétez la procédure jusqu'à ce que le contenu du facon soit bien mélangé. **Ne pas** faire rouler le facon après l'avoir rempli car la formation d'une mousse pourrait gêner la

Il existe plusieurs méthodes pour prévenir l'apparition de l'acné. Les méthodes régulières ou si des particules d'acné sont présentes, il est préférable de consulter un dermatologue. Les méthodes régulières ou si des particules d'acné sont présentes, il est préférable de consulter un dermatologue.

LET: ordre de faire une injection dans les mains. **LET:** ordre à l'injection, nettoyez la peau selon les instructions qui sont avec. Nettoyez le bouchon en caoutchouc du flacon sans prendre une seringue et une nouvelle aiguille stériles pour

à 51 cm de la dernière injection et que vous observez une déplacemnts d'injection, comme on vous l'a apporté.

injection S.C.
ل حقن تحت الجلد
**Insuline humaine
biogénétique**
أ سولين ب شرطية

Flacon de 10 ml
قارورة من 10 مل

voie d'administration par voie intraveineuse

- INSULIN RAPIDE

• médicament vous l'a été

Prévention des maladies

- Immédiatement après l'INSULIN MIX 30 l'insuline en suspens trouble ou laitue ci-dessus jusqu'à agir vigoureusement.

utiliser si la suspen-
sion blanchies restent co-
mme aspect givré. Vérifiez
• INSULÉT RAPIDE
mélanger. Vous ne
lavez pas plus long-
temps que 10 minutes.

avant chaque injection. **Injection d'INSU** • Lavez-vous d'abord. • Avant de procéder l'on vous a donné toutefois le retirer.

peut le bouchon
Suivez les instructions
partagez pas vos aiguilles
on vous l'a appris
l'injection, laissez
assurer que vous a

distance d'au moins
" rotation " des en
• Votre médecin v
INSULÉT NPH. Si
l'INSULÉT RAPIDE
longue durée. Pro

- Des difficultés à les normer, parfois à faire prendre par l'AFFIRMATIV
- Informée en votre médecine, pharmacie
- Êtes-vous réellement tombé malade ?
- Avez-vous des problèmes deau ou de sel ?
- Faites-vous davantage d'exercice que vous n'en faites ?
- Vos besoins en sel sont-ils portés aux limites ?
- Si vous envisagez de vous rendre à médecine, pharmacie ou infirmerie
- Contrainte à modifier vos heures d'insomnie ou de sommeil
- Certains patients, avec un diabète cardiaque ou un antécédent d'acnéien

Classe pharmacothérapeutique :
Antidiabétique : Insuline humaine.

INSULINE (insuline humaine, ou insulinase bovine) est un hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. L'insuline est produite par les cellules beta de l'île de Langerhans dans le pancréas. Lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, l'insuline libère du pancréas libère de l'insuline dans le sang, ce qui aide à réguler le taux de sucre dans le sang. L'insuline est utilisée pour traiter le diabète de type 1 et le diabète de type 2. L'insuline est également utilisée pour traiter d'autres conditions médicales, telles que la maladie de Cushing et la maladie de Addison. L'insuline est une protéine qui est détruite par la chaleur et l'acidité, donc il doit être conservé dans un réfrigérateur à basse température. L'insuline est généralement administrée par injection sous-cutanée ou dans l'œil. L'insuline est également utilisée pour traiter d'autres conditions médicales, telles que la maladie de Cushing et la maladie de Addison. L'insuline est une protéine qui est détruite par la chaleur et l'acidité, donc il doit être conservé dans un réfrigérateur à basse température. L'insuline est généralement administrée par injection sous-cutanée ou dans l'œil.

INSULET RAPIDE est une préparation d'insuline d'action rapide.
INSULET NPH : Votre médecin peut vous prescrire **INSULET NPH** ainsi qu'une insuline d'action rapide.
INSULET MIX 30 : Votre médecin peut vous prescrire **INSULET MIX 30** ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée.
INSULET RAPIDE : Votre médecin peut vous prescrire **INSULET RAPIDE** ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée.

Si vous prenez une insuline à action rapide ou intermédiaire accompagnée d'une autre insuline. Ne changez pas, pas même une petite partie de votre autre insuline. Observez la plus grande dose d'insuline suivie de la plus petite dose d'insuline.

NE PAS UTILISER INSULINE :
1. Si vous estimez qu'une hyperglycémie (abaissement du niveau le sucre dans le sang) est imminente, il est indiqué plus loin dans ce chapitre, notice comment prendre en charge une hyperglycémie légère (voir paragraphe A à la rubrique 4).

- A la fréquence et à l'intensité de vos exercices physiques. Vous devrez également évidemment surveiller les niveaux de sucre dans votre sang grâce aux tests fréquents de votre glycémie.
- Quelques patients ayant présenté des hypoglycémies (abaissement du taux de sucre dans le sang) après passage d'une insulinothérapie à une dose normale humaine ont rencontré des symptômes analogues aux tests fréquents de votre glycémie.

PPV: 13 DH 70

Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent soluble
PARACÉTAMOL

PER 10/26
LOT M 3 6 5 4

ce car elle contient des informations importantes pour vous. Ce renseignement vous permet donc de soigner des maladies bénignes, vous devez utiliser Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent pour meilleur résultat. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de plus d'informations et de conseils, adressez vous à votre pharmacien ou persistant après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé effervescent sécable. Les autres composants sont : acide citrique, edta, mannitol, saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange. Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles dououreuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.



ZOLAM® 30 mg

Lansodrazole

CS0580



LOT : 23002
PPV : 66 DH 10
PER : 11/25

- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcération symptomatique par reflux gastro-oesophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.

ATTENTION

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie au lansoprazole ou à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mise en garde :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de suivre les prescriptions de votre médecin.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament avec précaution en cas d'affection chronique du foie et chez les enfants.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament au cours de la grossesse et de l'allaitement.

DE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT ;

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS ;

Ont été rapportés :

- de rares cas de diarrhée, nausée, vomissement, douleur abdominale, constipation;
- de rares cas de céphalées et exceptionnellement des sensations vertigineuses;
- de très rares cas de prurit, rash cutané, urticaire ;
- des cas isolés d'élévation réversible des transaminases ;
- des cas isolés de thrombopénie, leucopénie.

Ces manifestations, le plus souvent transitoires, sont d'intensité modérée et

PREZAR® 100 mg

an

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

ce médicament.

ez plus d'informations à votre médecin ou à votre
ez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de
z un effet indésirable non mentionné dans cette

Veuillez à
• Gé
• si
phar
• Ce
symp
• Si
notici

COMF
La sui
LOSART
Les aut
Lactose
sodique
Liste des ex

PPV 1308H10
YEP 1126
LOT M4117



100 mg

végétalatine, stéarate de magnésium, croscarmellose
pelliculé.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :
- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
 - Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5$ g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
 - Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC: médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par l'IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
 - Chez les patients présentant une hypertension et un épaisissement du ventricule gauche. PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants âgés de moins de 6 ans

PREZAR® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiant, glicatases et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan peut augmenter le passage de l'eau à travers le rein et/ou un débit d'urine efficace et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier pour les patients traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients âgés. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients avec une insuffisance rénale.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préconisé d'éviter le losartan pendant la grossesse).
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérite contenante de l'aliaskin.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® et contactez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démagogie, œdème, etc.) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer.
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients.
- Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR®.

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Étourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après un repas),
- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démagogie, œdème, etc.) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer.
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients.
- Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.
- Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR®.
- Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Faiblesse,
- Fatigue,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale et/ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques,
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la position assise,
- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium.
- Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :
- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Éruption (urticaire),
- Démangeaisons (prurit),
- Éruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux.

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,
- Angio-œdème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) incluant l'artérite périphérique,
- Engourdissement ou picotements (paresthesies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (tachycardie),
- Attaque cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT),
- Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :
- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexpliquée avec des urines foncées et/ou jaunâtres,
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,
- Troubles du goût (dysgueusie).

PREZAR® 100 mg

an

Comprimé pelliculé, Boîte de 28

ce médicament.

ez plus d'informations à votre médecin ou à votre
ez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de
z un effet indésirable non mentionné dans cette

Veuillez à
• Gé
• si
phar
• Ce
symp
• Si
notici

COMF
La sui
LOSART
Les aut
Lactose
sodique
Liste des ex

PPV 1308H10
YEP 1126
LOT M4117



100 mg

végétalatine, stéarate de magnésium, croscarmellose
pelliculé.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :
- Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
 - Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie $\geq 0,5$ g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
 - Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC: médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été stabilisée par l'IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
 - Chez les patients présentant une hypertension et un épaisissement du ventricule gauche. PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (Etude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants âgés de moins de 6 ans

PREZAR® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha- ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiant, glicatases et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

être utilisée (par exemple, 3 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg). Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, le losartan peut augmenter le passage de l'eau à travers le rein et/ou un débit d'urine efficace et/ou un bêtabloquant.

Posologie chez les groupes de patients particuliers

Le médecin pourra prescrire une dose plus faible, en particulier pour les patients traités par des diurétiques à doses élevées, ou les patients âgés. L'utilisation de losartan n'est pas recommandée chez les patients enceintes.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan ou à un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable de ne pas prendre PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérite contenante de l'aliaskien.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'effets indésirables, mais pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé et contactez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démarcation, œdème, etc.) peuvent entraîner des difficultés à avaler ou à respirer.

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plusieurs patients.

Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence si cela survient.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé :

- Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :
- Étourdissements,
 - Baisse de la pression artérielle (particulièrement après un repas),
 - Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques,
 - Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la position assise,
 - Faiblesse,
 - Fatigue,
 - Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
 - Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
 - Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,
 - Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
 - Élevation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium (peu fréquent),
 - Somnolence,
 - Maux de tête,
 - Troubles du sommeil,
 - Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
 - Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
 - Essoufflement (dyspnée),
 - Douleurs abdominales,
 - Constipation opiniâtre,
 - Diarrhée,
 - Nausées,
 - Vomissements,
 - Éruption (urticaire),
 - Démangeaisons (prurit),
 - Éruption cutanée,
 - Gonflement localisé (œdème),
 - Toux.

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,
- Angio-œdème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite) incluant l'artérite de l'aliaskien,
- Engourdissement ou picotements (paresthesies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation),
- Attaque cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élevation du taux de l'alanine amino-transférase (ALT),
- Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

 - Diminution du nombre de plaquettes,
 - Migraine,
 - Anomalies de la fonction hépatique,
 - Douleurs musculaires et articulaires,
 - Syndrome pseudo-grippal,
 - Douleur dorsale et infection urinaire,
 - Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
 - Douleur musculaire inexpliquée avec des urines foncées (nécrose musculaire),
 - Impuissance,
 - Inflammation du pancréas (pancréatite),
 - Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
 - Dépression,
 - Sensation générale de malaise,
 - Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement des oreilles,
 - Troubles du goût (dysgueusie).

