

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

W21-851027

Maladie       Dentaire       Optique       Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 13507 Société : RAM

Actif       Pensionné(e)       Autre : 202889

Nom & Prénom : LAHLALI HATIM

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0685508756 Total des frais engagés : 595,12 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 13/04/2011

Nom et prénom du malade : LAHLALI HATIM Age: 65

Lien de parenté :  Lui-même       Conjoint       Enfant

Nature de la maladie : TRAUMES

Affection longue durée ou chronique :  ALD     ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / / Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : R. ACCUEIL I. BOUZZACHANE



## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19/04/2024	CPA		3000	L'EMTIRI Hassan Assiste Réanimateur N° DE CASABLANCA ADL et Rue N° 2 Bérets-Polo Casablanca

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr Adnane BUDAH 10 Boulevard Choueiri Bey Dakar - Casamance Tel 05 26 00 00 72	12/04/2012 24	295,00 VTCOCLIQ Avenue Rue de Partier Bagatelle 3228211

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.



# مصحة الجهاز العصبي

## NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

PHARMACIE OUM ERRABII

Dr Adnane BIDAH /

49, Boulevard Oum Errabii Hay El Oued  
El Oued - Casablanca - Tel: 05 22 89 88 72

Casablanca, le 15/04/24

Docteur :

M<sup>r</sup> LATHLAZ Hafsa

14,80x2 Systen mousse Max 41; gel vers  
12,50 Gel 10<sup>g</sup> libertin gel  
10,80 gel 15 bain ap  
39,5,40 Dr 3mz  
29,5,40 Dr 21<sup>g</sup> Dr. ZEMMOUI Ahmed-Adn  
Chirurgien Urologue  
Appt 2, 1er Etage Imme 031  
Bd. Oum Rabia Oufia Casablanca  
Tél: 0522.89.38.37

Dr Adnane BIDAH /  
49, Boulevard Oum Errabii Hay El Oued  
Casablanca - Tel: 05 22 89 88 72

# Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

comprimé sécable

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### COMPOSITION

Paracétamol .....  
Phosphate de codeïne hémihydraté .....  
(Quantité correspondant à codeïne base)  
Excipients : gélatine, acide stéarique, ami-

PPV: [REDACTED] 20,80 mg

PER: 09/25

LOT: M2958

## FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

### ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée, l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

**Codoliprane®**

Paracétamol / Codéine  
**400 mg/20 mg**

16 Comprimés sécables

par



## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine.  
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

## PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS. Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codeïne. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).



# LIBOSTIM

VITALITE

GINSENG • GUARANA • VIT C • CAFEINE

## PROPRIETES :

Ginseng : Stimulant adaptogène psychique et sexuel.

Guarana : Stimulant physique et de l'organisme.

Caféine : Augmente la vigilance.

Vitamine C : Antioxydant, vitamine à la production énergétique du



## COMPOSITION (en mg par gélule de 300 mg)

Ingrédient	En mg par gélule de (300 mg)	Teneur/gél	%AJR/gél	%AJR Total pour 2gél
Ginseng Rouge Racine	19,00 mg			
Guarana Graine P300	19,00 mg			
Acerola Fruit P300	19,00 mg			
25% Vitamine C				
Cafeine Anhydre	9,00 mg			
Vitamine C	45,00 mg	49,7 mg	82,9 %	166 %
Maltodextrine	189,00 mg			

Gélule en Gélatine bovine certifiée halal.

## CONSEILLE POUR :

- Stimuler et Tonifier l'organisme

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**  
**SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et SEPCEN® 750 mg**  
**Boîte de 10 comprimés pelliculés**  
**D.C.I : Ciprofloxacin**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne.
- Si l'un des effets indésirables devient grave en cas de symptômes identiques, cela pourra dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

**• Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que SEPCEN® et dans quels cas
2. Quelles sont les informations à connaître à
3. Comment prendre SEPCEN® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver SEPCEN® ?
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS CAS**

**Classe pharmacothérapeutique :** Fluoroquinolone - code ATC : S01A

SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacin. La ciprofloxacin est un antibiotique appartenant à la famille de bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur ces bactéries.

**Chez l'adulte :**

SEPCEN® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

**Chez l'enfant et l'adolescent :**

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
- Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
- Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?**

**• Ne prenez jamais SEPCEN® :**

• Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans SEPCEN® (voir rubrique 6).

• Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

**• Mise en garde et précaution d'emploi :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCEN® :

Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

**Adressez-vous à votre médecin avant de prendre SEPCEN® :**

• Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;

• Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;

• Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;

• Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacin risque de vous occasionner une hypoglycémie ;

• Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;

• Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacin peut vous occasionner une anémie ;

• Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement " d'un gros vaisseau sanguin (anevrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;

• Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;

• Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

maladie de Behcet, l'hypertonie artérielle (une maladie des artères) ou une hypertension artérielle (une maladie des artères) avec ou sans hypertension artérielle) avec ou sans anomalies cardiaques (comme l'insuffisance cardiaque ou l'arrhythmie). Si vous avez une maladie cardiaque, il est recommandé de faire une échographie cardiaque avant de prendre SEPCEN®.

L U : 05323334  
P E R : 11/2025  
P P V : 74,80 DH

**SEPCEN® 500 mg**

ciprofloxacin

10 comprimés pelliculés



6 118000 230182

\* Une douleur dans les tendons peuvent survoler (environ 1 mois), si vous avez eu une blessure ou un traitement par des corticoïdes dans les dernières 48 heures. Dès les premiers signes de douleur dans le poignet, du coude, du bras ou de la cuisse, et mettez le membre au repos et évitez la rupture d'un tendon.

\* Si vous ressentez une douleur dans les tendons qui peuvent être douloureux immédiatement au serrage de la main ou avec des corticoïdes.

\* Si vous ressentez une douleur dans les tendons, ou si vous remarquez une nouvelle apparition de douleur dans les tendons, vous devez en informer votre médecin.

\* Si vous souffrez d'épilepsie, il existe un risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) qui peut produire. Si tel était votre cas, il existe un risque.

\* Dans de rares cas, il existe un risque de sensation de brûlure, de douleur ou de gêne dans la partie supérieure de la cuisse qui peut survenir, en particulier lorsque vous prenez SEPCEN®. Si cela se produit, arrêtez de prendre SEPCEN®.

\* Des réactions psychotiques peuvent survenir, y compris la souffrance de dépression, de confusion mentale ou de délire. Si cela se produit, arrêtez de prendre SEPCEN®. Si cela se produit, arrêtez de prendre SEPCEN®.

\* Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones peuvent augmenter le niveau de sucre dans le sang au-delà de ce qui est normal (hypoglycémie) dans certains cas. Il est important de prendre SEPCEN® avec un repas.

\* Vous pouvez souffrir d'effets secondaires, tels que des diarrhées, ou d'effets indésirables immédiatement de prendre SEPCEN®. Si vous avez des effets indésirables immédiatement de prendre SEPCEN®, arrêtez de prendre SEPCEN®.

\* Si vous avez des troubles de la vision, arrêtez de prendre SEPCEN®. Si vous avez des troubles de la vision, arrêtez de prendre SEPCEN®.

\* Votre peau devient rouge ou jaune lorsque vous prenez SEPCEN®. Evitez de prendre SEPCEN® si vous avez déjà eu une réaction allergique à SEPCEN® ou à d'autres médicaments utilisés dans les dernières semaines.

\* Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez le chirurgien de vos antécédents médicaux, y compris SEPCEN®. Si vous avez des antécédents médicaux, informez le chirurgien de vos antécédents médicaux, y compris SEPCEN®.

\* SEPCEN® peut provoquer des effets indésirables, tels que la constipation, la diarrhée, la nausée, la vomissement, la perte d'appétit, l'ictère (jaunissement de la peau et des yeux), l'urine jaune, l'arrêt de prendre SEPCEN®.

\* SEPCEN® peut entraîner des effets indésirables, tels que la constipation, la diarrhée, la nausée, la vomissement, la perte d'appétit, l'ictère (jaunissement de la peau et des yeux), l'urine jaune, l'arrêt de prendre SEPCEN®.





# مصحة الجهاز العصبي

## NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

Casablanca, le .....

**19 AVRIL 2024**

Docteur :

**FACTURE N° 0089/4/24**

NOM DU PATIENT : MR LAHLALI HATIM

CONSULTATION PRE ANESTHESIQUE

MONTANT GLOBAL : 300,00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :  
« TROIS CENTS DIRHAMS »

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA  
Angle rue de l'Isere et rue N° 2, Quartier Bagatelle - Polo - Casablanca  
Tél.: 05 22 82 11 11 (L.G)  
Quartier Bagatelle Casablanca  
Tél.: 05 22 82 11 11 (L.G)

# LAHLALI HATIM


Name: Patient ID: 2024041914595700  
Request Dept:

Gender:  
Bed No.:

+++++ Analysis Result +++++  
151: Dextrocardia(Re-examination)?  
BorderlineAbnormal

HR : 66 bpm  
PR : 142 ms  
QT/QTC : 419/439 ms  
RV5/SV1: 1.085/0.872 mV  
RV6/SV2: 0.878/1.313 mV

Pd : 115 ms  
QRS : 110 ms  
P/QRS/T: 102/106/117 °  
RV5+SV1: 1.957 mV



10 mm/mV 25 mm/s AC:50 Hz 0.67Hz 35 Hz

Exam. time: 2024/04/19,15:04:48 Print time: 2024/04/19,15:04:49 Report Confirmed by:

ECG-1112L CWEKG\_SLA\_V1.0 V2.1.1.14.9 This report is for the clinician's reference only and is not intended as a final proof of diagnosis!