

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

202709

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 002027

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : JALAL MOHAMED

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 066 793 16 71 Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. KHALID MABCHOURI

CARDIOLOGUE

76, Bd. La Grande Ceinture

Hay Mohammadi - CASABLANCA

Tél: 05 22 63 87 50

Date de consultation : 18/04/2024

Nom et prénom du malade : EL MOURABIT FATIMA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : HTA

HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

18 AVR. 2024

Dr. KHALID MABCHOURI
CARDIOLOGUE
76, Bd. La Grande Ceinture
Hay Mohammadi - CASABLANCA
Tél: 05 22 63 87 50

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/04/2026	CS + ECG	300 D.H		DR. KHALID MARCHAOURI CARDIOLOGUE 15 Bd. La Grande Ceinture Mohammadi - CASABLANCA Tél: 05 22 63 87 50

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	PHARMACIE BENMOUSSA Montant de la Facture 26, Av. Cdt. Driss El Harti Jamila 3 - Cité Djémâa Tél : 0522 37 38 67 - CASABLANCA
PHARMACIE BENMOUSSA 26, Av. Cdt. Driss El Harti Jamila 3 - Cité Djémâa Tél : 0522 37 38 67 - CASABLANCA	12/04/24	979,50

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of the dental arch showing				

CABINET DE CARDIOLOGIE ET DES EXPLORATIONS CARDIOVASCULAIRES

DR. KHALID MABCHOURI

Spécialiste des maladies
du cœur, des vaisseaux
et de l'hypertension artérielle

Echo-Doppler cardiaque et vasculaire
Holter Rythmique, M.A.P.A
Epreuve D'effort

الدكتور خالد مبشوري صيدلية بنموسى

PHARMACIE BENMOUSSA

26, Av. Cdt. Driss El Harti
Jamila 3 - Cité Djémâa
Tél : 0522 37 38 67 - CASABLANCA

إخلاصي في أمراض القلب
الشرايين وارتفاع الضغط الدموي

الفحص بالصدى والدوبلير

تسجيل تخطيط القلب والضغط الدموي تسجيل تخطيط القلب والضغط الدموي

Casablanca le : 18/04/2024 الدار البيضاء في : >

Mme EL MOURABIT FATIMA

333,30 1 - BIPRETERAX 5 mg / 1.25 mg

Chaque Jour(s), 1 comprimé le matin,

(111, 70x3)

83,10 2 - CARDIOASPIRINE 100 mg

Chaque Jour(s), 1 comprimé à midi,

(27,70x3)

173,40 3 - LD-NOR 10mg

Chaque Jour(s), 1 comprimé le soir,

(57,80x3)

4 - INESO 20 mg

1 Gélule par jour

(29,90x3)

5 Régime peu salé

Régime peu salé . Traitement de trois mois

صيدلية بنموسى
PHARMACIE BENMOUSSA

26, Av. Cdt. Driss El Harti
Jamila 3 - Cité Djémâa

Tél : 0522 37 38 67 - CASABLANCA

979,50

صيدلية بنموسى

PHARMACIE BENMOUSSA

26, Av. Cdt. Driss El Harti

Jamila 3 - Cité Djémâa

Tél : 0522 37 38 67 - CASABLANCA

صيدلية بنموسى
PHARMACIE BENMOUSSA
26, Av. Cdt. Driss El Harti
Jâmila 3 - Cité Djémâa
Tél: 0522 37 38 67 - CASABLANCA

Dr. KHALID MABCHOURI
CARDIOLOGIE
76, Bd. La Grande Ceinture
Hay Mohammadi - CASABLANCA
Tél: 05 22 63 87 50

Important : Prenez vos traitements régulièrement et à la dose prescrite. N'arrêtez pas et ne modifiez pas les doses de votre traitement seul : cela peut être dangereux pour votre santé.

بيريتيراكس® أرجينين 5 ملغم/500 ملغ

حيات ملسة

بيراندوبريل أرجينين/ إندايميد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستناد إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.
- إذا شعرت به، آثار جانبية تكاملية للدواء أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة (أنظر إلى

• الأدوية المستعملة في علاج داء السكري مثل الأنسولين، المثبورين والغليتين،
• الكالسيوم بما في ذلك مكملات الكالسيوم،
• المضادات المنشطة (مثلاً temé).

• مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية (مثل ibuprofène)، أو الأدوية الممحوحة على مقدار كبير من السالبيتالات (مثل بعض الأستيريل سالبيتال (lamotrigine) التي توجد في العديد من الأدوية التي تستعمل لتخفيف الألم وغضق العرارة، بالإضافة إلى منع تهاب الدم)).

• أفيغوتيريسين B amphotéricine B (العلاج الإصبات الطيرية الشديدة)،
• الأدوية المستعملة في علاج القسطريات النفسية مثل الكتاب، أو القلق، أو القضم مثل مضادات الكتاب

• الثلاثي الحلقات، أو مضادات النهان (مثل أميسوبوريد، سولبوريد، سولبوريد، تابوريد، هالوبوريدول)، (دوبيوريدول)،

• تيروكوكبيك tetracosactide (العلاج هرمون كرون (maladie de Crohn

• ترياميتوبريرم (العلاج حالات العدوى)،
• موسعات الشريان المخوري بما فيها مضادات الترثبات (المستحضرات التي من شأنها توسيع الأوعية الدموية)،

• أدوية تستعمل لعلاج الضغط الشرياني المنخفض، الصدمة أو الريو (مثل إفراديل، نورادرالين أو أدررينالين)،

• بيريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ 1.25 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة مع الطعام والشراب

• من المستحسن أخذ بيريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة قبل وجبة الطعام.

الحمل والإرضاع
إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخطلين للإنجاب، راجعي الطبيب أو الصيدلاني

قبل المباشرة بتعاطي هذا دواء.

يجب أن تلتقي طبسك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو ألاك قد تصبحين) حاملاً.

وفي أي حالة يستعمل؟
أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟
ملستة؟

حيات ملستة؟

حيات ملستة وفي أي حالة يستعمل؟
C09BA04 ATC: C09BA04

ت ملستة مبكرة عن مزيج من مادتين فعاليتين: بيراندوبريل

شراب، ويوجف لعلاج المفطر الشرياني لدى البالغين،

الإzyme المحوّل للأجروجين (IEC). وتقوم هذه المادة بتوسيع

أي ضيق الدم.

الإندايميد مذلل البوال. وإن مقدار البوال بدراجة ضئيلة. بهذا تقوم هاينز هالدين المعالين في

تفعيل المفطر الشرياني وتعطى مع الأدوية المذكورة.

2. ما هي المعلومات المفروض معرفتها قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

لا يجوزوز الإطلاق إستعمال بيريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة.

3. ما هو بيريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

الفلة العلاجية.

4. ما هو بيريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

بيراندوبريل، وهو مصن

يبتني بيراندوبريل إلى

الأوعية الدموية مساعدة

الإندايميد مذلل البوال. وإن مقدار البوال بدراجة ضئيلة. بهذا تقوم هاينز هالدين المعالين في

تفعيل المفطر الشرياني وتعطى مع الأدوية المذكورة.

5. ما هي المعلومات المفروض معرفتها قبل أخذ بيريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

إن كنت تعانى من حساسية تجاه بيراندوبريل، أو من صنف آخر من مثبطات الإzyme المحوّل

لأجروجين، أو من الإندايميد، أو من تسامقين آخر، أو من آية مادة أخرى تدخل في ترسيب هذا

الدمة (أثيل، المطبل، مجهته، السيدة وملستة لملستة).

بيبريتيراكس® أرجينين 5 ملغم/500 ملغ

حيات ملسة

بيبراندوبيريل أرجينين/ إنداباميد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لستفيد إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.
- إذا شعرت به، آثار جانبية تكاملية للدواء أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة (أنظر إلى

• الأدوية المستعملة في علاج داء السكري مثل الأنسولين، المثبورين والغليتين.

• الكالسيوم بما في ذلك مكملات الكالسيوم.

• المسقلات المنشطة (مهاستنـ[®] senesـ[®]).

• مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية (مثل ibuprofene)، أو الأدوية الممحوحة على مقدار كبير من السالبيتالات (مثل بعض الأستيبل سالبيتال (lamotrigine) التي توجد في العديد من الأدوية التي تستعمل لتخفيف الألم وغضق العرارة، بالإضافة إلى منع تغث الدم)).

• أفيغوتيريسين B amphotéricine B (العلاج الإصبات الطيرية الشديدة).

• الأدوية المستعملة في علاج القصطريات النفسية مثل الكتاب، أو القلق، أو القمام مثل مضادات الكتاب الثلاثية الحلقات، أو مضادات النهان (مثل أميسوبوريد، سولبوريد، سولبوريد، تابوريد، هالوبوريدول)، دروبوريدول).

• تيروكوكبيك tetracosactide (العلاج هرمون كرون (maladie de Crohn

• تريامينوبوريرم (العلاج حالات العدوى).

• مساعات العصبية المخوية بما فيها مشتقات الترتات (المستحضرات التي من شأنها توسيع الأوعية الدموية).

• أدوية تستعمل لعلاج الضغط الشرياني المنخفض، الصدمة أو الريو (مثل إفديرون، نورادرينالين أو أدررينالين).

بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة قبل وجبة الطعام.

من المستحسن أخذ بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة قبل وجبة الطعام.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخطلي للإنجاب، راجعي الطبيب أو الصيدلاني قبل المباشرة بتعاطي هذا دواء.

يجب أن تلتقي طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو ألاك قد تصبحين) حاملاً.

وفي أي حالة يستعمل؟
أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

حيات ملستة؟

حيات ملستة وفي أي حالة يستعمل؟
C09BA04 ATC: C09BA04

ت ملستة مبكرة عن مزيج من مادتين فعاليتين: بيبراندوبيريل

شراب، ويوجف لعلاج المغص الشرائي لدى البالغين.

الإzyme المحوّل للأجروجين (IEC). وتقوم هذه المادة بتوسيع

أي ضخم الدم.

الإنزاميد مذيل للبول. وإن مقدار البيول بول بدرجة ضئيلة. بهذا تقوم هاينز هالدين المعالين في

تفصيل المغص الشرائي وتعمان بما ينتمي إلى.

بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

ما هي المعلومات المفروض معرفتها قبل أخذ بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

لا يجوزوز الإطلاق إستعمال بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة.

3,100

5. تكلفة
6. محتوى

7. ما هو بيبر

8. الشلة العلاجية

9. إن بيبريتيراكس أرج

10. والإنداباميد. وهو مضم

11. ينتهي بيبراندوبيريل إل

12. الأوعية الدموية مهملة

13. الإنزاميد مذيل للبول.

14. عن بقية مركبات البيول، بحيث أنه يرفع مقدار البيول بدرجة ضئيلة.

15. بهذا تقوم هاينز هالدين المعالين في

بيبريتيراكس® أرجينين 5 ملغم/500 ملغ

حيات ملسة

بيبراندوبيريل أرجينين/ إنداباميد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لستفيد إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.
- إذا شعرت به، آثار جانبية تكاملية للدواء أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة (أنظر إلى

• الأدوية المستعملة في علاج داء السكري مثل الأنسولين، المثبورين والغليتين.

• الكالسيوم بما في ذلك مكملات الكالسيوم.

• المسقلات المنشطة (مهاستنـ[®] senesـ[®]).

• مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية (مثل ibuprofene)، أو الأدوية الممحوحة على مقدار كبير من السالبيتالات (مثل بعض الأستيبل سالبيتال (lamotrigine) التي توجد في العديد من الأدوية التي تستعمل لتخفيف الألم وغضق العرارة، بالإضافة إلى منع تغث الدم)).

• أفيغوتيريسين B amphotéricine B (العلاج الإصبات الطيرية الشديدة).

• الأدوية المستعملة في علاج القصطريات النفسية مثل الكتاب، أو القلق، أو القمام مثل مضادات الكتاب الثلاثية الحلقات، أو مضادات النهان (مثل أميسوبوريد، سولبوريد، سولبوريد، تابوريد، هالوبوريدول)، دروبوريدول).

• تيروكوكبيك tetracosactide (العلاج هرمون كرون (maladie de Crohn

• تريامينوبوريرم (العلاج حالات العدوى).

• مساعات العصبية المخوية بما فيها مشتقات الترتات (المستحضرات التي من شأنها توسيع الأوعية الدموية).

• أدوية تستعمل لعلاج الضغط الشرياني المنخفض، الصدمة أو الريو (مثل إفديرون، نورادرينالين أو أدررينالين).

بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة قبل وجبة الطعام.

من المستحسن أخذ بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة قبل وجبة الطعام.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخطلي للإنجاب، راجعي الطبيب أو الصيدلاني قبل المباشرة بتعاطي هذا دواء.

يجب أن تلتقي طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو ألاك قد تصبحين) حاملاً.

وفي أي حالة يستعمل؟
أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

حيات ملستة؟

حيات ملستة وفي أي حالة يستعمل؟
C09BA04 ATC: C09BA04

ت ملستة مبكرة عن مزيج من مادتين فعاليتين: بيبراندوبيريل

شراب، ويوجف لعلاج المغص الشرائي لدى البالغين.

الإzyme المحوّل للأجروجين (IEC). وتقوم هذه المادة بتوسيع

أي ضخم الدم.

الإنزاميد مذيل للبول. وإن مقدار البيول بول بدرجة ضئيلة. بهذا تقوم هاينز هالدين المعالين في

تفصيل المغص الشرائي وتعمان بما ينتمي إلى.

بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

ما هي المعلومات المفروض معرفتها قبل أخذ بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة؟

لا يجوزوز الإطلاق إستعمال بيبريتيراكس أرجينين 5 ملغم/500 ملغ، حبات ملستة.

3,100

5. تكلفة
6. محتوى

7. ما هو بيبر

8. الشلة العلاجية

9. إن بيبريتيراكس أرج

10. والإنداباميد. وهو مضم

11. ينتهي بيبراندوبيريل إل

12. الأوعية الدموية مهملة

13. الإنزاميد مذيل للبول.

14. عن بقية مركبات البيول، بحيث أنه يرفع مقدار البيول بدرجة ضئيلة.

15. بهذا تقوم هاينز هالدين المعالين في

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose de suspect, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

O

ble non



1 090280



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se décompose pas dans l'estomac. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique. Il faut prendre CardioAspirine sur ordonnance du médecin.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose de suspect, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



table non



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se décompose pas dans l'estomac. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique. Il faut prendre CardioAspirine sur ordonnance du médecin.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose de suspect, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

O

ble non



1 090280



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se décompose pas dans l'estomac. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique. Il faut prendre CardioAspirine sur ordonnance du médecin.

LD-NOR®

10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quel contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexpliqués,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable,
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral,
- si vous avez des problèmes des reins,
- si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie),
- si vous avez, présentée dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexpliquées, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires,
- si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrat),
- si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool,
- si vous avez des antécédents de maladie du foie,
- si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par LD-NOR afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de rhabdomyolyse, peut être majoré en cas de prise simultanée de certains médicaments avec LD-NOR (voir « Autres médicaments et LD-NOR, comprimé pelliculé »).

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie de 10 ans ou plus. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche pour avis.

Si vous oubliez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.

- Faiblesse musculaire, sensation douloureuse, douleur ou rupture musculaire/sou coloration rouge-brun de l'urine associée à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après l'arrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

- La présence importante ou inhabituelle de saignements ou d'hématoques, consultez votre médecin dès que possible.

Syndrome d'effets secondaires multiples

Autres : consultez votre médecin si vous présentez des effets sur les cellules sanguines),

Fréquents

- Infl.

- réa

- ai

- atte

- m

- ni

- d

- r

- p

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

- d

<p

LD-NOR®

10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quel contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexpliqués,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable,
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral,
- si vous avez des problèmes des reins,
- si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie),
- si vous avez, présentée dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexpliquées, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires,
- si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrat),
- si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool,
- si vous avez des antécédents de maladie du foie,
- si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par LD-NOR afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de rhabdomyolyse, peut être majoré en cas de prise simultanée de certains médicaments avec LD-NOR (voir « Autres médicaments et LD-NOR, comprimé pelliculé »).

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie de 10 ans ou plus. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche pour avis.

Si vous oubliez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.

- Faiblesse musculaire, sensation douloureuse, douleur ou rupture musculaire/sou coloration rouge-brun de l'urine associée à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après l'arrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

- La présence importante ou inhabituelle de saignements ou d'hématoques, consultez votre médecin dès que possible.

Syndrome d'effets secondaires graves

Autres : consultez votre médecin si vous présentez des effets sur les cellules sanguines).

Fréquents

- Infl.

- réa.

- ai

- atte.

- m.

- n.

- d.

- r.

- p.

- d.

-

Dr MABCHOURI Khalid

Nom : EL MOURABIT FARTIMA

Sexe : Femme

Clini:

Age : 78Y

Lit:

SN:0013088

Servi:

Date:18/04/2024 13:01:20

Cas:

Fréquence : 1000 Hz | Intervalle PR 182 ms
 Temps d'échantillon 13 s | Intervalle QT 432 ms
 HR: 70 bpm | Intervalle QTc 468 ms
 Intervalle P 96 ms | Axe P 61,35°
 Intervalle QRS 112 ms | Axe QRS 59,97°
 Intervalle T 252 ms | Axe T 69,49°

Prompt:
 Puls. totals 13 , Rythme normal 13 , SVE 0 , VE 0

Dr. KHALID MABCHOURI
CARDIOLOGUE
 76, Bd. La Grande Ceinture
 Hay Mohammadi - CASABLANCA
 Tél: 05 22 63 87 50

Signature du médecin :

