

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

6127

Société :

12.11.17  
202964

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

LATTAZI

Yolande

Date de naissance :

18/09/1963

Adresse :

beb. t-elle

Tél. : 066108420

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

12/08/08

Nom et prénom du malade :

LATTAZI YOLANDE

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

XTIA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 25/08/2011

Signature de l'adhérent(e) :

YOLANDE LATTAZI

#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

#### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Formulateur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Ouled Djahid Dr. ABDI Ibrahima El Fida 1260 Ain Chicha Tunisie Tél: 0049540000015 Fax: 092047455	12/12/2021	2163,20

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

#### RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'UDF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				COEFFICIENT DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DEBUT D'EXECUTION												
				FIN D'EXECUTION												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	<p><b>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</b></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> </table> <p><b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	35533411	11433553	G	00000000	00000000
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	35533411	11433553														
G	00000000	00000000														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DATE DU DEVIS												
				DATE DE L'EXECUTION												

# Docteur Kadi Anis

## CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine de  
L'université d'état Lomonossov de Moscou

Ex-interne du Centre de Recherche  
Cardiovasculaire Bakulev



الدكتور قاضي أنيس  
أمراض القلب و الشرايين

خريج كلية الطب بجامعة  
موسكو الحكومية لومونسوف

خريج مركز أبحاث القلب  
والأوعية الدموية باكولف

### Cabinet d'Explorations Cardio-Vasculaire

Casablanca, Le ..... الدار البيضاء في

12/02/2024

MR LAMAIZI MOHAMMED

16870 X3  
• **Micardis 40 mg**

1 comprimé, matin, pendant 3 mois



270100X4  
• **Coplavix 75mg/100mg**

1 comprimé, matin, pendant 3 mois ou Association Ceruvin 75mg +  
Cardioaspirine 100mg




50700X3  
• **Cardensiel 2,5 mg**

1 comprimé, matin, pendant 3 mois



79,00 X3  
• **Tahor 10 mg**

1 comprimé, soir, pendant 3 mois



Pharmacie Ouled Ziane

Dr. ASRI Ilhame  
Bd. El Hida 1250 Aïn Chicha 3  
Casablanca - Tél: 0522 852 959  
ICE: 000495490000015  
INPE: 092047455

160,5

Traitement à renouveler dans trois mois après consultation chez le médecin traitant.

Docteur KADI ANIS  
CARDIOLOGUE  
Im. Center Rue Arrachid Med Etg 7 N°2  
CASABLANCA 20110

📞 +212 5 22 31 53 48 📞 URGENCE +212 6 61 41 57 72 @ [cardiokad@gmail.com](mailto:cardiokad@gmail.com)

IMAN CENTER Rue Arrachid Mohamed, Étage 7<sup>ème</sup>, N°2 (Angle Av. des Forces Armées Royale)  
CASABLANCA 20110  
مركز إيمان زنقة الرشيد محمد (زاوية شارع الجيش الملكي) الطابق 7، رقم 2، الدار البيضاء 20110

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable dans cette notice. Voir rubrique 4.

# Micardis®

## 40 mg

### comprimés

Telmisartan

#### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Micardis et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Micardis
3. Comment prendre Micardis
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Micardis
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Micardis et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

**Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression artérielle élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression artérielle élevée n'a pas de cause connue.**

Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'hypertension artérielle peut causer des lésions



6 118001 040230

MICARDIS 40mg  
28 comprimés

BOTTU S. A

PPV: 168 DH 80

Ingelheim

PO320

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorthiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemment contrôlée.

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle ne doit pas dépasser 40 mg par jour.

#### Si vous avez pris plus de Micardis que vous n'auriez dû

Si vous prenez accidentellement une dose trop importante de Micardis, prévenez votre médecin, votre pharmacien, ou le service d'urgence de l'hôpital le plus proche.

#### Si vous oubliez de prendre Micardis

Si vous oubliez de prendre votre comprimé de Micardis, n'ayez pas d'inquiétude. Prenez-le dès que possible et continuez votre traitement normalement. Si vous ne prenez pas de comprimé pendant 24 heures, prenez la dose habituelle le lendemain.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable dans cette notice. Voir rubrique 4.

# Micardis®

## 40 mg

### comprimés

Telmisartan

#### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Micardis et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Micardis
3. Comment prendre Micardis
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Micardis
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Micardis et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression artérielle élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression artérielle élevée n'a pas de cause connue.

Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'hypertension artérielle peut causer des lésions



6 118001 040230

MICARDIS 40mg  
28 comprimés

BOTTU S. A. PPV: 168 DH 80

Ingelheim

PO320

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorthiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemment contrôlée.

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle ne doit pas dépasser 40 mg par jour.

#### Si vous avez pris plus de Micardis que vous n'auriez dû

Si vous prenez accidentellement une dose trop importante de Micardis, prévenez votre médecin, votre pharmacien, ou le service d'urgence de l'hôpital le plus proche.

#### Si vous oubliez de prendre Micardis

Si vous oubliez de prendre votre comprimé de Micardis, n'ayez pas d'inquiétude. Prenez-le dès que possible et continuez votre traitement normalement. Si vous ne prenez pas de comprimé pendant 24 heures, prenez la dose habituelle le lendemain.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable dans cette notice. Voir rubrique 4.

# Micardis®

## 40 mg

### comprimés

Telmisartan

#### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Micardis et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Micardis
3. Comment prendre Micardis
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Micardis
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Micardis et dans quel cas est-il utilisé

Micardis appartient à une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine II est une substance produite naturellement par le corps humain et capable de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Micardis bloque cet effet de l'angiotensine II, ce qui permet une relaxation des vaisseaux sanguins et conduit à une baisse de la pression artérielle.

Micardis est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle essentielle (pression artérielle élevée) chez les adultes. « Essentielle » signifie que la pression artérielle élevée n'a pas de cause connue.

Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'hypertension artérielle peut causer des lésions



6 118001 040230

MICARDIS 40mg  
28 comprimés

BOTTU S. A. PPV: 168 DH 80

Ingelheim

PI0320

Pour le traitement de l'hypertension artérielle, la posologie usuelle de Micardis pour la plupart des patients est d'un comprimé dosé à 40 mg par jour, cette posologie permettant un contrôle de la pression artérielle pendant 24 heures. Dans certains cas, votre médecin pourra toutefois vous recommander la prise d'une dose plus importante de 80 mg. Micardis peut également être associé à des diurétiques comme l'hydrochlorthiazide, une augmentation de l'effet thérapeutique sur la pression artérielle ayant été mise en évidence en cas d'association de ces deux médicaments.

Pour la réduction des événements cardiovasculaires, la posologie usuelle de Micardis est d'un comprimé dosé à 80 mg une fois par jour. A l'initiation du traitement préventif avec Micardis 80 mg, la pression artérielle doit être fréquemment contrôlée.

Si votre foie ne fonctionne pas correctement, la dose usuelle ne doit pas dépasser 40 mg par jour.

#### Si vous avez pris plus de Micardis que vous n'auriez dû

Si vous prenez accidentellement une dose trop importante de Micardis, prévenez votre médecin, votre pharmacien, ou le service d'urgence de l'hôpital le plus proche.

#### Si vous oubliez de prendre Micardis

Si vous oubliez de prendre votre comprimé de Micardis, n'ayez pas d'inquiétude. Prenez-le dès que possible et continuez votre traitement normalement. Si vous ne prenez pas de comprimé pendant 24 heures, prenez la dose habituelle le lendemain.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebââ Casablanca

N° Coplavix 75mg/100mg  
b30 cp

P.P.V : 270,00 DH

co 5 113001 082018

clo

cop

UTILISATEUR

75 mg/100 mg

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

#### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérotrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX**

##### **Contre-indications :**

##### **Ne prenez jamais CoPlavix**

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous avez une maladie asséchante des yeux (polypes nasaux).
- si vous avez une maladie qui provoque un saignement tel qu'un ulcère dans le cerveau.
- si vous souffrez d'une maladie de l'estomac.
- si vous souffrez d'une maladie de l'intestin.
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse.

#### **Avertissements et précautions**

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique :
  - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
  - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein, à l'articulation).
  - une blessure grave récente.
  - une intervention chirurgicale.
  - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux ou vasculaire ischémique.
- si vous présentez une maladie de l'estomac.
- si vous avez des antécédents de maladie, compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de l'alcool sur les vaisseaux sanguins ou de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appartenant à la famille de la déshydrogénase (ou déficit en cytochrome P450) qui peut développer une forme particulière de la maladie dans le sang en faible quantité.

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale est nécessaire.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des douleurs dans l'intestin (selles rouges ou diarrhée).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin (thrombotique ou PTT) incluant une apparition comme des petites taches rouges sur la peau, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour la formation d'un caillot sanguin. Dans le cas de coupures ou de brûlures, par exemple au cours du rasage, il est recommandé de constater d'anormal. Cependant, si vous présentez des symptômes de maladie, vous devez en avertir immédiatement votre médecin ("Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les caillots sanguins.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebââ Casablanca

N° Coplavix 75mg/100mg  
b30 cp

P.P.V : 270,00 DH

co 5 113001 082018

clo

cop

UTILISATEUR

75 mg/100 mg

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

#### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérotrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX**

##### **Contre-indications :**

##### **Ne prenez jamais CoPlavix**

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous avez une maladie asséchante des yeux (polypes nasaux).
- si vous avez une maladie qui provoque un saignement tel qu'un ulcère dans le cerveau.
- si vous souffrez d'une maladie de l'estomac.
- si vous souffrez d'une maladie de l'intestin.
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse.

#### **Avertissements et précautions**

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique :
  - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
  - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein, à l'articulation).
  - une blessure grave récente.
  - une intervention chirurgicale.
  - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux ou vasculaire ischémique.
- si vous présentez une maladie de l'estomac.
- si vous avez des antécédents de maladie, compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de l'alcool sur les vaisseaux sanguins ou de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appartenant à la famille de la déshydrogénase (ou déficit en cytochrome P450) qui peut développer une forme particulière de la maladie dans le sang en faible quantité.

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale est nécessaire.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des douleurs dans l'intestin (selles rouges ou diarrhée).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin (thrombotique ou PTT) incluant une apparition comme des petites taches rouges sur la peau, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour la formation d'un caillot sanguin. Dans le cas de coupures ou de brûlures, par exemple au cours du rasage, il est recommandé de constater d'anormal. Cependant, si vous présentez des symptômes de maladie, vous devez en avertir immédiatement votre médecin ("Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les caillots sanguins.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebââ Casablanca

N° Coplavix 75mg/100mg  
b30 cp

P.P.V : 270,00 DH

co 5 113001 082018

clo

cop

ILISATEUR

75 mg/100 mg

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

#### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérotrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX**

##### **Contre-indications :**

##### **Ne prenez jamais CoPlavix**

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous avez une maladie asséchante des yeux (polypes nasaux).
- si vous avez une maladie qui provoque un saignement tel qu'un ulcère dans le cerveau.
- si vous souffrez d'une maladie de l'estomac.
- si vous souffrez d'une maladie de l'intestin.
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse.

#### **Avertissements et précautions**

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique :
  - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
  - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein, à l'articulation).
  - une blessure grave récente.
  - une intervention chirurgicale.
  - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux ou vasculaire ischémique.
- si vous présentez une maladie de l'estomac.
- si vous avez des antécédents de maladie, compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de l'alcool sur les vaisseaux sanguins ou de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appartenant à la famille de la déshydrogénase (ou déficit en cytochrome P450) qui peut développer une forme particulière de la maladie dans le sang en faible quantité.

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale est nécessaire.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des douleurs dans l'intestin (selles rouges ou diarrhée).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin (thrombotique ou PTT) incluant une apparition comme des petites taches rouges sur la peau, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour la formation d'un caillot sanguin. Dans le cas de coupures ou de brûlures, par exemple au cours du rasage, il est recommandé de constater d'anormal. Cependant, si vous présentez des symptômes de maladie, vous devez en avertir immédiatement votre médecin ("Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les caillots sanguins.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebââ Casablanca

N° Coplavix 75mg/100mg  
b30 cp

P.P.V : 270,00 DH

co 5 113001 082018

clo

cop

UTILISATEUR

75 mg/100 mg

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

#### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérotrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX**

##### **Contre-indications :**

##### **Ne prenez jamais CoPlavix**

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous avez une maladie asséchante des yeux (polypes nasaux).
- si vous avez une maladie qui provoque un saignement tel qu'un ulcère dans le cerveau.
- si vous souffrez d'une maladie de l'estomac.
- si vous souffrez d'une maladie de l'intestin.
- si vous êtes dans le 3ème trimestre de la grossesse.

#### **Avertissements et précautions**

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique :
  - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
  - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein, à l'articulation).
  - une blessure grave récente.
  - une intervention chirurgicale.
  - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans les vaisseaux cérébraux ou vasculaire ischémique.
- si vous présentez une maladie de l'estomac.
- si vous avez des antécédents de maladie, compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de l'effet de l'alcool sur les vaisseaux sanguins ou de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appartenant à la famille de la déshydrogénase (ou déficit en cytochrome P450) qui peut développer une forme particulière de la maladie dans le sang en faible quantité.

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale est nécessaire.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des douleurs dans l'intestin (selles rouges ou diarrhée).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'estomac ou de l'intestin (thrombotique ou PTT) incluant une apparition comme des petites taches rouges sur la peau, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps pour la formation d'un caillot sanguin. Dans le cas de coupures ou de brûlures, par exemple au cours du rasage, il est recommandé de constater d'anormal. Cependant, si vous présentez des symptômes de maladie, vous devez en avertir immédiatement votre médecin ("Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous donner des instructions pour les caillots sanguins.



118001 090280

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

## Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?





## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous pourriez avoir besoin de la relire, autre question, si vous avez un doute, ou si vous avez des symptômes de la maladie, appelez votre pharmacien ou votre médecin.

Avant de prendre ce médicament, lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

Le cas échéant, il convient de faire une consultation avec votre médecin ou avec votre pharmacien.

Si vous avez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### • Si l'un des effets si-



## 1. QU'EST-CE QUE CARBURE

Classe pharmacothérapeutique ET DANS QUELLE

## La substance active de CARDÉN

## Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant l'oprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants. Il ralentit le rythme cardiaque et permet au cœur de fonctionner plus efficacement lorsque le rythme cardiaque se produit lorsque l'excès de l'oprolol.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi CARDENSIEL est utilisé pour traiter les affections plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. médicaments adaptés à cette affection *que les* cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment le sang.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATION

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas d'allergie (hypersensibilité) au bisoprolol, à l'asthme sévère, ou à l'un des autres composants.

#### **AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL**

- asthme sévère,
  - troubles sévères de la circulation sanguine ou virer au bleu,
  - phéochromocytome non traité, tumeur de la glande surrenale, en excès dans le sang,
  - icidose métabolique, c'est-à-dire prescrite en excès dans le sang,
  - Norenez jamais CARDENSIE si vous présentez des problèmes cardiaques suivants :
  - insuffisance cardiaque aiguë,
  - aggravation d'une insuffisance cardiaque

La gravité de l'insuffisance cardiaque détermine l'injection dans vos veines de médicaments adaptés aux besoins suivants :

... médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur.

l'ARTERIE EST SP<sup>E</sup>ESSANT à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

### Précautions

# طهور® 10 mg مع Atorvastatin 10 mg

في التبيه، كروسكارباميلوز مكون من الصوديوم، عنصر السوريات المتعدد 80، خليوز البروبيل الممعي، حامض المغنسيوم الإستئاري، أوباديри فـ القرص المغلف.

رأيin نتيجة لارتفاع ضغط الدم مصاحب لعسر الشحمية (الدم والأعضاء القابلة للتلون بالدم)

تمتد لا تتجه الأنشطة البدنية والانخفاض الوزن وتغيير الحمية الغذائية في خفض معدلات الكوليستيرون في دمك بشكل كافٍ.

الكوليستيرون عندما بينين أن الحمية الغذائية المناسبة والمتوازنة غير كافية ستركتور العظام المثلثة المعروفة سهولةً تغييرها أو تقويتها أو إضافة أخرى.

الأوعية الدموية والذين يخضعون للعلاج هي إطار الوقاية الأولية لعرضهم لثلاثة عوامل خطير الإصابة: سواء مع أو بدون وجود اهتمام في

EXP :

P.P.V

LOT N° :

79,00

تحلل مواد الـ **الـ** الحمـية الغذـائية ضـرورـية.

الحالات التي يجب الامتناع فيها عن استعمال هذا الدواء :

يجب عدم استعمال هذا الدواء في الحالات التالية

- الحساسية لـ إحدى مركبات الدواء (انتظر مكونات الدواء)

- الإصابة الكبدية المختلطة مع ارتفاع مستمر في

- في حالة استعمال هذا الدواء مع دواء إيتراكونازول Itraconazole ودواء كيتوكونازول Ketoconazole (التي توصف لمعالجة بعض الإصابات الفطرية) ومع الأدوية المضادة للبروتياز Antiprotéases ودواء

التي توصى لمعالجة الإصابة يغيرون نفس المخالفة المكتسبة: Delavirdine تيلثيرم و ميسينهون Téliomycine و ديلافيردين Delavirdine

عند المراجعة الفنية يتحقق المفهوم المقصود من العمل المراجعة (الرسالة).

عند السؤال، يادروا إلى اسساساته طبيعتهم أو الصيدلي.

● في حالة معالجة أمر اضافة او إتاء الكوليستروول المفرمل، يتعين التقدم بدقة بالحملة العدائية التي يصفها الطبيب:

• يتعين اجراء فحص كامل للkick قبل البدء بالعلاج والقيام بفحص دوري للkick خلال فترة العلاج:

• في حالة الإصابة بالآم عضلية، بادروا إلى اختبار طبيكم المعالج (انظر الفقرة المخصصة للآثار غير المرغوب فيها أو المزعجة).

احتياطات عند استخدام الـ *الدواء* : احتياطات عند استخدام *الدواء* تختلف باختلاف نوع *الدواء* .

يجب الاحتياط عند استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

• عند استهلاك كميات كبيرة من الكحول أو عند الإصابة بمرض كبدى:

• تقدّم الرغبة في العمل أو ارتفاع الوليد

نظاماً، مبررها هي معاشرة حبيبي أو الحبيبي.

من أجل تقدّم وتحقيق طموحاتكم، يتعيّن علىكم إخبار طبيبيكم أو الصيدليين معاشرة بأي دواء آخر تتناولونه. من المهم بشكل خاص أن يعرف طبيبيكم ما إذا كنت تتناولون دواء آخر مخضب.

# طهور® 10 mg مع Atorvastatin 10 mg

في التبيه، كروسكارباميلوز مكون من الصوديوم، عنصر السوريات المتعدد 80، خليوز البروبيل الممعي، حامض المغنسيوم الإستئاري، أوباديри فـ القرص المغلف.

رأيin نتيجة لارتفاع ضغط الدم مصاحب لعسر الشحمية (الدم والأعضاء القابلة للتلود بالدم)

تمتد لا تتجه الأنشطة البدنية والانخفاض الوزن وتغيير الحمية الغذائية في خفض معدلات الكوليستيرون في دمك بشكل كافٍ. الكوليستيرون عندما يبين أن الحمية الغذائية المناسبة والمتواءلة غير كافية ستزور الممثلة العالمية المعروفة سوزان شاندروه أو أميرية داير.

الأوعية الدموية والذين يخضعون للعلاج هي إطار الوقاية الأولية لعرضهم لثلاثة عوامل خطير الإصابة: سواء مع أو بدون وجود اهتمام في

EXP :

P.P.V

LOT N° :

79.00

### تظل مواصلة الحمية الغذائية ضرورية.

الحالات التي يجب الامتناع فيها عن استعمال هذا الدواء:

يجب عدم استعمال هذا الدواء في الحالات التالية

- الحساسية لأحدى مركبات الدواء (أنظر مكونات)

- الإصابة الكبدية المترددة مع ارتفاع مستمر في

في حالة استعمال هذا الماء دواء أتراكونازول (Itraconazole) ودواه ديفاريلين (Delavirdine) ودواه تيلثرومرين (Telithromycin) ودواه المضادة للبروتياز (Antiprotéases) ومع الأدوية المضادة للبكتيريا (Ketoconazole) التي تؤسف المعالجة بعض الإصبات الفطرية.

بروتوكول العلاج المقترن بالفيروس (CoV) (التي توصي بمعاجلة أي صابة بفيروس بعض العناصر المحسوبة):

يجب شكل عام عدم استعمال هذا الدواء إلا بموافقة طبيبك في حالة استعماله مع دواء آخر لمعالجة الكوليستيرونول أو دواء مخصص للكوليستيرونول (أنظر تفاعل الدواء مع أدوية أخرى).

عند الشك، يادروا إلى استشارة طببكم أو الصيدلي.

- في حالة معالجة أمراض ارتفاع الكوليستيرون المفرط، يتعين التقييد بدقة بالحمية الغذائية التي يصفها الطبيب:

• يتمتع إجراء فحص كامل الكبد قبل البدء بالعلاج والقيام بفحص دوري للكبد خلال فترة الملاجئ.

• في حالة الاصابة بالام عضليه، بادروا إلى احذار طبيبك المعانع (انظر الفقرة المعنونة للاتار غير المترغب فيها او المراجحة).

## احتياطات عند استعمال الدواء :

يجب الاحتياط عند استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- عند استهلاك كميات كبيرة من الكحول أو عند الإصابة بمرض كبد

- عند الرغبة في العمل أو إرضاً عن الوليد
- عند الشاشة لا يقتضي استثناء طباعة المعا

تَعَالَى الْوَاءُ مَعَ أَدْوَةٍ أُخْرَى :  
تَسْمِيَةٌ مَرْسُومَةٌ مَنْتَهِيَةٌ بِسِيمٍ وَسِيمِيٍّ .

من أجل تفادى حدوث تناقض بين هذا الدواء وأدوية أخرى، يتعين عليكم اختيار طببكم أو الصيدلى مباشرة بأى دواء آخر ستتناولونه. من المهم بشكل خاص أن تعرف طببكم ما إذا كنت ستتناولون دواء آخر مخفف

# طهور® 10 mg مع Atorvastatin 10 mg

في التبيه، كروسكارباميلوز مكون من الصوديوم، عنصر السوريات المتعدد 80، خليوز البروبيل الممعي، حامض المغنسيوم الإستئاري، أوباديри فـ القرص المغلف.

رأيin نتيجة لارتفاع ضغط الدم مصاحب لعسر الشحمية (الدم والأعضاء القابلة للتلون بالدم)

تمتد لا تتجه الأنشطة البدنية والانخفاض الوزن وتغيير الحمية الغذائية في خفض معدلات الكوليستيرون في دمك بشكل كافٍ. الكوليستيرون عندما بينين أن الحمية الغذائية المناسبة والمتوازنة غير كافية ستزول الكوليستيرون الماليتال المعروفة سواءً بـ دهون أو دهونية أخرى.

الأوعية الدموية والذين يخضعون للعلاج هي إطار الوقاية الأولية لعرضهم لثلاثة عوامل خطير الإصابة: سواء مع أو بدون وجود اهتمام في

EXP :

P.P.V

LOT N° :

79,00

### تظل مواصلة الحمية الغذائية ضرورية.

الحالات التي يجب الامتناع فيها عن استعمال هذا الدواء:

يجب عدم استعمال هذا الدواء في الحالات التالية

- الحساسية لأحدى مركبات الدواء (انتظر مكونات الدواء)

- الأصحاب الكبار المنشورة مع ارتفاع مستمر في

- في حالة استعمال هذا الدواء مع دواء إيتراكونازول Itraconazole ودواء كيتوكونازول Kétoconazole (التي توصف لمعالجة بعض الإصابات الفطرية) ومع الأدوية المضادة للبروتياز Antiprotéases ودواء

(التي توصف لمعالجة الإصابة يغرس نقص المناعة المكتسبة): تيلثروميسين **Telithromycin** ودواء ديلافيردين **Delavirdine**

عند الليل، بادروا إلى اسستاره طبعيكم أو الصيدلي.

• في حالة معايير امراض اورتقاء الكوليستيول المفرط، يتغير التقييد بدقة بالحمية الغذائية التي يصيغها الطبيب.

- يتعين إجراء فحص كامل للkid قبل البدء بالعلاج والقيام بفحص دوري للkid خلال فترة العلاج.

• في حالة الإصابة بالام عضلية، بادروا إلى إخبار طبيبك المعالج (انظر الفقرة المخصصة للآثار غير المرغوب فيها أو المزعجة).

يساهم وجود الالكترون، فإنه ينصح بعدم استعماله في حالة تقصي امراض ايضية نادرة.

يجب الاحتياط عند استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

• عند استهلاك كميات كبيرة من الكحول أو عند الإصابة بمرض كيدي:

• عند الرغبة في العمل أو إرضاع الوليد

تمارين البناء مع أدبية أخرى: [الكتاب](#)

هل تقدّيّ حمّوتٍ مُّنْقَلِّيَّةً بينَ هذِهِ الدَّوَاءِ وَآخِرَةً مُّنْقَلِّيَّةً؟ يَعنِي عَلَيْكُمْ أَخْيَارٌ طَبِيبِكُمْ أَوْ الصَّدِيقِيْنَ مُبَاشِرَةً بِأَيِّ دَوَاءٍ أَخْرَى تَنَاهُوْنَ عَنِ الدَّوَاءِ أَوْ مُخْفِضَهُ؟