

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-784798

par  
comme

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule : 1602

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : GHAZI MATAHED

Date de naissance : 01/01/1943

Adresse : HAY EL KOUADIA / N° 77 QUÉLIZ RATE

Tél. : 06.10.51.17.12

Total des frais engagés : 1391,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 02/04/2024

Nom et prénom du malade : GHAZI MATAHED

Lien de parenté :  Lui-même

Nature de la maladie : Dent. rhizopigne

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Agadir

Signature de l'adhérent(e) : GHAZI

Le : 08/10/1924

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/11/2021	Consultation		200	INP : 111111111111
8/11/2021	Consultation		200	INP : 111111111111

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 127 Rue Med El Begal Guéliz - Marrakech INPE: 072043508 ICE: 001796345000043	2/4/24	591.90

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRE								
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.								
<b>Important :</b> Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.								
	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>				
				COEFFICIENT DES TRAVAUX		<input type="text"/>		
				MONTANTS DES SOINS		<input type="text"/>		
				DEBUT D'EXECUTION		<input type="text"/>		
				FIN D'EXECUTION		<input type="text"/>		
					O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		COEFFICIENT DES TRAVAUX  MONTANTS DES SOINS  DATE DU DEVIS  DATE DE L'EXECUTION
						H 25533412   21433552 00000000   00000000 D   G 00000000   00000000 35533411   11433553 B		
						<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel Therapeutique, nécessaire à la profession		
<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS</b>								
<b>VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION</b>								



Docteur Khadija MOHIB

Spécialiste des Maladies du Cœur  
et des Vaisseaux - Echo Doppler Cardiaque  
et Vasculaire - Holter

الدكتورة خديجة موهب

إختصاصية في أمراض القلب والشرايين  
وارتفاع الضغط الدموي  
الفحص بالصدى والهولتير

Mr GHIAZZI Nohamed

Marrakech, le : 24/2/24 مراكش في :

Registre personnel  
97,70 + 49,00  
Rx Ampoules 5 → 24/2  
56,80 x 2  
Rx Albuterol 30mg 1/24/2  
70,10  
Rx Kofit 2g 24/2  
69,00  
Rx Dofetilide 100mcg 1/24/2  
182,70  
Rx Zoflax 450mg 24/2/24/2  
9,60 Deltapac 24/2/24/2  
591,90





qui peut affecter l'intestin et est causé par

et de la fatigue ;

une exposition au soleil ;

myalgiques) ou musculaires (myalgie) ;

vers (néphrite interstitielle) ;

sur.

aires (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

bre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (diminution

les, sensorielles ou auditives ;

sevères entraînant une insuffisance hépatique et une

veau ;

une d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamation

peau pouvant être associées à une fièvre importante et à des

es (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson,

ique toxique) ;

culaire ;

des seins chez l'homme.

bles de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la

es disponibles).

de l'intestin (entraînant des diarrhées) ;

ez KALEST pendant plus de trois mois, il est possible que le taux

ans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent

ne fatigue, des contractions musculaires involontaires, une

es convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération

ue. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en

ement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent

une diminution des taux de potassium ou de calcium dans

sein pourra décider d'effectuer des examens sanguins

veiller votre taux de magnésium ;

eventuellement avec des douleurs dans les articulations.

très rares cas affecter les globules blancs entraînant un

s devez consulter votre médecin dès que possible si

avec des symptômes tels que de la fièvre avec une

ante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection

lance le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à

stommes, un déficit de globules blancs (agranulocytose)

est sanguin. Il est important que vous donnez des

ments dans ce cas.

diaries

l effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre

étre. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable

ns cette notice. Vous pouvez également déclarer

ment via le système national de déclaration :

de Pharmacovigilance.

vous contribuez à fournir davantage d'informations

**KALEST 20 mg, gélule gastro-résistante ?**

vue et de la portée des enfants.

éremption figurant sur la boîte.

ne dépassant pas 25 °C.

out-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères.

liminer les médicaments que vous n'utilisez plus.

ger l'environnement.

**AGE ET AUTRES INFORMATIONS**

g, gélule gastro-résistante

20 mg

hydroxypropylcellulose, hydrogénophosphate de sodium, sucre pulvérisé qualité pharmaceutique, sucre de tétine, polysorbate 80, macrogol 6000, hydroxyde de sodium, hydroxypropylméthylcel-

LOT 230643

EXP 09/2025

PPV 70,10 DH

Ceci est un médicament.

Un médicament n'est pas un produit comme les autres.

Il vous concerne, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité, mais son absorption n'est pas toujours sans danger.

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin.

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre propre

initiative.

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils.

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante.

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

**MC PHARMA**  
Laboratoire Pharmaceutique

MC PHARMA SA  
Lottissement Bachkou, Lot 10, rue 7  
20 000 Casablanca - Maroc  
O.MOTII - Pharmacien responsable

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg

P.P.V: 56,80 DH



6 118001 17002

# ALDACTONE 50 mg, spironolactone 50 mg tablet ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable

Spironolactone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?
3. Comment prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables possibles ?

### Enfants et adolescents

Sans objet.

### Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants :

- médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium: tels que l'amiloride, le canrenoate de potassium, l'éplerénone, le triamtérenol ou le potassium),
- médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane,
- certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la cyclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II),
- triméthoprime et triméthoprime-sulfaméthoxazole,
- abiratéron dans le cadre de votre traitement du cancer de la prostate.

**ALDACTONE, comprimé sécable avec des aliments, boissons et de l'alcool**

• une somnolence.

• des troubles des règles chez la femme.

• une impuissance chez l'homme.

• un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.

• une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).

• une éruption cutanée.

• une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).

• un mauvais fonctionnement des reins (insuffisance rénale aiguë).

• un taux abnormal de sels minéraux dans l'organisme tel qu'une augmentation du potassium dans le sang et une diminution du sodium dans le sang.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable a

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg

P.P.V: 56,80 DH



6 118001 17002

# ALDACTONE 50 mg, spironolactone 50 mg tablet ALDACTONE 75 mg, comprimé sécable

Spironolactone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ALDACTONE, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?
3. Comment prendre ALDACTONE, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables possibles ?

### Enfants et adolescents

Sans objet.

### Autres médicaments et ALDACTONE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, notamment les médicaments suivants :

- médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium: tels que l'amiloride, le canrenoate de potassium, l'éplerénone, le triamtérenol ou le potassium),
- médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane,
- certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la cyclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II),
- triméthoprime et triméthoprime-sulfaméthoxazole,
- abiratéron dans le cadre de votre traitement du cancer de la prostate.

**ALDACTONE, comprimé sécable avec des aliments, boissons et de l'alcool**

• une somnolence.

• des troubles des règles chez la femme.

• une impuissance chez l'homme.

• un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.

• une éruption cutanée d'origine

médicamenteuse avec éosinophilie

(quantité excessive de certains

globules blancs) et manifestations

systémiques (affections touchant

différentes localisations).

• une éruption cutanée.

• une pemphigoïde (maladie se

caractérisant par la présence

d'ampoules remplies de liquide sur la

peau).

• un mauvais fonctionnement des reins

(insuffisance rénale aiguë).

• un taux abnormal de sels

minéraux dans l'organisme tel

qu'une augmentation du potassium

dans le sang et une diminution du

sodium dans le sang.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable a

# Doliprane® 500 mg

PARACETAMOL

comp

PPV:

9,60

PER: 10/20

LOT: M3430

## COMPOSITION ET PRESENTATION

- Paracétamol.....
  - Excipients : qsp 1 comprimé
- Boîte de 20 comprimés.

## PROPRIETES :

Ce médicament est un **antalgique**. Il calme la douleur.

Il est **antipyrrétique**. Il fait baisser la température en cas de fièvre.

## INDICATIONS :

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué dans les maladies avec douleur et/ou fièvre, telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses, **chez l'adulte et l'enfant à partir de 27 kg : (environ 8 ans)**.

## CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas :

- d'allergie connue au paracétamol
- maladie grave du foie.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).

- Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.

Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent. Ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.







LOT : 230757  
DU 09-09-2026  
69,00DH



**Sirop**  
Voie orale

# Docivox

**Sirop naturel sans conservateur**

Deva  
Marketing

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

Flacon 200 ml - Flacon 125 ml  
Docivox sirop

**PROPRIÉTÉS :**  
Docivox sirop naturel est à base d'extraits de plantes (le Thym, la Mauve et le Mélèze), d'huile essentielle de eucalyptus, du miel et de la propolis. Docivox sirop naturel apaise les voies respiratoires, adoucit la gorge irritée en cas de toux et renforce les défenses naturelles de l'organisme. Docivox sirop naturel ne contient pas de conservateur.

## UTILISATIONS :

- Voies respiratoires encombrées - Gorge irritée - Toux - Enrouement.

**POSÉOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :**

Adulte : une cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.  
Enfant : une cuillère à café 2 à 4 fois par jour.  
Dan tous les cas, se conformer à la prescription de votre médecin ou pharmacien.  
Docivox sirop naturel est administré par voie orale.  
Bien agiter le flacon avant chaque emploi.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche ou à l'un des constituants.  
- Déconseillé chez la femme enceinte, allaitante et nourrisson.  
- Le produit peut présenter un léger dépôt, des changements de couleur ou de goût qui sont attribuables aux caractères naturels des plantes; toutefois la qualité et l'efficacité du produit ne sont pas altérées.  
- Après ouverture, à conserver au frais et à consommer dans les 12 mois.  
- hors de la portée des enfants.

**DR KHADIJA MOHIB  
SPECIALISTE DES MALADIES DU CŒUR  
ET DES VAISSEAUX**

MARRAKECH 02/04/2024

ICE : 001743821000051

**DOCTEUR KHADIJA MOHIB,**

A l'honneur de présenter ses meilleures salutations à  
Monsieur : GHAZI MOHAMED


Et lui adresse selon l'usage, sa note d'honoraires,

Soit la somme de : HUIT CENTS DIRHAMS

Consultation + ECG = 200DHS

ECHOCOEUR 600, 00 DHS

Le total est :800,00DHS

**DR MOHIB KHADIJA  
CARDIOLOGUE**  
  
DR. MOHIB KHADIJA  
Cardiologue  
113 Avenue Abdelkrim El Khattabi, Résidence El Mouhandiz, Marrakech  
Téléphone : 044 43 00 79

# DOCTEUR KHADIJA MOHIB

## CARDIOLOGUE

Nom. : GHAZI  
Prénom : MOHAMED  
Age : 81 ans  
Date : 02/04/2024

### RAPPORT D'ECHO-DOPPLER CARDIAQUE COULEUR

**AO : 30mm** **VG : 41/27**  
**OG : 34mm** **PP : 10mm**  
**SIV : 10mm** **RAC : 34%**  
**FE : 64%**

### COMPTE RENDU

- Ventricule gauche non dilaté.
- Fonction VG globale conservée.
- Parois du VG non épaissies avec une hypocinésie de la pointe du VG .
- Oreillette gauche non dilatée , libre de thrombus par voie trans. -thoracique.
- Flux mitral : trouble de relaxation .
- Valves mitrales fines, pas d' insuffisance mitral ni de rétrécissement mitral, appareil sous valvulaire non calcifiée.
- Sigmoïdes aortiques fines, pas d'insuffisance aortique ni de rétrécissement aortique.
- Racine de l'aorte ascendante non dilatée.
- Insuffisance tricuspidienne permettant de calculer la pression artérielle pulmonaire systolique qui est normale.
- Cavités droites non dilatée, avec fonction VD conservée.
- Pas d'épanchement péricardique.

### Conclusion :

Echo-cœur montre une hypocinésie de la pointe du VG . fonction VG globale conservée .

SIGNE  
**DR K. MOHIB**



DR. KHADIJA MOHIB  
Cardiologue  
11 Avenue Abdelkrim El Khattabi  
Résidence El Mouhandiz  
Marrakech - Maroc  
Téléphone : 0524 43 00 79

## ECG

Name : GHAZI MOHAMED:

SN : 0002059

Case No. :

Age:

**Clinic No. :**

## Section :

Date : 04/01/1980 2:48:23

ECG strip showing 12 leads (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) with a 50Hz AC notch. The strip includes a table of limb lead values.

	bpm	90	93	92	93	90	93	93	90	90	
ms		670	648	655	645	665	642	643	666	664	
I	PA:	--									
II	QA:	-0.36mv									
III	RA:	1.27mv									
aVR	SA:	-0.16mv									
aVL	STM:	0.03mv									
aVF	TA:	0.34mv									
V1	PA:	--									
V2	QA:	--									
V3	RA:	0.15mv									
V4	SA:	-0.35mv									
V5	STM:	-0.82mv									
V6	TA:	-0.03mv									
	PA:	-0.19mv									
	QA:	-0.04mv									
	RA:	0.31mv									
	SA:	--									
	STM:	--									
	TA:	--									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.24mv									
	SA:	-0.82mv									
	STM:	-0.03mv									
	TA:	-0.21mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.15mv									
	SA:	-0.35mv									
	STM:	0.04mv									
	TA:	-0.20mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.11mv									
	SA:	-0.18mv									
	STM:	--									
	TA:	0.31mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.29mv									
	SA:	-1.37mv									
	STM:	0.06mv									
	TA:	0.15mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.26mv									
	SA:	-1.22mv									
	STM:	0.04mv									
	TA:	0.23mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.30mv									
	SA:	-1.39mv									
	STM:	0.11mv									
	TA:	0.31mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.27mv									
	SA:	0.79mv									
	STM:	-1.22mv									
	TA:	0.08mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.46mv									
	SA:	-0.52mv									
	STM:	2.54mv									
	TA:	-0.96mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.01mv									
	SA:	0.34mv									
	STM:	--									
	TA:	--									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	-0.44mv									
	SA:	1.98mv									
	STM:	-0.34mv									
	TA:	-0.02mv									
	PA:	--									
	QA:	--									
	RA:	0.23mv									
	SA:	-0.22mv									
	STM:	0.05mv									
	TA:	0.01mv									

AC IIR 50Hz

25mm/s 5mm/mV

Frequency:	1000Hz	PR Interval:	--	Prompt:
Sample Time:	8s	QT Interval:	310 ms	Total Beats 11 ,Normal Beats 11,SVE 0 ,VE 0 . Cardiac electric axis normal;No Completeness Right Bundle branch block;old inferior MI;IAbnormal T wave;
HR:	92bpm	QTc Interval:	383 ms	
P Interval:	--	P Axis:	--	
QRS Interval:	97 ms	QRS Axis:	87.00@b	
T Interval:	195 ms	T Axis:	100.70@b	

Physician Signature:




GHIZI, MOHAMED  
01/01/1943

02/04/24 14:39:33

3S  
ROG

MI 1.0

Cardiaque Tls 0.3



GHIZI, MOHAMED  
01/01/1943


02/04/24 14:38:39

3S  
ROG

MI 1.0

Cardiaque Tls 1.1

FE	
FE VG (sim.A4C)	48.69 %
Vol. Ejed.(simpson A4C)	33.73 ml
2 Long. VGs(A4C)	7.10 cm
Vol.tolés.VG(sim.4cav)	35.54 ml
1 Long. VGd(4cav)	7.64 cm
Vol.toléd.VG(sim.4cav)	69.27 ml



GHIZI, MOHAMED  
01/01/1943

02/04/24 14:38:25

3S  
ROG

MI 1.0

Cardiaque Tls 0.9

VA	
1 Vmax VA	1.03 m/s
Vmoy VA	0.80 m/s
GDmax VA	4.26 mmHg
GDmoy VA	2.76 mmHg
ITV VA	20.12 cm
Env.VA	251.39 ms

