

EL ALAMA RIAD

203038

GONALGIES BILATERALES, TENDINITE CALCIFIANTE TENDON
ROTULIEN

FAIRE SVP: 15 SEANCES DE REEDUCATION

- PHYSIOTHERAPIE, CRYOTHERAPIE/COMPRESSION (GAMEREADY)
- MASSAGE TRANSVERSAL PROFOND ET MOBILISATION DOUCE DE LA ROTULE
- RENFORCEMENT DU TENDON ROTULIEN EN EXCENTRIQUE SELON STANISH: EN SQUAT SUR PLAN INCLINE EN AVANT DE 25° JUSQU'A UN ANGLE DE 60° DE FLEXION DU GENOU
- THERAPIE ANTALGIQUE ET MOBILISATION PATELLAIRE
- STRETCHING DES CHAINES ANTERIEURES ET POSTERIEURES DES MEMBRES INFERIEURS
- TRAVAIL DE PROPRIOCEPTION DES MEMBRES INFERIEURS
- KINESIOTAPE DE RECENTRAGE PATELLAIRE
- DONNER DES EXERCICES A FAIRE QUOTIDIENNEMENT A DOMICILE

FAIRE SVP: 5 SEANCES D'ONDES DE CHOC POUR LES 2 GENOUX:

Dr Anis ACHARGUI
Chirurgien Orthopédiste
105, Bd. 2 Mars, Casablanca
Tél: 0522 81 81 16 - INP 091170910



Dr. O. Alami

Spécialiste en Radiologie
Lauréate de l'Université Nancy I
Ex Radiologue au CHU Ibn Rochd

Dr. N. Faris

Spécialiste en Radiologie
Lauréate de l'Université Nancy I
Ex Radiologue au CHU Ibn Rochd

15/03/2024

PATIENT : Mr. EL ALAMA RIAD
EXAMEN(s) REALISE(s) : ECHOGRAPHIE DES DEUX GENOUX

Cher Docteur,
Je vous remercie de nous avoir adressé votre patiente dont voici le résultat de l'examen.

INDICATION

RESULTAT

- ❖ L'analyse comparative des genoux, retrouve, de manière bilatérale un tendon patellaire de taille normale, de contours réguliers d'échostructure fibrillaire, hypoéchogène, homogène, siège de calcifications en regard de son enthèse distale. Ces calcifications sont plus nombreuses à droite, sans anomalie péri tendineuse au pourtour ni anomalie de l'insertion tendineuse associée notable.
- ❖ **A droite :** Ces calcifications sont plus nombreuses. La plus volumineuse mesure environ 4,37mm de diamètre.
- ❖ **A gauche :** Elles sont très fines et peu nombreuses. La plus volumineuse mesure environ 2,65mm de diamètre
- ❖ Discret épanchement au niveau du cul de sac ^{Sous} quadricipitale ainsi qu'au niveau de la bourse infra patellaire, de manière bilatérale, non significatifs.
- ❖ Les ligaments collatéraux et le tendon sous quadricipitale sans particularité.
- ❖ Les segments méniscaux examinés, paraissent normaux.

AU TOTAL

Tendinopathie calcifiante du ligament patellaire, de manière bilatérale, plus prononcée à droite.

Confraternellement

DR O. ALAMI

RADIOLOGIE HAY HASSANI
10, Imm, Communal, Angle route d'Azemmour et Bd. Sidi Abderrahmane - Casablanca - Tél.: 05 22 90 10 10 - 05 22 90 07 07 - Whatsapp: 07 61 51 24 31
E-mail : radiologiehayhassanianfa@gmail.com - PATENTE : 35 00 38 66 - TVA : 73 39 10 - IF : 2221555 - ICE : 001686337000022