

enfant HAWAFI

FICHE MEDICALE D'ADMISSION

ADHERENT ~~CONJOINT~~ - ENFANT

Nom : ABTAL Prénom : Almal

Matricule : 8077 Date de naissance : 1987 Sexe : 7

PHOTO

Date

Médecin

Ex. Clinique : Poids

Coeur

T. A.

Ap. resp.

Ap. dig.

Urines

A

S

Hernies

Râte

Varices

Réflexes

Ex. Complémentaires :

Antécédents :

5/6/88 circoncis K30
12/10/80 TV curieuses 12 orthopédes
18/11/81 12 orthopédes
28/11/82 12 orthopédes

9/10/83 de suite de 17 orthopédes
21/10/83 de suite de 17 orthopédes
21/10/83 de suite de 17 orthopédes

3/2/05

OD + 5

OG $(170^\circ - 0, 10) + 5, 10$

7/5/06 Luths OD $(170^\circ - 0, 15) + 5, 10$

OG $(170^\circ - 0, 15) + 5, 10$

10/7/07 Nantux - Bob by

18/3/08

OD $(170 - 15) + 5, 00$

OG $(170 - 0, 15) + 6, 00$

21/9/09 Jacei Nantux K20 K

05/10/2009

ad $(170 - 1) + 5, 00$

OG $(180 - 9, 15) + 6, 25$

08/12/10

Radar Reach 1203 NM 10

05/1/11

OK from coast (scoring)

6/1/11

Luths OD + 4, 50

OG + 6, 25

30-05-11

Accord 20 received your scores
to have approx 22 via C

Dates	Actes	Observations
28 FEB 2005	74-84-85 3 Dr	
05 MAI 2006	84 16 ext	
	65/63 ext + RX + Cs	
23 JUIL 2007	D8 D8 2 ext	
23/3/11	2 ext Dr	

Zineb LAHJOUI

ORTHOPTISTE

Diplômée d'Etat de la
Faculté de médecine de Paris

14, rue Najib Mahfoud
Quartier Gauthier
Casablanca
Tel : 022 20.76.98
20.78.39

Sur Rendez-vous

Casablanca, le 12/10/00

Chère Amie,

Je te remercie de m'avoir adressé l'enfant ABATAL Ahmed âgé de 3 ans et demi que j'ai donc vu ce jour pour bilan orthoptique de contrôle.

Ahmed présente actuellement les éléments suivants :

Traitement antérieur : verres actuels portés depuis 8 à 10 jours.

Verres prescrits : OD : + 5,00
OG : + 6,00

Acuité visuelle :

SC $\frac{VOD}{VOG} = \frac{10/10}{6/10}$ R2
R2

aux dessins de Rossano loin et près.

AC $\frac{VOD}{VOG} = \frac{10/10}{6/10}$ R2
R2

Examen sous écran : l'OD étant fixateur,

Ecran | loin EEt10à12
SC | près E'E't10à14

Ecran | loin EEtmin à4
AC | près E'E't min à4

Au synoptophore :

SC AO = +14à+18H0
AC AO = +6à+8H0

et 1^{er} degré +.

avec test de 3^{ème} degré : relief perçu.

Au stéréotest de Wirt : HF - pions : neutralise OG.

Aux verres striés de Bagolini : fusion loin et près.

+prismes D1 puis neutralise OG à la rupture de fusion.
 D'2

Au test de Worth : fusion possible de près jusqu'à vers 1 mètre 50 puis neutralise OG.

A l'étude de la motilité : je note ce jour une discrète limitation des droits externes (OG+), une discrète hyperaction des droits internes et un très léger syndrome alphabétique en X.

Le réflexe de convergence : est moyen.

Donc au total pour Ahmed, ésoptropie avec OD fixateur loin et près, élément accommodatif, déviation très discrète avec correction portée, sur le plan sensoriel union binoculaire, cependant plus fragile qu'auparavant, neutralise OG surtout de loin et sur le plan visuel enfin baisse d'acuité visuelle OG à 3 dessins de 8/10 R2 avec correction portée.

Je propose donc – si tu es d'accord – de reprendre occlusion intermittente de l'OD de 2 heures par jour quand regarde dessins animés à la télévision et surveiller pour moduler selon évolution.

En te remerciant de ta confiance,

LAHJOUI Zineb
ORTHOPTISTE
14, Rue Ollier
CASABLANCA
Tél. 20-78-39 / 20-76-98

Zineb LAHJOUI

ORTHOPTISTE

Diplômée d'état de la
Faculté de médecine de Paris

Sur Rendez-vous

14, rue Ollier
Quartier Gauthier
Casablanca
Tél : 022 20.76.98
022 20.78.39

Casablanca, le 22/05/02

Cher Ami,

Je te remercie de m'avoir adressé l'enfant ABATAL Ahmed âgé de 5 ans que j'ai donc vu ce jour pour bilan orthoptique de réévaluation.

Ahmed présente actuellement les éléments suivants :

Traitement antérieur : verres actuels portés depuis 2 à 3 mois.

Acuité visuelle :

SC	<u>VOD</u> = 10/10	R2	
	<u>VOG</u> = 2 dessins de 8/10	R3	
			aux dessins de Rossano loin et près.
AC	<u>VOD</u> = 10/10 bien	R2	
	<u>VOG</u> = 3 dessins de 8/10	R2	

Examen sous écran : l'OD étant fixateur,

<u>Ecran</u>	loin EEt10 à 14	<u>Ecran</u>	loin EEt min à 2
SC	près E'E't10 à 14	AC	près E'E't min à 6

SC et sous écrans translucides bilatéraux : pas de déviation apparente de près.

recherche de DVD : négative OD et OG.

Au synoptophore :

<u>SC</u>	AO = +16 à +20H0	et 1 ^{er} degré +.
<u>AC</u>	AO = +4 à +6H0	

avec test paramaculaire de 2^{ème} degré : fusion possible.

D : +4

puis neutralise OG à la rupture de fusion.

avec test paramaculaire de 2^{ème} degré :

D : + 2 puis neutralise OG à la rupture de fusion.

avec test de 3^{ème} degré : relief perçu à l'angle.

Au stéréotest de Wirt : HF + pions : 20%.

Aux verres striés de Bagolini : fusion loin et près.

+ prismes D0 D'1 à 2 puis neutralise OG à la rupture de fusion.

Au test de Worth : fusion possible de près jusque vers 1 mètre 50 puis neutralise OG.

A l'étude de la motilité : je note une limitation des 2 droits externes OG+, une discrète hyperaction des 2 droits internes, une discrète limitation du grand oblique gauche et un syndrome alphabétique en V.

Le réflexe de convergence : est moyen à bon.

Donc au total pour Ahmed, ésoptropie accommodative avec OD fixateur loin et près, déviation variable selon effort d'accommodation, déviation bien compensée avec correction portée, déviation qui semble avoir augmenté loin et près, avec et sans correction, possibilités fusionnelles certaines et isoacuité maintenue à 10/10 R2 avec et sans correction, à l'échelle des « E » loin et près.

Peut-être – si tu es d'accord – serait-il préférable de vérifier la réfraction ?

En te remerciant de ta confiance,


LAHJOUI Zineb
ORTHOPTE
14 rue Ollier
CASABLANCA
Tél. 20-78-39/20-76-98

Zineb LAHJOUI

ORTHOPTISTE

Diplômée d'état de la
Faculté de médecine de Paris

Sur Rendez-vous

14, rue Ollier
Quartier Gauthier
Casablanca
Tél : 022 20.76.98
022 20.78.39

Casablanca, le 11/09/02

Cher Ami,

Je te remercie de m'avoir adressé l'enfant **ABATAL Ahmed** âgé de 5 ans et 4 mois que j'ai donc vu ce jour pour bilan orthoptique de réévaluation.

Ahmed présente actuellement les éléments suivants :

Traitement antérieur : verres actuels portés depuis 8 mois, occlusion OD 1 à 2 heures par jour depuis Juin 2002.

Acuité visuelle :

SC VOD = 10/10
 VOG = 10/10

R2
R2

AC VOD = 10/10
 VOG = 10/10

R2
R2

à l'échelle des « E » loin et près.

Examen sous écran :

Ecran | loin EEt20 à 25
SC | près E'E't20 à 25

Ecran | loin EEt min à 4
AC | près E'E't min à 8

SC et sous écrans translucides bilatéraux : pas de déviation apparente de près.

AC et sous écrans translucides bilatéraux : pas de déviation apparente de près.

recherche de DVD : négative OD et OG.

Au synoptophore :

SC AO = +20 à +30H0
AC AO = +4 à +8H0

localisation : 1^{er} degré + instable.

avec test paramaculaire de 2^{ème} degré :

D : 0 puis neutralise OG à la rupture de fusion.

avec test de 3^{ème} degré : relief perçu.

Au stéréotest de Wirt : HF+ pions : ?

Aux verres striés de Bagolini : fusion possible loin et près.

Au test de Worth : fusion semble également possible loin et près, peut-être tendance à neutraliser OG de loin.

A l'étude de la motilité : RAS.

Le réflexe de convergence : est bon.

Donc au total pour **Ahmed** ésoptropie accommodative, réduite à microphorie-tropie avec correction portée, possibilités fusionnelles certaines mais aussi tendance à neutraliser OG et sur le plan visuel enfin rechute de l'amblyopie OG avec ce jour seulement, 6/10 R2 avec et sans correction, aux dessins de Rossano loin et près.

Je propose donc – si tu es d'accord – de reprendre occlusion OD à mi-journée et de surveiller étroitement acuité visuelle OD, OG, angle et fusion pour moduler selon évolution.

En te remerciant de ta confiance,

LAHJOÛJI Zineb
ORTHOPHTE
14, Rue Olier
CASABLANCA
Tél. 20-78-39720-76-98