

**Docteur Fatiha LASRI**  
Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité - Nancy II
- Ex Médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam

**Dr Bouchaïb EL MDARI**  
Médecin Radiologue

- Diplôme National de Spécialité
- Diplôme Inter-Universitaire de Spécialité - Nancy II
- Ex-Médecin attaché au CHU Ibn Rochd

- Scanner Spirale Corps Entier
- Dentascanner - Panoramique Dentaire
- Echographie Générale

- Echographie-Doppler Couleur
- Echographie Ostéo Artculaire
- Radiologie Numérisée

- Ostéodensitométrie
- Mammographie Numérisée
- Radiographie Rachis Entier
- Radio - Photo

Casablanca , le 13/12/2022

PATIENT : **EDDAHAR SAMIRA**  
MEDECIN TRAITANT : **DR. ZEMRAG Jafar**  
EXAMEN(S) REALISE(S) : **RX. ASP**

*Comp. pec  
142823*

- Importante stase stercorale.
- Sonde JJ à droite avec une boucle supérieure se projetant probablement au niveau du bassin et une boucle se projetant sur la vessie.
- Multiples calcifications se projetant sur les rénales droites et en regard du disque L3-L4.
- Phlébolithes pelviens.
- Remaniements arthrosiques modérés du rachis lombaire et des articulations sacro iliaques.



**Confraternellement  
DR. LASRI FATIHA**

N.C

*Centre de Radiologie El Oulfa  
Bd. Oum Rabii - Rue 50, N°2  
Casablanca - 20220  
Tél : 05 22 93 04 93*

*Docteur LASRI Fatiha  
Médecin Radiologue*



INPE 090001512  
ICE 001757364000080

Polyclinique  
Derb-Ghalef

مصلحة الفحص بالأشعة

## SERVICE DE RADIOLOGIE

Casablanca le : 23/12/22

Patient (e) : EDDAHAR SAMIRA

### UROSCANNER

#### TECHNIQUE

Examen réalisé en coupes axiales en mode volumique avant injection de PDC sur des deux séries de coups après injection aux temps artériel et sécrétoire.

#### RESULTATS

Rein droit, taille normale, couronne parenchymateuse satisfaisante drainé par une sonde en double J présente :

- Une dilatation pyélo calicielle modérée, bassinet 23mm.
- Des images de forte densité calicielle inférieure de 8.8 et 10mm : lithiase ?
- Le rein sécrète dans les délais habituels.

Absence d'anomalies morphologique ou fonctionnelle du rein gauche.

Absence d'anomalies des espaces para rénaux.

Absence de collection profonde décelable.

Vessie de plage homogène de contours réguliers.

#### CONCLUSION

Discrète dilatation pyélo calicielle droite sur sonde en double J.

Lithiases calicielles inférieures droites

Dr CHERKAOUI AICHA

☐ I.R.M  
( 1.5 Tesla )

☐ Scanner  
(Corps Entier)

☐ Radiologie  
Numérique

☐ Echo-Doppler  
(Couleur)