

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
clinic
clinic

170850

DE VIS

N°: DV024615 du 05/08/2023

Nom / Prénom Patient	Qualité Bénéficiaire		
M. BNOU HANNA Mohamed	Assure		
Nom / Prénom Assuré	CIN Assuré		
M. BNOU HANNA Mohamed	B15158		
N° Affiliation	N° Immatricule		
Assurance / Organisme / Mutuelle	MUPRAS		
Libellé	CORO+DILAT D'UN STENT ACTIFS		
Désignations des prestations	Nbre	Prix unitaire	Montant
CORO	1	6 000,00	6 000,00
DILAT D'UN STENT ACTIFS	1	49 000,00	49 000,00
	Total Clinique		55 000,00
Arrêtée à la somme de :			
CINQUANTE-CINQ MILLE DHS ET ZERO CENTIMES	TOTAL GENERAL		55 000,00



090062100



Édité le : 05/08/2023 à 10:46

Par : fkarim



Date: 04 / 08 / 2012

Ordonnance

Pr. Confidential

M. Mohamed Driss Yassine

âge: 70 ans


Diagnose: BMT antérieur
en choc cardio-vasculaire.

Symptomologie:

① Angioedème coronaire
à l'ode d'un état d'anxiété
de l'IMM affinage

102, 103 Boulevard Anoual - Casablanca - Maroc Hôpital de Cardiologie Interventionnelle
Fax : +212 522 86 08 97 - Email : contact@internationalclinic.ma

Dr. ASSADI MASS



INTERNATIONAL clinic

CORONAROGRAPHIE
EXAMEN N° 7374, 04/08/2023

MOHAMED BNOU HANNA, 26/01/1953

- Opérateurs: Pr ANASS ASSAIDI
- Correspondant: Pr Mohamed ZOUBIDI

CLINIQUE

Statut Clinique: IDM antérieur en choc cardiogénique

Fréquence cardiaque: 75 /min. PAS: 193 mmHg. PAD: 93 mmHg.

TECHNIQUE

Voie d'abord: Artère fémorale droite - 6 French avec compression manuelle.

Produit de contraste utilisé: OMNIPACQUE. : 50 mL

Matériel utilisé:

- GUIDE 0.35/150 (Autre) N° 37270.
- TRODUCTEUR AVANTIS 6F (Autre) N° 18119577.
- PACK ANGGIO LOHMANN (Autre) N° 2322380072.

Dr. ASSAIDI ANASS
Professeur de Cardiologie Interventionnelle

CORONAROGRAPHIE

Réseau coronaire gauche :


Tronc commun: Le tronc commun est de longueur normale. Le tronc commun , englobant l'origine de de l'artère circonflexe proximale est indemne de resténose du site d'implantation du stent actif. Le diamètre de référence est de 3.5 mm à ce niveau. Le lit d'aval est normal, non infiltré. Le flux coronaire est normal (TIMI 3).

IVA: L'artère interventriculaire antérieure est de taille normale. L'artère interventriculaire antérieure moyenne présente une occlusion aigüe de plus de 20 mm de long, peu calcifiée, discrètement irrégulière et de type C du site d'implantation du stent actif. Cette lésion s'étend jusqu'à l'artère interventriculaire antérieure distale. Le diamètre de référence est de 3.5 mm à ce niveau. Le lit d'aval n'est pas visualisé. Il n'existe pas de flux antérograde (TIMI 0).

Circonflexe: L'artère circonflexe est une artère coronaire de taille normale. L'artère circonflexe est indemne de lésion coronaire significative.

Réseau coronaire droit :

L'artère coronaire droite est de taille normale et équilibrée. L'artère coronaire droite proximale présente une occlusion ancienne de plus de 20 mm de long et de type C. Cette lésion s'étend jusqu'à l'artère coronaire droite moyenne. Le diamètre de référence est de 2.5 mm à ce niveau. Le lit d'aval n'est pas visualisé. Il existe une discrète reprise par collatéralité au niveau des branches de cette artère (Rentrop grade 1) provenant du réseau interventriculaire antérieure. Il n'existe pas de flux antérograde (TIMI 0).



INTERNATIONAL clinic

CONCLUSION

Absence de resténose longue du tronc commun au niveau du site d'implantation du stent actif, englobant l'origine de l'artère circonflexe proximale (lésion de bifurcation). Occlusion aigüe longue thrombotique de l'artère interventriculaire antérieure moyenne au niveau du site d'implantation du stent actif. Occlusion chronique longue de l'artère coronaire droite proximale avec reprise partielle par le réseau de l'artère interventriculaire antérieure.

Dr. ASSAID NASSASSAIDI
Pr ANASS ASSAIDI
Professeur de Cardiologie Internationale



INTERNATIONAL clinic

ANGIOPLASTIE
EXAMEN N° 7375, 04/08/2023

MOHAMED BNOU HANNA, 26/01/1953

- **Opérateurs:** Pr ANASS ASSAIDI
- **Correspondant:** Pr Mohamed ZOUBIDI

CLINIQUE

Indication : IDM antérieur en choc cardiogénique

Statut Clinique: Fréquence cardiaque: 75 /min. PAS: 193 mmHg. PAD: 93 mmHg.

TECHNIQUE

Voie d'abord: Artère fémorale droite - 6 French avec compression manuelle.

Produit de contraste utilisé: OMNIPACQUE. : 100 mL

Matériel utilisé:

- PT2 0.014 185cm MODERATE (Boston Scientific) N° 31453124.
- TREK 2.50 X 20 mm (Abbott) N° 20921G2.
- CATHE GUIDE XB 3.5 6F (Cordis) N° 18139293.
- XIENCE ALPINE 3.50 X 33 mm (Abbott) N° 2072741.


*Dr. ASSAIDI ANASS
Professeur de Cardiologie Interventionnelle*

CONTROLE ANGIOGRAPHIQUE

L'artère interventriculaire antérieure moyenne présente une occlusion aigüe de plus de 20 mm de long, peu calcifiée et de type C du site d'implantation du stent actif. Cette lésion s'étend jusqu'à l'artère interventriculaire antérieure distale. Il existe un thrombus intraluminal à ce niveau. Le diamètre de référence est de 3.5 mm à ce niveau. Le lit d'aval n'est pas visualisé. Il n'existe pas de flux antérograde (TIMI 0).

ANGIOPLASTIE CORONAIRES

La sonde porteuse CATHE GUIDE XB 3.5 6F est positionnée au niveau du tronc commun. Mise en place d'un ballon TREK 2.50 X 20 mm au niveau de l'artère interventriculaire antérieure moyenne pour pré-dilater la lésion. Mise en place d'un stent actif XIENCE ALPINE 3.50 X 33 mm au niveau de l'artère interventriculaire antérieure moyenne. Après contrôle angiographique final, l'artère interventriculaire antérieure moyenne est indemne de lésion significative. Il n'existe pas de trait de dissection visible. Il n'existe pas d'argument pour un thrombus à ce niveau. Le flux coronaire est normal (TIMI 3). Aucun spasme n'a été induit durant la procédure.



INTERNATIONAL clinic

CONCLUSION

Succès de recanalisation de l'artère interventriculaire antérieure moyenne. Implantation de 1 stent actif en intrastent.

Dr. ASSAIDI ANASS
Professeur de Cardiologie Interventionnelle
ASSASS ASSAIDI