

883

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES


Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des soins Coefficient



Coefficient des travaux

Montant des soins

Début d'exécution

Fin d'exécution

Coefficient des travaux


Montant des soins

Date du devis

Fin d'exécution

O.D.F. Prothèses dentaires

Détermination du coefficient masticatoire



D	H
25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553

(Création, Remont, adjonction)
Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession

Visa et cachet du praticien

attestant le devis

Visa et cachet du praticien

attestant l'exécution

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mme 883

Nom & Prénom

Bel Ghana Fatma

Signature de
l'adhérent

Fonction

Phones 06.47.42.27.00

Mail

MEDECIN

Prénom du patient

Adhérent Conjoint Enfant Age

Date 17/04/19

Nature de la maladie

Cathéterisme
Diabète et hypertension

Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des

honoraires

Création
+ Echo Doppler
Cathéterisme

116

= 300 DH

Fin d'exécution

KSS

= 700 DH

Signature et
Dr JARDANEH Hassan

CARDIOLOGUE
386, Av. Jemaa El Fna
Tel 022 2612100

PHARMACIE

Date 17/04/19

Montant de la facture

103,30

PHARMACIE IBN ROUCHD
Mehdi BELAYACHI
355, Av. Reda Guedira, Cité El Mad
Casablanca 10200

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date

Désignation des
Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

AUXILIARIES MEDICAUX

Date

Nombre

AM PC IM IV

Montant détaillé des

Honoraires

CACHET

عيادة أمراض القلب والشرايين واللطف الدموي

Docteur JARDANEH Hassan
CARDIOLOGUE

Spécialiste des Maladies du Coeur
des Vaisseaux et de l'Hypertension Artérielle

Diplômé de la Faculté de Médecine de Caen - France
et de Bruxelles - Belgique

Ancien Attaché des Hopitaux de Bruxelles
Echo - Doppler Couleur Cardiaque



الدكتور حسن جرданه
اختصاصي

أمراض القلب والشرايين واللطف الدموي

فريج كلية الطب بكان - فرنسا

وبروكسيل بيلجيما

طبيب مقيم سابق بمستشفيات بروكسيل

Dr JARDANEH Hassan
CARDIOLOGUE
386, Av. Idriss El Harti
Tél. 022 55 12 12 Casablanca

Casablanca, le : 19/04/2013

Belgrena Béthia
4780 2) Covaceal Gw
18/04/2013 3) ~~PHARMACIE IBN ROUCHD
Mehdi BELAYACHI
355, Av. Reda Guedira, Cité Djamaa
Casablanca - Tel. 03 22 07 06~~
27/04) Risorde 107
86.90 Yg sub hujjal ve corse
3 PPSIKT 2013
a) Jelal Ben Sibhi
Dr JARDANEH Hassan
386, Av. Idriss El Harti
Tél. 022 55 12 12 Casablanca
Dr JARDANEH Hassan
CARDIOLOGUE
386, Av. Idriss El Harti
Tél. 022 55 12 12 Casablanca
R) 15/04/2013
Roukha 1000
à 50 33

386, Avenue Idriss El Harti - Derb Douam - Cité Djamaa - (Ben M'sik) - 1er étage

CASABLANCA - Tél. & Fax : 0522 55 12 12

203,30

CORVASAL® 2 mg

molsidomine

Comprimé sécable

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de commencer votre traitement. Elle contient des informations sur

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca

Corvasal 2 mg, cp b 30
P.P.V : 47,80 DH



avez un
à votre

6 118001 080335

*doute, demandez à votre
médecin ou votre pharmacien. Ce médicament a été prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.*

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

sanofi aventis

En cas d'insuffisance hépatique, il est recommandé d'augmenter la posologie de manière progressive. Il n'est pas logique d'associer la molsidomine avec les dérivés nitrés retard, dans la mesure où leur mécanisme d'action est similaire.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec le VIAGRA (sildénafil), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Grossesse - Allaitement

Risordan® 10 mg

Composition :

Dinitrate d'isosorbide 10 mg
Excipients q.s pour un comprimé

Forme et présentation pharmaceutique :

Comprimés sécables dosés à 10 mg, boîte de 60

Indications thérapeutiques :

- Traitement préventif des crises d'angine de poitrine
- Insuffisance cardiaque congestive.


Contre-indications :

Hypersensibilité aux dérivés nitrés.

Posologie et mode d'emploi :

Se conformer aux prescriptions du médecin

Voie orale. A avaler sans croquer ni sucer.



Effets indésirables :

Possibilité de céphalées, de troubles digestifs et de ~~et~~ sudoratation cutanée avec érythème. Tendance à une baisse tensionnelle ~~vers~~ de l'instauration du traitement.

Conditions de délivrance :

Ce médicament est inscrit sur la liste II (Tableau C)

Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants.



Laboratoires SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Benou El Aouam

Roches Noires - Casablanca

A. Benkabbou, Pharmacien Responsable

bronchokod

carbocisteine

NTATIONS :

OP

n de 125 ml

n de 125 ml

n de 300 ml

SUCRE. So

ultes { flac
flac



	Sirop enfants	Sirop adultes
bocisteine	2 g	5 g
cipient q.s.p	100 ml	100 ml

toire : Parahydroxybenzoate de méthyle et Saccharose.

SUCRE

	Solut. Buv. Adultes
bocisteine	5 g
cipient q.s.p	100 ml

toire : Parahydroxybenzoate de méthyle.

IPPSIUM® 20 mg et 40 mg
Gélules gastro-résistantes
Boîtes de 7, 14 et 28
ESOMÉPRAZOLE

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez y avoir besoin de la lire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez des informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui faire du mal.
- Si l'un des effets indésirables décrits ci-dessous est grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT
Composition qualitative et quantitative

par gélule
 Esoméprazole (DC) sous forme d'Esoméprazole magnésique trihydrate 20 mg ou 40 mg
 0,50 1 gélule

Excipients (communs) :

Excipients à effet Notoire :

Saccharose et Maltodextrine

Classe pharmaco-thérapeutique :

Inhibiteur de pompe à protons

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Adultes à 20 mg :

• Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• Ulcère de l'estomac ou duodénal (intestin grêle) en cas d'infection par un bactéria appelée Helicobacter Pylori. Si vous êtes dans cette situation, votre médecin vous prescrira également vous des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

• Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IPPSIUM peut aussi être utilisé pour bloquer la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

• Un excès d'acide dans l'estomac (GA) à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus :

• Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• Un reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Instructions pour un bon usage

Prenez ce médicament exactement comme votre médecin ou à votre pharmacien prescrit. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien ce qu'il faut faire.

Adolescents âgés de 12 ans et plus :

• Le reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• Un reflux gastro-oesophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller.

• Si votre médecin vous a demandé de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Votre corps

Mode d'administration

Vous pouvez prendre ces gélules à n'importe quel moment de la journée pendant ou en dehors des repas. Avez ces gélules avec un verre d'eau. Les gélules comme leur contenu ne doivent pas être mordus ni croqués. En effet, les gélules contenant du médicament de l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

Pathologie

• Votre médecin vous dira le nombre de Gélules à prendre et la durée du traitement. Cela dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre foie.

• Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous :

Adultes âgés de 18 ans et plus :

• Traitements des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et douleurs acides) :

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'oesophage, la dose recommandée est de 40 mg d'IPPSIUM une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une

guérison complète.

• La dose recommandée est d'IPPSIUM 20 mg une fois par jour.

• Si votre ulcère

symptômes obtenu

• Gélule d'IPPSIUM 20 mg

• Si vous avez une crise d'ulcère

ulcère du duodénum

• La dose recommandée

pendant une semaine

• La

عيادة أمراض القلب والشرايين والظغط الدموي

Docteur JARDANEH Hassan
CARDIOLOGUE

Spécialiste des Maladies du Coeur
des Vaisseaux et de l'Hypertension Artérielle

Diplomé de la Faculté de Médecine de Caen - France
et de Bruxelles - Belgique

Ancien Attaché des Hopitaux de Bruxelles
Echo - Doppler Couleur Cardiaque



الدكتور حسن جردانه
اختصاصي

أمراض القلب والشرايين والظغط الدموي
خريج كلية الطب بكان - فرنسا
وبروكسيل ببلجيكا

طبيب ملحق سابق بمستشفيات بروكسيل
فحص القلب بالصدى بالألوان

Casablanca, le :

17/09/2019

Facture d'Echo n° 70/2019

Dr JARDANEH Hassan
CARDIOLOGUE
386, Av Idriss El Harti
Tél 022 55 12 12 Casablanca

1) Echodoppler couleur
cardiaque

Reçus la somme de

Dr JARDANEH Hassan
CARDIOLOGUE
386, Av Idriss El Harti
Tél 022 55 12 12 Casablanca

Sept cent DHs

(700DHs)

Examen de qualité technique moyenne.

Contractilité globale et segmentaire du ventricule gauche est conservée. La FEVG est estimée à 55 %. Ventricule gauche de dimensions normales.

Hypertrophie ventriculaire gauche concentrique modérée avec présence d'un petit bourrelet septal non obstructif.

Trouble de la relaxation ventriculaire gauche.

Valve Mitrale : Feuilles sont épaissies. Petite valve calcifiée, rigide. Cinétique d'ouverture de la GVM est normale.

Insuffisance mitrale minime.

Oreillette gauche : Non dilatée (17 cm² de surface) libre de Thrombus.

Valve Aortique : Sigmoïdes sont épaissies. Cinétique d'ouverture est normale. Pas de fuite ni de sténose.

Valve pulmonaire : Aspect est normal. Cinétique d'ouverture est normale. Doppler est normal.

Valve tricuspidale : Feuilles sont fins. Cinétique d'ouverture est Normale. Doppler est normal.

Ventricule droit : Non dilaté de contractilité globale conservée. TAPSE à 23.

Oreillette droite non dilatée.

Pas d'épanchement péricardique.

Pas de thrombus intra cavitaire visible.

Conclusions :

Cardiomyopathie hypertensive non dilatée à contractilité globale conservée. La FEVG est estimée à 55 %.

Trouble de la relaxation ventriculaire gauche.

Insuffisance mitrale minime. OG non dilatée.

Pression de remplissage du VG ne sont pas élevées.

DR JARDANEH HASSAN
CARDIOLOGUE
386 AV 10156 EL HARI
TÉL 322 55 12 Casablanca

COMpte RENDU D'EXAMEN ECHOCARDIOGRAPHIQUE

DOPPLER COULEUR

Nom: BELGUANA FATNA

Age : 79 ans

Date: 17/04/2019

Motif de l'examen : HTA, Dyspnée ; I coronaire, I rénale

	Valeurs normales	Valeurs observées
Aorte : D.I.A	17.5 à 32 mm	30
Valve aortique		Sigmoïdes sont épaissies. Cinétique d'ouverture est normale.
O.I. sigmoïdienne	15 à 26 mm	14
Flux aortique	1 à 1.7 m/s	1.43
I.A		Non
OG	18 à 40 mm	34
Valve mitrale		PV calcifiée, rigide. Cinétique d'ouverture GVM est normale.
Distance D-E	17 à 33 mm	Normale
Pente EF	75 à 150 mm/s	49
Flux mitral	0.6 à 1.3 m/s	E 0.57, A 0.76
Indice de remplissage	E/A >1	< à 1
FA		IM minime
Ventricule gauche		
D.T.S	29 à 36 mm	34
D.T.D	38 à 56 mm	47
Septum	6 à 11 mm	13
Paroi postérieure	6 à 11 mm	13
F.R		28 %
F.E	>65%	55 %
D. Ventricule droit	7 à 23 mm	18
Valve pulmonaire	0.6 à 0.9 m/s	Aspect normal
Valve tricuspidé		Aspect normal
Flux T.	0.3 à 0.7 m/s	
Péricarde		Sec

