

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des travaux										
				 Montant des soins Début d'exécution Fin d'exécution 										
O.D.F. Prothèses dentaires	Détermination du coefficient masticatoire			Coefficient des travaux 										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td><td>21433552</td></tr> <tr> <td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr> <td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr> <td>35533411</td><td>11433553</td></tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553	G Montant des soins Date du devis Fin de
H														
25533412	21433552													
00000000	00000000													
00000000	00000000													
35533411	11433553													
	D (Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession													



DATE DE DEPOT

...../...../201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 1209	
Nom & Prénom DERKAoui TALiKA			
Fonction : Veuve		Phones 06 74 26 10 04	
Mail amine_beggaoui@gmail.com			
MEDECIN		Prénom du patient DERKAoui TALiKA	
Adhérent ☐ Conjoint ☐ Enfant ☐		Age	Date 15/06/19
Nature de la maladie		Date 1ère visite	
AFFECTIION DIGESTIVE			
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Nature des actes		Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
C3			250,00
PHARMACIE		Date 15/06/19	
Montant de la facture		867,00 + 248,10	
ANALYSES - RADIOGRAPHIES		Date 15/06/19	
Designation des Coefficients		Montant détaillé des Honoraires	
		400,00	
LIAIRES MEDICAUX		Date 15/06/19	
Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
PC	IM	IV	1500,00

Professeur Salwa Nadir

Spécialiste en Hépto-Gastroentérologie

D.U. "Hépatites Virales-Cytokines"

Echographie et Endoscopie Digestives

D.U "Explorations Fonctionnelles Digestives"

D.U "Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin"

Proctologie Médicale et Chirurgicale



الدكتورة سلوى ندير

أستاذة جامعية سابقا بكلية الطب

ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي

التشخيص بالمنظار والصدى

أمراض وجراحة الشرج

Casablanca, le.....15.06.2019.....في الدار البيضاء،

Mme DERKAOU Malika

Prendre :

TEFOVIR

1 comprimé par jour, après le repas, pendant 3 mois.

STE PHARMACIE HAMZA
CASABLANCA
Lots. Haj fatch Rue G N° 3 Lot. 64
Casablanca - Tél: 0522 93 10 20

Professeur Salwa NADIR
Hépto-Gastro-entérologie
Proctologie Médicale et Chirurgicale

Professeur Salwa NADIR

En cas d'urgence : 06 61 46 84 96

120, Bd. Moulay Idriss 1er, 4^{ème} étage N°10 - Tél. : 05 22 86 27 86 - Fax : 05 22 86 34 39 - رقم 10 - شارع مولاي إدريس الأول، الطابق 4،
مصحة دار السلام، 728، شارع مودي بوكيتا، الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 85 14 14 - Tél. : 05 22 85 14 14 - Clinique Dar Salam, 728, Bd. Modibokeita - Casablanca 20100

E-mail : salwanadir@yahoo.fr: البريد الإلكتروني - Site web : www.prnadirsalwa.com/www.prnadirsalwa.ma: الموقع الإلكتروني

Tefovir[®] Pharma 5

Ténofovir disoproxil fumarate

LOT 1454
PER 02-21
PPU 289 DH

300 mg

Voie orale
30 Comprimés pelliculés

Tefovir[®] Pharma 5

Ténofovir disoproxil fumarate

300 mg

30 Comprimés pelliculés

Voie orale

PHARMA 5

Tefovir[®] Pharma 5

Ténofovir disoproxil fumarate

LOT 1454
PER 02-21
PPV 289 DH

300 mg

Voie orale
30 Comprimés pelliculés



Tefovir[®] Pharma 5

Ténofovir disoproxil fumarate

300 mg

30 Comprimés pelliculés

Voie orale

PHARMA 5

Tefovir[®] Pharma 5

Ténofovir disoproxil fumarate

LOT 1454
PER 02-21
PPU 289 DH

300 mg

Voie orale
30 Comprimés pelliculés

Tefovir[®] Pharma 5

Ténofovir disoproxil fumarate

300 mg

30 Comprimés pelliculés

Voie orale

PHARMA 5

Professeur Salwa Nadir

Spécialiste en Hépatogastro-entérologie

D.U. "Hépatites Virales-Cytokines"

Echographie et Endoscopie Digestives

D.U "Explorations Fonctionnelles Digestives"

D.U "Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin"

Proctologie Médicale et Chirurgicale



الدكتورة سلوى ندير

أستاذة جامعية سابقا بكلية الطب

ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي

التشخيص بالمنظار والصدى

أمراض وجراحة الشرج

Casablanca, le 15.06.2019 في الدار البيضاء

Mme DERKAOU Malika

Prendre :

1 - RACIPER 40MG

1 comprimé le matin, avant le repas, pendant 14 jours.

2 - CORTANCYL 20 mg cp séc : Plq/20

1 comprimé le matin, pendant 10 jours.

3 - NEWFLEX CHAUFFANT

1 application le matin et le soir, pendant 10 jours.

STE PHARMACIE HANZA
CASABLANCA
Lotte Haj fatch Rue 6 N° 3 Lot. 64
Casablanca - Tél: 0522 93 10 28

Professeur Salwa NADIR
Hépatogastro-entérologie
Proctologie Médicale et Chirurgicale

Professeur Salwa NADIR

En cas d'urgence : 06 61 46 84 96

120, Bd. Moulay Idriss 1er, 4^{ème} étage N°10 - Tél. : 05 22 86 27 86 - Fax : 05 22 86 34 39 - رقم 10 - الطابق 4، شارع مولاي إدريس الأول، 120،
Clinique Dar Salam, 728, Bd. Modibokeita - Casablanca 20100 - Tél. : 05 22 85 14 14 - الهاتف : 728، شارع مودي بوكيتا، الدار البيضاء - مصحة دار السلام،

E-mail : salwanadir@yahoo.fr : البريد الإلكتروني - Site web : www.prnadirsalwa.com/www.prnadirsalwa.ma : الموقع الإلكتروني

CODE No.: HP/DRUGS/MNB/95/2



Raciper®
ole magnésium

g et 40mg

stants en boîtes de 7, 14 et 28

lité de cette notice avant de prendre ce
cir besoin de la relire.
si vous avez un doute, demandez plus
votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à
quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. COMPOSITION DU MÉDICAMENT

Chaque comprimé gastro-résistant contient 20mg ou 40mg de substance active :
Esomeprazole (sous forme d'esomeprazole magnésium).
Les autres composants sont : Sphères de sucre, Hydroxypropylcellulose (HPC-L),
Crospovidone (PPXL-10), Povidone (PVP K-30), Macrogol 400, Talc purifié,
Hypermellose phthalate (HP-55S), Hypermellose phthalate (HP-50), Diethylphthalate,
Macrogol 6000, Cellulose microcristalline PH101, Cellulose microcristalline PH112,
Crospovidone (PPXL), Fumarate de sodium stéaryle, Opadry 03B86651 marron,
Macrogol 4000, Alcool isopropylique, Acétone, Chlorure de méthylène, Eau purifiée.
Liste des excipients à effet notoire : saccharose (sphères de sucre).

2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

RACIPER® contient une substance active appelée esomeprazole. C'est un médicament
de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau
de l'estomac.

3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

RACIPER® 20 mg, comprimés gastro-résistants sont utilisés dans le traitement des
maladies suivantes:

Adultes et jeunes gens âgés de 12 ans et plus

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de
l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
l'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée

- Troubles rénaux sévères.
- Gonflement des seins chez l'homme.

**Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut pas être estimée à partir des
données disponibles).**

· Si vous prenez RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants pendant plus de
trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles
taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires
involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une
accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en
informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également
entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin
pourra décider d'effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de
magnésium.

· Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées)

RACIPER® peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit
immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une
infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très
importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs
dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un
déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est
important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

Ne soyez pas inquiet par cette liste d'effets indésirables possibles, vous pouvez n'en avoir
aucun.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains
effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.

7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants

· Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

· Si vous avez des problèmes rénaux sévères.

Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant toute administration de RACIPER®
20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants.

RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants peuvent masquer des symptômes
d'autres maladies. Si vous prenez RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants,
vous devez informer immédiatement votre médecin si :

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,
- Vous vomissez de la nourriture ou du sang,
- Vous avez des selles noires teintées de sang.

En cas de prescription d'un traitement « à la demande » en fonction des besoins, vous
devez contacter votre médecin si les symptômes persistent ou se modifient.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que RACIPER® 20 mg et 40mg,
comprimés gastro-résistants, en particulier sur une période supérieure à un an, peut
légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres.
Si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes

Cortancyl® 20 mg

Prednisone

Comprimé

45,80

IDENTIFICATION

Composition

Prednisone

Excipients : amidon
comprimé sécable

Forme pharmaceutique

Comprimé sécable

Classe pharmacothérapeutique

GLUCOCORTICOÏDE - USAGES

(H : Hormones non sexuelles)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies
anti-inflammatoires.

Cortancyl® 20mg

20 Comprimés



ATTENTION !

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- antécédent d'allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladies du colon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment

WÄRMENDES ENTSPANNUNGS-GEL

Lockert und entspannt

Was ist newflex wärmendes Entspannungs-Gel und wann wird das Produkt angewendet?

newflex wärmendes Entspannungs-Gel ist zur unterstützenden Anwendung bei stark beanspruchter Haut und Muskeln, beispielsweise am Rücken, den Schultern und den Gelenken konzipiert. Für mehr Beweglichkeit im Alltag, mit natürlichen, entspannenden und glättenden, wohltuenden, ätherischen Pflanzenölen. Enthält keine Parabene und ist dermatologisch getestet.

Entspannend, wärmend, entkrampfend, wohltuend, regt die Durchblutung an. Pflegend und beruhigend bei trockener Haut.

Was sollte bei der Anwendung von newflex wärmendes Entspannungs-Gel beachtet werden?

Es ist wichtig, die Anwenderinformation zu befolgen!

Wann darf newflex wärmendes Entspannungs-Gel nicht angewendet werden?

Bei newflex wärmendes Entspannungs-Gel sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine unerwünschten Wirkungen bekannt.

Verwenden Sie newflex wärmendes Entspannungs-Gel nicht:

- bei offenen Wunden
- in Verbindung mit luftdicht abschließenden Kompressen
- vor Sonnenbädern oder Sonnenbankanwendungen

Wann ist bei der Anwendung von newflex wärmendes Entspannungs-Gel besondere Vorsicht geboten?

- Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
- Informieren Sie eine Fachperson, wenn Sie an Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Medikamente einnehmen. Dies gilt auch für Medikamente, die Sie selbst gekauft haben.

Wie wenden Sie newflex wärmendes Entspannungs-Gel an?

newflex wärmendes Entspannungs-Gel ist für die mehrmalige Anwendung entwickelt worden. Tragen Sie das Produkt mehrmals täglich auf die entsprechenden Körperstellen auf.

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie Fachpersonal wie Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendungshinweise:

Tragen Sie das Produkt auf die entsprechenden Hautpartien auf und massieren Sie es mit dem Roller gründlich ein.

Welche unerwünschten Wirkungen kann newflex wärmendes Entspannungs-Gel haben?

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind bisher keine unerwünschten Wirkungen bekannt geworden.

Was ist ferner zu beachten?

- Vor Kinder geschützt aufbewahren!
- Vor Wärme schützen! Bei Raumtemperatur lagern.
- Nicht in die Augen bringen. Zitronenöl kann die Haut reizen.
- Nicht zum Verzehr bestimmt.
- Das Präparat darf nur bis zu dem auf dem Umkarton bzw. Behälter angegebenen Verfallsdatum (EXP) verwendet werden. Nach Anbruch nicht länger als 12 Monate verwenden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden!

Was ist in newflex wärmendes Entspannungs-Gel enthalten?

AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, MENTHOL, PINUS PUMILIO LEAF OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL, GAULTHERIA PROCUMBENS LEAF OIL, BENZYL BENZOATE, CITRUS LIMON PEEL OIL, PHENOXYETHANOL, ETHYL ACETATE, AMMONIUM HYDROXIDE, ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL, CITRAL, BENZYL ALCOHOL

Hersteller:

New Care AG, CH-4452 Itingen, Switzerland

New Care AG, CH-4452 Itingen
EU Office: Kreillerstr. 65, 81673 Muenchen / Germany



02/21



170301



03/17

ISOPHARM
Newflex Chausant
79.80DH

Ulotka informacyjna

PL

GEL
O-

suującym

ak się go stosuje?

zony do stosowania w stanach
wzmoczonego napięcia i skurczów mięśni, np. mięśni barku, pleców lub okolicy łędzio-
wej. Zwiększa i poprawia mobilność stawów w codziennej aktywności ruchowej. Dzięki
zawartości wyciągów z roślin o specyficznych właściwościach ma działanie relaksują-
ce, odprężające i kojące. Nie zawiera parabenów (substancji konserwujących). Testo-
wany dermatologicznie.

Relaksuje, rozgrzewa, obniża napięcie mięśniowe, poprawia mikrokrążenie.
Działa ochronnie i łagodząco na skórę.

O czym należy wiedzieć przed użyciem Żelu rozgrzewająco- relaksującego Newflex?

Przed użyciem zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Kiedy nie należy stosować Żelu rozgrzewająco- relaksującego Newflex?

Nie zaleca się wystąpienia objawów niepożądanych w przypadkach jego właściwe-
go zastosowania.

Nie należy stosować Żelu rozgrzewająco-relaksującego Newflex:

- Na otwarte rany
- Razem z opatrunkiem założonym na ranę
- Bezpośrednio przed opalaniem się na słońcu lub w solarium

Kiedy należy zachować szczególne środki ostrożności?

- Nie ma szczególnych środków ostrożności, jeżeli produkt stosuje się zgodnie z zaleceniami.
- Jeżeli korzystasz z pomocy medycznej, poinformuj, na jakie aktualnie cierpisz schorzenia, czy masz alergię, jakie leki zażywasz, także takie, które kupujesz bez recepty.

Jak stosować Żel rozgrzewająco-relaksujący Newflex?

Żel rozgrzewająco- relaksujący Newflex jest przeznaczony do wielokrotnego użycia.

Żel należy rozmasować na skórze w miejscach odczuwania bólu i napięcia mięśni.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób użycia:

Nanieść odpowiednią ilość żelu na wybraną część ciała i za pomocą kulki (rollera) ener-
gicznie rozmasować na skórę.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Żelu rozgrzewająco- relaksującego Newflex?

Do tej pory nie są znane żadne efekty uboczne i działania niepożądane, jeżeli produkt
używany jest zgodnie z zaleceniami.

O czym jeszcze należy wiedzieć stosując Newflex żel rozgrzewająco- relaksujący?

- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Chronić przed przegrzaniem! Przechowywać w temp. pokojowej.
- Nie dopuszczać do kontaktu z oczami. Olejek cytrynowy – jeden ze składników produktu może mieć działanie drażniące.
- Produkt tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować po upływie daty ważności (EXP) podanej na opakowaniu. Po otworze-
niu produkt można używać przez 12 miesięcy.

Skład produktu:

AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, MENTHOL, PINUS PUMILIO LEAF OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL, GAULTHERIA PROCUMBENS LEAF OIL, BENZYL BENZOATE, CITRUS LIMON PEEL OIL, PHENOXYETHANOL, ETHYL ACETATE, AMMONIUM HYDROXIDE, ROSMARINUS OFFICINALIS FLOWER OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL, CITRAL, BENZYL ALCOHOL

Professeur Salwa Nadir

Spécialiste en Hépatogastroentérologie

D.U. "Hépatites Virales-Cytokines"

Echographie et Endoscopie Digestives

D.U "Explorations Fonctionnelles Digestives"

D.U "Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin"

Proctologie Médicale et Chirurgicale



الدكتورة سلوى ندير

أستاذة جامعية سابقا بكلية الطب
ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي

التشخيص بالمنظار والصدى

أمراض وجراحة الشرج

Casablanca, le 15/06/2019 في الدار البيضاء

Note d'honoraires

Professeur Salwa NADIR

Hépatogastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Le docteur

a l'honneur de présenter ses compliments

à Mr (Mme) Derkouri Ep Beggal Malika

et lui adresse selon l'usage sa note d'honoraires ;

soit la somme de 1500,00 dhs.

pour FIBROSCAN

Professeur Salwa NADIR

Hépatogastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Clinique Dar Essalam

120, Bd. My Idriss 1er Casa - Tél: 0522 86 27 27 / 85 14 14

En cas d'urgence : 06 61 46 84 96

120, Bd. Moulay Idriss 1er, 4^{ème} étage N°10 - Tél. : 05 22 86 27 86 - Fax : 05 22 86 34 39 - 10 رقم 4، الطابق 4، شارع مولاي إدريس الأول، 120،
مصحف دار السلام، 728، شارع موديبوكيتا، الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 85 14 14 - Tél. : 05 22 85 14 14

E-mail : salwanadir@yahoo.fr ، البريد الإلكتروني - Site web : www.pnadirsalwa.com/www.pnadirsalwa.ma الموقع الإلكتروني

Professeur Salwa Nadir

Spécialiste en Hépatogastroentérologie

D.U. "Hépatites Virales-Cytokines"

Echographie et Endoscopie Digestives

D.U "Explorations Fonctionnelles Digestives"

D.U "Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin"

Proctologie Médicale et Chirurgicale



الدكتورة سلوى ندير

أستاذة جامعية سابقا بكلية الطب

ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي

التشخيص بالمنظار والصدى

أمراض وجراحة الشرج

Casablanca, le 15/06/2018 في الدار البيضاء

Note d'honoraires

Professeur Salwa NADIR
Hépatogastroentérologie
Proctologie Médicale et Chirurgicale
Clinique Dar Essalam

Le docteur

a l'honneur de présenter ses compliments

à Mr (Mme) Dehkraoui Ep Beggal Nalika

et lui adresse selon l'usage sa note d'honoraires ;

soit la somme de 400,00 dhs.

pour ECHOGRAPHIE
ABDOMINALE

Professeur Salwa NADIR
Hépatogastroentérologie
Proctologie Médicale et Chirurgicale
Clinique Dar Essalam
120, Bd. My Idriss 1er Casa - Tél: 05 22 86 27 27 / 85 14 14

En cas d'urgence : 06 61 46 84 96

Casablanca 15/06/2019

Nom+Prénom: Mme DERKAOUI BEQQAL MALIKA

Age : Née en 1965

Indication: Hépatite B

COMPTE RENDU

- Foie de taille normale , d'échostructure homogène , de contours réguliers .
- Absence de dilatation des voies biliaires intrahépatiques .
- Absence de lésion focale hépatique .
- Vésicule biliaire libre. Sa paroi est fine.
- Tronc porte de calibre normal.
- Reins ,rate ,pancréas sans anomalie .

Conclusion : Echographie abdominale sans anomalie

Professeur **S. NADIR**
Hépatogastroentérologue
Proctologie, Endoscopie et Surrénales
120, Bd. Myrtille, Casablanca 10000
Tél: 05 39 39 10 10

[Signature]

PATIENT

Nom **DERKAOU BEQQAL**

Sexe Féminin

Prénom **MALIKA**


Médecin référent

Code


Date et heure 2019-06-15 14:50:48

Né(e) le 1965-01-01


Opérateur PR NADIR




E
4.7 kPa




E
4.7 kPa




E
4.3 kPa




E
4.1 kPa




E
4.3 kPa




E
4.8 kPa



E
5.6 kPa



E
4.3 kPa



E
4.6 kPa

Rapport d'examen

ETABLISSEMENT

CABINET D'HEPATO-GASTROENTEROLOGIE
120,BD.MOULAY IDRIS 1ER,4EME ETAGE N°10
TEL:0522864237-FAX:0522864237
CASABLANCA

PATIENT

Nom **DERKAOUI BEQQAL**

Né(e) le 1965-01-01

Prénom **MALIKA**

Sexe Féminin

Code

Médecin référent

EXAMEN

Date et heure 2019-06-15 14:50:48

Examen M (Liver)

Opérateur PR NADIR

Nombre de mesures valides 12

Dispositif Fibroscan 402 F40308

Nombre de mesures invalides 1

Sonde M 7 70947

Taux de réussite 92%

E (kPa)

Médiane

4.7


IQR*

1.1

IQR*/méd

23 %

*IQR: interquartile range



Commentaire:

Absence de fibrose significative

Pr S.NADIR

Professeur **S. NADIR**
Hépatogastroentérologie
Proctologie et Coloproctologie
Chirurgie de l'Obésité
120, Bd. Moulay El Cassa - Tél: 05 22 86 42 37 - 05 22 86 42 38