



## **SOINS ET PROTHESES DENTAIRES**

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.  
Veuillez fournir une facture  
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODT.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient							
				<b>Coefficient des travaux</b> <input type="text"/>						
				<b>Montant des soins</b> <input type="text"/>						
				<b>Début d'execution</b> <input type="text"/>						
				<b>Fin d'execution</b> <input type="text"/>						
<b>O.D.F. Prothèses dentaires</b>	Détermination du coefficient masticatoire			<b>Coefficient des travaux</b> <input type="text"/>						
	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">D</td> <td style="width: 33%;"><math>\frac{25533412}{00000000}</math></td> <td style="width: 33%;"><math>\frac{21433552}{00000000}</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: none;"><math>\frac{00000000}{35533411}</math></td> <td style="border-top: none;"><math>\frac{00000000}{11433553}</math></td> </tr> </table> <p>(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			D	$\frac{25533412}{00000000}$	$\frac{21433552}{00000000}$		$\frac{00000000}{35533411}$	$\frac{00000000}{11433553}$	<b>Montant des soins</b> <input type="text"/>
D	$\frac{25533412}{00000000}$	$\frac{21433552}{00000000}$								
	$\frac{00000000}{35533411}$	$\frac{00000000}{11433553}$								
				<b>Date du devis</b> <input type="text"/>						
				<b>Fin d'execution</b> <input type="text"/>						
Visa et cachet du praticien attestant le devis		Visa et cachet du praticien attestant l'execution								

<b>VOLET ADHERENT</b>	NOM : <b>MOUARI El Bouchairi Mme</b>	
<b>DECLARATION N°</b>	<b>P 17 / 0051742</b>	
Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes
	<b>250,00 - 2118,40</b>	
<b>Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois</b> Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle		



P17 / 051742

**DATE DE DEPOT**

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mme 5340		
Nom & Prénom Mounir d Bouchairi		Signature de l'adhérent		
Fonction	Phones			
Mail 0663517268				
MEDECIN	Prénom du patient Youssouf Bouelhous			
Adhérent <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/> Age .....		Date 09/06/19		
Nature de la maladie B.R.C.O pirelle		Date 1ère visite		
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances				
Nature des actes C2	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires 250 DT		
PHARMACIE Date 09/06/19		PHARMACIE SEMLALI Tél. 05.22.89.62.93		
Montant de la facture 2118,70		PHARMACIE SEMLALI Tél. 05.22.89.62.93		
ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date		CACHET		
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires 17 JUIN 2019			
AUXILLAIRES MEDICAUX Date ACCUEIL		CACHET		
Nombre		Montant détaillé des Honoraires		
AM	PC	IM	IV	

# Docteur AMRANI HENCHI SAIDA

Pneumo - ptysiologue

Maladies Respiratoires et Allergiques

Asthme, Rhinite, Tuberculose

Ronflement et Apnées du Sommeil

Adultes et Enfants

Ex Médecin au CHU Ibn Rochd

Et Hôpital Moulay Youssef



الدكتورة سعيدة حنفي عمرانى

اختصاصية

في أمراض الجهاز التنفسى

الضيق ، داء السل

كبار وأطفال

طبيبة سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد  
و مستشفى مولاي يوسف

Casablanca, le .....

٠٩٦٥١١٩

الدار البيضاء، في

M. Mouzali D

Pharmacie

Sh 3,00x2



① Velcro.

PHARMACIE SEMALI  
n°83, Angle des Rues 11 et 1,  
Boulevard El Khadir  
Tél : 05.22.33.62.93

M 50,00



②

Flexalast

abouff x 11 x 2unis

M 1.20x2



③

Coloxine

PHARMACIE SEMALI  
n°83, Angle des Rues 11 et 1,  
Boulevard El Khadir  
Tél : 05.22.33.62.93

Gel 11840

Dr. AMRANI HENCHI SAIDA  
Pneumo-ptysiologue et Allergologue  
Résidence FIRDAOUS, Groupe H 25 A  
Tél : 05 22 89 02 02

شارع أم الربيع - إقامة الفردوس - مجموعة ه 25 - الطابق السفلي - الدار البيضاء - الهاتف: 05 22 89 02 02  
Boulevard Oum Rabii, Résidence FIRDAOUS, Groupe H 25 A, Rez de chaussée - Casablanca - Tél.: 05 22 89 02 02

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 150,00 DH  
6 118001 140336

TICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**FLIXOTIDE®**

suspension pour inhalation en flacon pressurisé  
125 microgrammes/dose  
250 microgrammes/dose

Propionate de fluticasone

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que FLIXOTIDE, suspension pour inhalation en flacon pressurisé et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLIXOTIDE, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
3. Comment utiliser FLIXOTIDE, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver FLIXOTIDE, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
6. Informations supplémentaires

**1. QU'EST-CE QUE FLIXOTIDE, SUSPENSION POUR INHALATION EN FLACON PRESSURISÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ****GLUCOCORTICOÏDE PAR VOIE INHALÉE  
ANTI-ASTHMATIQUE**

Ce médicament est un corticoïde qui s'administre par voie inhalée.

C'est un médicament anti-inflammatoire préconisé en prises régulières pour le traitement de fond quotidien de l'asthme.

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical, même en cas d'amélioration très nette des symptômes.

**Attention : ce médicament n'est pas un bronchodilatateur.  
Il ne permet pas le traitement de la crise d'asthme.**

Il n'apporte pas de soulagement immédiat. Il est en particulier sans action sur la crise d'asthme déclarée.

Son efficacité ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours et dépend du respect rigoureux de la posologie (dose et nombre de prises) prescrite par votre médecin et adaptée à votre cas.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FLIXOTIDE,  
SUSPENSION POUR INHALATION EN FLACON PRESSURISÉ**

N'utilisez jamais FLIXOTIDE, suspension pour inhalation en flacon pressurisé.

En cas de survenue de majoration de la gêne respiratoire à la suite de l'inhalation de ce produit, ne pas renouveler la prise de ce médicament, mais contacter votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

Faites attention avec FLIXOTIDE, suspension pour inhalation en flacon pressurisé :

Mises en garde spéciales

En cas de survenue de crises ou de gêne respiratoire, il faut utiliser un autre médicament.

# 250 et 500 mg

axétil), comprimés

141DH20

194022/2  
03/2021

Dans les sinusites maxillaires aiguës,  
rôle son efficacité.

500 mg/jour en 2 prises.  
10 mg/jour.

Posologie adulte :  
Infections respiratoires basses autres  
500 mg/jour en 2 prises, qui est atteinte

1000 mg/jour en 2 prises, qui  
34 kg.  
Infections respiratoires basses autres

$t_s < 17 \text{ kg}$  :  
La durée de traitement de certaines

qu'une pneumopathie bactérienne :  
 $t_s > 17 \text{ kg}$  :  
La durée de traitement de certaines

qu'une pneumopathie bactérienne :  
 $< 34 \text{ kg} : 30 \text{ mg/kg/jour en 2 prises.}$   
 $\geq 34 \text{ kg} : 1000 \text{ mg/jour en 2 prises.}$

1000 mg/jour en 2 prises.  
500 mg/jour en 2 prises.  
1000 mg/jour en 2 prises pendant 20

est inférieure à 20 ml par minute; il est  
nécessaire en une seule prise orale par jour.  
chaque fin de dialyse chez les patients

ans être croqués ni mordus, avec un  
de CEROXIM® 250 et 500 mg,  
consultez votre médecin ou votre  
pharmacien. Ne conservez pas de ce  
produit en 2 prises espacées de 12

15 à 30 minutes après les repas du matin et du soir.

## lement

ace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.  
de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que  
pleinement guéri.

L'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique,  
mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre  
traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Si vous avez pris plus de CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés que  
vous n'aurez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin.  
Dialyse en cas de surdosage.

Si vous oubliez de prendre CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés:  
Prenez la dose oubliée dès que vous vous en apercevez. Puis poursuivez le  
traitement selon l'ordonnance du médecin.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Infections et infestations :

- Fréquent : prolifération de candida.
- Affections hématoïdiennes et du système lymphatique :
- Fréquent : hyperéosinophilie.
- Peu fréquent : thrombocytopénie, leucopénie et/ou neutropénie (parfois sévères).

• Très rare : anémie hémolytique.

Affections du système immunitaire : réactions d'hypersensibilité incluant :

• Peu fréquent : éruption cutanée.

• Rare : urticaire, prurit.

• Très rare : fièvre, maladie sèrique, anaphylaxie.

Affections du système nerveux :

• Fréquent : céphalées.

• Peu fréquent : sensations vertigineuses.

Affections gastro-intestinales :

• Fréquent : troubles gastro-intestinaux incluant diarrhées, nausées, douleurs abdominales.

• Peu fréquent : vomissements.

• Rare : colitis pseudomembraneuse.

Affections hépatobiliaires :

• Fréquent : élévation transitoire du taux des enzymes hépatiques (ALAT, ASAT) et de la LDH.

• Très rare : hépatite, ictere cholestastique.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané :

• Très rare : érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell (nécrose toxique épidermique).

SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNÉS DANS CETTE NOTICE, OU SI CERTAINS EFFETS INDESIRABLES DEVIENT GRAVES, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

## 5. COMMENT CONSERVER CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.  
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égoût ou avec les  
ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des  
médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger  
l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés ?

La substance active est :	Céfuroxime (DCI) axétile.....	250 mg
Céfuroxime (DCI) axétile.....	500 mg	

Pour un comprimé.

Les autres composants sont :

Lauryl sulfate de sodium, Silice colloïdale anhydre, Cellulose microcrystalline, Carbonate de calcium, Croscarmellose sodique, Saccharose, Povidone, Citrate monosodique, Acide stéarique.

Qu'est-ce que CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés et contenu de l'emballage extérieur ?

CEROXIM® se présente en boîte de 10 comprimés, dosés à 250 ou à 500 mg de Céfuroxime Axétile.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

CONDITIONS DE DELIVRANCE : Tableau A (Liste I)

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Avril 2013

## CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

### QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus. Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques. Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- La date à prendre,
- Les moments de prise,
- Et la durée de traitement.

### EN CONSÉQUENCE, POUR PRESERVER L'EFFICACITÉ DE CE MEDICAMENT :

1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2- Respectez strictement votre ordonnance.

3- Ne réalisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

## SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

Siège social :

169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca

Site de fabrication :

Route côtière N°111, Km 12.400. Ain Harrouda, Mohammédia

24/22/1  
/2021**lité de cette notice avant de prendre ce****importantes sur votre traitement.****ns, si vous avez un doute, demandez plus**  
**informations à votre médecin ou à votre pharmacien.****• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais**  
**à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela**  
**pourrait être nocif.****Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.****Dans cette notice :**

- 1. QU'EST-CE QUE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?**
- 3. COMMENT PRENDRE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?**
- 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**
- 5. COMMENT CONSERVER CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?**
- 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**1. QU'EST-CE QUE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?****Antibiotiques antibactériens de la famille des bétalactamines, du groupe des céphalosporines de 2<sup>ème</sup> génération (Code ATC: J01DC02).****CEROXIM® est indiqué dans les :****- Infections de la sphère ORL :****Adulte et enfant : Angines et pharyngites, otites moyennes aiguës.****Adulte : Sinusite.****- Infections respiratoires basses :****Adulte : Bronchites aiguës et chroniques, pneumopathies bactériennes.****Enfant : Infection respiratoire basse.****- Infections génito-urinaires :****Pyélonéphrite, cystite et urétrite.****- Infection gonococcique aigüe non compliquée.****- Infections de la peau et des tissus mous.****- Traitement précoce de la maladie de Lyme chez l'adulte et l'adolescent.****2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés?****Ne prenez jamais, CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés si :****Vous êtes allergique aux antibiotiques du groupe des céphalosporines.****Faites attention avec CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés:****Mises en garde spéciales :****o Toute manifestation allergique (éruptions cutanées, démangeaisons...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.****En cas d'apparition des symptômes suivants: respiration sifflante, oppression de la poitrine, gonflement des paupières, du visage ou des lèvres, prenez immédiatement contact avec votre médecin, il pourra envisager d'interrompre le traitement.****o Avant de prendre ce traitement, prévenir votre médecin si à l'occasion d'un traitement antibiotique antérieur vous avez présenté une réaction allergique: une urticaire ou autres éruptions cutanées, démangeaisons, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique).****La prescription de céphalosporines nécessite un interrogatoire préalable.**  
**o La survenue de diarrhée au cours d'un traitement antibiotique ne doit pas être traitée sans avis médical.****o La prise de comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car elle peut entraîner une fausse route.****o Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée****chez les patients présentant une intolérance au saccharose héréditaire rare).****Précautions d'emploi****• En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la créatinine ou de la créatininémie.****• La fonction rénale doit être surveillée régulièrement en cas d'insuffisance rénale préexistante, chez les sujets âgés ou en cas d'associations d'antibiotiques potentiellement néphrotoxiques (Aminosides en posologie élevée, diurétiques), une atteinte de la fonction rénale ayant été observée.****• Comme avec d'autres antibiotiques, l'utilisation prolongée d'Axétil peut causer la sélection de germes non sensibles à l'antibiotique, Clostridium difficile, candida, ce qui nécessite l'interruption du traitement.****• La survenue exceptionnelle d'une diarrhée grave et persistante après l'emploi de l'antibiotique qui peut être symptomatique d'une pseudomembrane et impose l'arrêt du traitement. Le diagnostic après coloscopie nécessite la mise en route d'une antibiothérapie.****• Tenir compte de la teneur en sodium chez les personnes sujettes à l'hyposodé strict.****• Tenir compte de la teneur en saccharose dans la ration journalière (régime pauvre en sucres ou de diabète).****• Ce médicament peut occasionner une fausse réaction positive aux examens de laboratoires, notamment la glycoscopie (taux de sucres urinaires).****EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.****Prise ou utilisation d'autres médicaments****De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants ont été rapportés chez des patients recevant des antibiotiques, infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge et l'état général apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances, il peut être difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et le traitement dans la survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage impliquées : il s'agit notamment de fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du cotrimoxazole et certaines céphalosporines.****SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RECENTEMENT UN AUTRE MEDICAMENT, Y COMPRIS UN MEDICAMENT OBTENU SUR ORDONNANCE, PARLEZ-EN A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.****Grossesse et allaitement****Grossesse :****L'utilisation de la céfuroxime ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.****Allaitement :****L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament. Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruption sur la peau, conjonctivite (affection due à certains champignons microscopiques), il faut immédiatement votre médecin qui vous conseillera sur la conduite de ce traitement.****DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.****Informations importantes concernant certains composants de CEROXIM® 250 et 500 mg, Comprimés:****Liste des excipients à effet notable: Saccharose et Sodium.**

ل NOVARTIS

# ultibro<sup>®</sup> breezhaler<sup>®</sup>

أولتيبرو<sup>®</sup> بريزهالر<sup>®</sup>

Poudre pour inhalation en gélule. Boite  
*Indacaterol maléate / Bromure de glyc*

مسحوق للاستنشاق في كبسولات. علبة من 30 كبسولة  
انداكتيرول ماليات/غليكوبيرونيوم بروميد

110µg / 50 µg  
110 مكغ/50 مكغ

ULTIBRO<sup>®</sup> BREEZHALER<sup>®</sup>

110 µg/50 µg  
Poudre pour inhalation  
en gélule. Boite de 30.  
PPV : 843 DH



ل NOVARTIS

# ultibro<sup>®</sup> breezhaler<sup>®</sup>

أولتيبرو<sup>®</sup> بريزهالر<sup>®</sup>

Poudre pour inhalation en gélule. Boite de  
*Indacaterol maléate / Bromure de glyc*

مسحوق للاستنشاق في كبسولات. علبة من 30 كبسولة  
انداكتيرول ماليات/غليكوبيرونيوم بروميد

110µg / 50 µg  
110 مكغ/50 مكغ

ULTIBRO<sup>®</sup> BREEZHALER<sup>®</sup>

110 µg/50 µg  
Poudre pour inhalation  
en gélule. Boite de 30.  
PPV : 843 DH

