



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

P 17 / 0066899

DATE DE DEPOT

1 / 1201

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle 1369

Nom & Prénom RIMADOU Rahai

Fonction Retraite

Phones 05225.32440

Mail

Signature
L'adhérent

MEDECIN

Prénom du patient Zohra

Adhérent

Conjoint

Enfant

Age

Date 22/01/19

Nature de la maladie

Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des honoraires

cl

1

1200

DRAMEUR MIR et
MEDECIN GENEVE du
200 H tel. 0522 53 21 33
PHARMACIE AL ABAWAII
Tél. 05 22 51 40 40

PHARMACIE

Date 21/01/19

Montant de la facture

M

244.00

Signature et
PHARMACIE AL ABAWAII
200 H tel. Al Walaia Derao
Tél. 05 22 51 40 40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

CACHET

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

CACHET

Dr. Narjiss AMEUR

Ex.médecin interne au C.H.U

Ibnou Rochd - Casa

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca

Médecine Générale

Diplôme en échographie générale
E.C.G

Date: 22/08/18

Nom: RIMOSMI ZOHRA

الدكتورة نرجس عامر

طبيبة داخلية سابقا

بالمراكز الإستشفائية ابن رشد، البيضاء

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

الطب العام

دبلوم في الفحص بالصدى
تخطيط القلب

44,20
 1 1/2 Nopreg
 133,00 1/2 Solax 8 DR MEDECIN GENERAIS
 2 540, LOT EL WAFAA 27 53
 540, MEDECIN GENERALISTE 27 53
 540, LOT EL WAFAA DEROUA
 Tel: 0522 53 27 53 DR MEDECIN GENERAIS
 37,00 Mf 3
 3 1/2 Delate
 30,00 M 3
 4 1/2 Stevral 20
 244,20 Prochain rendez vous: 18/09/18
 الموعد المقبل

540، تجزئة الوفاء الدروة (قرب مسجد الوفاء)

540, Lot. Wafaa - Tél.: 05 22 53 27 53

1. DENOMINATION DU MÉDICAMENT

Veuillez lire attentivement l'indication.

Gardez cette notice, vous pourrez la consulter plus tard.

Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter.

plus d'informations à votre pharmacien.

amais à quelqu'un d'autre, il pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables indésirables devient grave ou si, mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

PER 04/21
PPV 30DH00

30,00



2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

omeprazole (PDI) 20 mg

Excipients : diethyl phthalate, sodium lauryl sulphate, disodium phosphate cristallisé, hydroxypropyl cellulose, lactose, hydroxypropylmethyl cellulose, amidon de maïs, hydroxypropylmethyl cellulose phthalate, saccharose.

Liste des excipients à effet notable :

OMEPRAL PROMOPHARM® 20 mg, gélule contient du lactose et du saccharose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE :

OMEPRAL PROMOPHARM® 20 mg, gélule contient la substance active omeprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS

OMEPRAL PROMOPHARM® 20 mg, gélule est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures;
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique);
- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OMEPRAL PROMOPHARM® 20 mg, gélule peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une perte de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

5. POSSÉDATION

Les habitudes sont données ci-dessous.

Adulte :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien tels que brûlures et régurgitation acide;

- Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose usuelle est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8

jours demander de prendre une dose de supplémentaires si votre œsophage n'a pas

complètement cicatrisé. La dose usuelle est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

Si votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour pendant 2 semaines.

6. CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais ce médicament

• si vous êtes allergique (hypersensibilisé) aux composants contenus dans OMEPRAL PROMOPHARM®.

• si vous êtes allergique à un autre exemple pantoprazole, lansoprazole.

• Si vous prenez un médicament contre la coagulation.

Si vous avez des douleurs, parlez-en avant de prendre OMEPRAL PROMOPHARM®.

7. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments OMEPRAL PROMOPHARM® gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Le monde n'y soit sujet.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre la gélule et contactez immédiatement votre pharmacien.

• Apparition soudaine d'une rougeur de la langue et de la gorge ou du pharynx.

• Rougeur de la peau avec des bulles peuvent être importantes et apparaître sur le visage, les yeux, les lèvres, les genoux, les pieds et les doigts.

• Jaunisse, urines foncées et fatigue.

Ces effets indésirables peuvent se déclencher comme suit :

Très fréquents

Affection

Fréquents

Affection

Peu fréquents

Affection

Rares

Affection

Très rares

Affection

Fréquence indéterminée

Ne peut être donné

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents

• Maux de tête.

• Effets sur l'estomac ou l'intestin.

• Constipation, flatulence.

• Nausées, vomissements.

Effets indésirables peu fréquents

• Gonflement des pieds et des chevilles.

• Troubles du sommeil (insomnie).

• Étourdissements, fourmillements, vertiges.

• Modifications des résultats des tests de fonction rénale.

• Eruptions cutanées, urticaire et déshydratation.

• Malaise général, manque d'énergie.

Effets indésirables rares

• Troubles sanguins tels qu'une diminution de la plaquettes.

Ces effets peuvent entraîner des ecchymoses ou faciliter la survenue d'hémorragies.

• Réactions allergiques, parfois très graves, de la langue et de la gorge.

• Diminution du taux de sodium dans le sang.

• Des vomissements et des diarrées.

• Agitation, confusion ou dépression.

• Troubles du goût.

• Troubles de la vue, tels que vision floue.

• Sécheresse buccale.

• Inflammation de l'intérieur de la bouche.

• Infection appelée « mycose » qui peut être causée par un champignon.

• Troubles hépatiques incluant la jaunisse.

Naprogel®

NAPROXÈNE

COMPOSITION :

Naproxène	10g
Excipients q.s.p	100g

PROPRIETES :

Anti-inflammatoire non stéroïdien doué d'une activité anti-inflammatoire et analgésique marquée.

INDICATIONS :

Traitements locaux de :

- Myalgies, contusions et claquage musculaire.
- Entorses et luxations
- Thromboses superficielles, hématomes, œdèmes, infiltrations traumatiques, phlébites et varices inflammées.
- Fibromyosites, bursites, tendinites, ténosynovites et périarthrites.
- Préparation ou instauration concomitante de traitement orthopédique et réhabilitant.

POSOLOGIE :

Le gel doit être appliqué, sur la partie à traiter, 1 à 2 fois par jour, en massant légèrement jusqu'à absorption.

CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité individuelle avérée au

LOT: 022919 PER: 03/24
PPV: 37H00

MISES EN GARDE :

La part de principe actif (Naproxène) ab
pas la circulation en règle générale.
Chez la femme
nécessité.

EFFETS SECONDAIRES

L'utilisation peut entraîner des
phénomènes d'absorption et prendre les

peut entraîner des
arrêter le traitement

44,20

48x30x160

PRESENTATION:
Naprogel® gel

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement

Ce médicament est contre-indiqué en cas d'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT !

POSOLOGIE :

RESERVE A L'ADULTE (plus de 15 ans).

La dose quotidienne est de 1 à 2 comprimés par prise, 3 fois par jour, à 4 heures d'intervalle au minimum. Ne pas dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Insuffisant rénal : en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min), l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures.

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

Avaler les comprimés avec un verre d'eau.

FREQUENCE ET DUREE DU TRAITEMENT :

Se conformer strictement à la prescription de votre médecin.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

DANS TOUTS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Liés au paracétamol :

- Hépatotoxicité à très forte dose ou après traitement prolongé.
- Quelques rares cas d'accidents allergiques (simples rashes cutanés avec érythème ou urticaire) qui nécessitent l'arrêt du traitement.
- Exceptionnellement, thrombopénie.

Liés au thiocolchicoside :

- Possibilité de manifestations allergiques cutanées.
- Rares troubles digestifs : diarrhée, douleurs de l'estomac.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :

À conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne pas laisser à la ~~temperatur dans medicina~~.

Ne pas utiliser aprè

Liste I

AMM N° : 285/12C

NOM ET ADRESSE :

RTM pharma
Radio isotope
Zone industrielle Br...
Pharmacien Responsable

DULASTAN®

500mg/2mg

Boîte de 20 comprimés



MAROC :



Fabriqué par :

POLYMÉDIC

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane
Casablanca – MAROC



أروكسيبا[®] 30 ملنج، أقراص مُعْنَفَةٌ
أروكسيبا[®] 60 ملنج، أقراص مُعْنَفَةٌ
أروكسيبا[®] 90 ملنج، أقراص مُعْنَفَةٌ
أروكسيبا[®] 120 ملنج، أقراص مُعْنَفَةٌ

أينوروكسيبا[®]

- يرجى قراءة هذه النشرة بكلها بعناية قبل البدء في استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.
- اهتم بطلب بهذه النشرة لاتتك قد تحتاج إلى الإطلاع عليها لاحقاً.
- إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى، يرجى مرارجحها مع طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء موصوف لك شخصيا ولا يجوز لك أن تعميله لغيرك لأنك قد تلحظ بهم ضررا حتى ولو كانت علامات المرض مصادقة لأعراضك.
- إذا راجعته أي أثر جانبى ، فالرجاء إخبار طبيبك أو الصيدلي أو العرضة. هذا يتطلب أيضا على أي أثر جانبى غير متدرج في هذه النشرة.

رائع القسم 4

في هذه النشرة:

1. ما هو أروكسيبا وما هي دواعي استعماله
2. ما يجب أن تعرف قبل البدء في تناول أروكسيبا
3. كيف تتخلص من أروكسيبا
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة
5. كيف يحافظ أروكسيبا
6. مستوى العبور و معلومات أخرى