

Conditions Générales

POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes :

- = Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien
- = Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)
- SY = Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre
- = Visite de jour au domicile du malade par le médecin
- = Visite de nuit au domicile du malade par le médecin
- = Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade
- = Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié
- = Acte de pratique médicale courant et de petite chirurgie
- = Actes de chirurgie et de spécialistes

- SF = Actes pratiqués par la sage femme et relevant de sa compétence
- SFI = Soins infirmiers pratiqués par la sage femme
- AMM = Actes pratiqués par le masseur ou le kinésithérapeute
- AMI = Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière
- AP = Actes pratiqués par un orthophoniste
- AMY = Actes pratiqués par un aide-orthophoniste
- R-Z = Electro-Radiologie
- B = Analyses

POUR L'ADHERENT

La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que si après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.

Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes d'adresser au service de la mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.

Ce bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord au présentation de ses observations.

Le bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous pli confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

LES ACTES SOUMIS A ACCORD PRÉALABLE

HOSPITALISATION EN CLINIQUE

HOSPITALISATION EN HÔPITAL

HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU REVENTORIUM

SEJOUR EN MAISON DE REPOS

LES ACTES EFFECTUÉS EN SÉRIE, il s'agit d'actes répétés en plusieurs séances ou actes obeaux comportant un ou plusieurs échelons dans le temps.

- LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES

- L'ORTHOPÉDIE

- LA REEDUCATION

- LES ACCOUCHEMENTS

- LES CURES THERMALES

- LA CIRCONCISION

- LE TRANSPORT EN AMBULANCE

EN CAS D'URGENCE

Les actes d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit évenir dans les 24 heures le Service Mutuelle qui donnera ou non son accord

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade

DATE DE DÉPÔT

AÉROPORT CASA ANFA

CASABLANCA

TEL : 05 22 91 26 46 / 2648 / 2857 / 2883

FAX / 05 22 91 26 52

TELEX : 3998 MUT

E-mail : mupras@RoyalAirMaroc



M U P R A S

Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

FEUILLE DE SOINS

N° 853215

MUPRAS
RECEPTION

A REMPLIR PAR L'ADHÉRENT

Nom & Prénom : M KHANTAR - FATNA
Matricule : 1678 Fonction : Retraitee Poste :
Adresse : HAY EL HANA Rue 30 N° 11 Casablanca
Tél. : 0661 60 97 21 Signature Adhérent : G. J. W.

A REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient : M KHANTAR - FATNA Age :
Lien de parenté avec l'adhérent : Adhérent Conjoint Enfant

Date de la première visite du médecin : 01/06/14

Nature de la maladie : Incontinence urinaire

S'il s'agit d'un accident : causes et circonstances : JUL 1014

A : , le 14-06-14

Durée d'utilisation 3 mois

Docteur Omara BENNOUNA
Médecin traitant du médecin
Rue 65 N° 53 2^{me} Etage Passage Prince
Ettaâouine R. Hassan - Casablanca
Tél. 0522 90 98 07

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et Signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04 06 105	C	-	150,00	Docteur Omar BENNOUAF Médecin Générale Rue 65 N°53, 2 ^{me} Passage Prince Ettâouine H. Hassan II - Casablanca Tél.: 0522 90 98 07

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL JAQUI Dr. Jaqui J. Aouchra P. Je 22/06 Hay El Hana Tél: 0522 39 91 24	04.06.19	1344,60

ANALYSES – RADIOGRAPHIES

Cachet et Signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et Signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFICIENT DES TRAVAUX
		</td		

Docteur Omar BENNOUNA

Médecine Générale
Echographiste

Diplômé d'Echographie Générale
de la Faculté de Médecine de Montpellier, France

Ex. Médecin des F.A.R
Attestation de D/U

الدكتور عمر بنونة

الطب العام

دبلوم في الفحص بالصدى

من كلية الطب بموبليي بفرنسا

طبيب سابق في القواة المسلحة الملكية

شهادة في وضع اللولب - العملية الصغيرة

Casablanca, le

4/6/19

Fatma

MKNANTAR

226,00 × 2
E S A e 40



1 cpl la matra

J

55,00 Amox-2 1g



1 cpl x 2 x 6

186,20 Creditor



1 cpl à mida

346,100 Xarolka



1 cpl le son

265,00 Del rey de l



1344,20 1 cpl

زنقة 65، رقم 53، الطابق الثاني، مجمع براتس. التعاون. الحي الحسني. الدار البيضاء. هاتف العيادة : 05 22 90 98 07

Rue 65 - N° 53, 2^{ème} Etage - Passage Prince - Ettaâouine - Hay Hassani - Casablanca - Tel. Cabinet : 05 22 90 98 07

En cas d'Urgences : 06 64 04 38 25

Docteur Omar BENNOUNA
Médecine Générale
Passage Prince

في حالة الطوارئ : 05 22 90 98 07



Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre le médicament. Ce médicament vous a été remis sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.



Detrusitol® SR

Qu'est-ce que Detrusitol SR et quand est-il utilisé ?

Detrusitol SR est un médicament destiné au traitement de l'hyperactivité vésicale, une affection se manifestant par un besoin soudain et incontrôlable d'uriner, perte d'urine involontaire.

Detrusitol SR relâche le muscle hyperactif de la vessie. Il a pour effet d'augmenter le volume vésical, de retarder le premier besoin urgent d'uriner et d'atténuer la fréquence de l'évacuation volontaire et involontaire de la vessie.

Le traitement déploie son action généralement en l'espace de 4 semaines. Detrusitol SR ne doit être pris que sur prescription médicale.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin pour traiter la vessie hyperactive. L'emploi d'un médicament mal choisi ou incorrectement dosé peut provoquer des complications. Pour cette raison, vous ne devez pas l'utiliser de votre propre chef pour soigner d'autres maladies ou le donner à une autre personne.

Quand Detrusitol SR ne doit-il pas être utilisé ?

Vous devez renoncer à prendre Detrusitol SR si vous présentez une hypersensibilité (allergie) à l'un des composants de Detrusitol SR, une rétention urinaire, une affection intestinale inflammatoire sévère (colite ulcéreuse), une faiblesse musculaire d'origine immunologique (myasthénie grave) ou une élévation de la pression intra-oculaire non traitée (glaucome à angle étroit).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Detrusitol SR ?

Avant d'instaurer un traitement par Detrusitol SR, les causes organiques au besoin urgent d'uriner et aux fréquentes émissions d'urine doivent être exclues.

Veuillez signaler à votre médecin si vous souffrez d'une ou de plusieurs des affections suivantes :

- Hernie diaphragmatique (hernie hiatale);
- Affections de la prostate, ainsi que d'autres maladies des voies urinaires basses gênant l'écoulement de l'urine;
- Transit gastro-intestinal entravé par exemple à la suite d'un rétrécissement du pylore gênant le passage du bol alimentaire de l'estomac dans l'intestin grêle;
- Risque d'altération ou d'entrave des fonctions digestives;
- Maladies rénales;
- Maladies hépatiques;
- Maladies des nerfs (neuropathies).

Des expériences cliniques sur les enfants n'étant pas disponibles, la préparation ne doit pas être utilisée chez ce groupe de patients.

Les médicaments suivants peuvent augmenter ou réduire l'efficacité de Detrusitol SR; médicaments contre la dépression, médicaments contre la maladie de Parkinson, certains médicaments contre les nausées et les troubles de la vidange gastrique, ainsi que certains antibiotiques (médicaments contre les infections) et médicaments contre les mycoses (maladies causées par les champignons). Etant donné que ce médicament peut troubler la vision de près et influencer le temps de réaction, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines peuvent être compromises !

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique, ou si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication) !

Detrusitol SR peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Si vous êtes enceinte ou désirez le devenir ou si vous allaitez, vous ne devez pas prendre Detrusitol SR. Si vous prenez Detrusitol SR et que vous êtes en âge de procréer, vous devez prendre des mesures de contraception fiables.

Comment utiliser Detrusitol SR ?

Sauf prescription médicale contraire, et si vous ne souffrez d'aucune maladie hépatique ou rénale, prenez une gélule à 4 mg une fois par jour. Vous pouvez prendre la gélule au cours ou indépendamment des repas. Dans tous les cas, la gélule doit être avalée entière, sans être fractionnée.

Veuillez vous conformer au dosage prescrit par votre médecin car il a fixé le mode d'emploi et la dose en fonction de votre cas personnel.

Notice : Information de l'utilisateur



Xareito® 10 mg

comprimé pelliculé
rivaroxaban

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Xareito et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Xareito
3. Comment prendre Xareito
4. Effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Xareito
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Xareito et dans quel cas est-il utilisé ?

Xareito contient une substance active appelée rivaroxaban et est utilisé chez l'adulte pour prévenir la formation de caillots sanguins dans les veines suite à une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou. Votre médecin vous a prescrit ce médicament parce que, suite à une opération, le risque de formation de caillots sanguins est plus élevé.

Xareito appartient à une classe de médicaments appelés antithrombotiques. Il agit en bloquant un facteur de la coagulation sanguine (le facteur Xa), réduisant ainsi la tendance du sang à former des caillots.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Xareito ?

Ne prenez jamais Xareito

- si vous êtes allergique au rivaroxaban ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous êtes sujet à des saignements excessifs
- si vous avez une maladie ou une prédisposition au niveau d'un organe qui augmente les risques de saignements importants (par exemple un ulcère de l'estomac, une

- certains antiviraux contre le VIH/SIDA (le ritonavir)
- d'autres médicaments utilisés pour fluidifier le sang (les anti-vitamine K tels que la warfarine et l'acénocumarol)
- des anti-inflammatoires et des anti-douleurs (l'aspirine, par ex.) ;
- de la dronedarone, un médicament utilisé pour traiter l'arrhythmie cardiaque.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, prendre Xareito car l'effet de Xareito pourrait être diminué. Si vous deviez être traité(e) par Xareito et si une surveillance de l'efficacité est nécessaire, si votre médecin pense que vous présentez un risque de saignement important dans l'estomac ou de l'intestin, il peut également vous prescrire un autre médicament pour empêcher les ulcères.

Si vous prenez :

- certains médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie (la phénobarbital)
- du millepertuis (*Hypericum perforatum*), un produit contre la dépression
- de la rifampicine, un antibiotique

Si vous êtes dans l'une de ces situations, p

rendre Xareito car l'effet de Xareito pourrait être diminué. Si vous deviez être traité(e) par Xareito et si une surveillance de l'efficacité est nécessaire,

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas de Xareito si vous êtes enceinte ou si vous suspectez d'être enceinte. Si vous êtes enceinte pendant que vous prenez ce médicament, contactez votre médecin qui décidera de la conduite à tenir.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Xareito peut être à l'origine de sensations vertigineuses ou d'évanouissements (effet indésirable peu fréquent mais indésirables éventuels). Ne conduisez pas ou ne montez pas à bord d'un véhicule si vous êtes sujet à ces symptômes.

Xareito contient du lactose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au lactose, ne prenez pas de Xareito avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Xareito ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre médecin. **Xareito 10 mg / 10 cps**

Quel Rivaroxaban

La dose est de **P.P.V. : 376,00 DH**
Avaler ou avaler des comprimés de Bayer S.A.



6 118 001 09 0648

Si nécessaire, votre médecin pourra aussi vous donner une solution pour dissoudre le comprimé et utiliser une sonde gastrique.

À quel moment prendre Xareito

Prenez le premier comprimé 6 à 10 heures après

**CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé
CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé
CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé**

Rosuvastatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - code ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.
- Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de CRESTOR.

Ou

- Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Pourquoi il est important de continuer de prendre CRESTOR :

CRESTOR est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

Il y a différents types de cholestérol trouvé dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

- CRESTOR peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

- Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre CRESTOR, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Devez arrêter votre traitement si votre médecin ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS AVANT DE PRENDRE CRESTOR, c

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais CRESTOR :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la ciclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
Q1 Zenata Ain seba Casablanca
Crestor 5mg cp pellic 30
P.P.V : 196,20 DH



أثر قليل الشيوخ (فيما يخص شخصاً واحداً من أصل 100 شخص)

* بروبرت في.

أثر قليل (فيما يخص شخصاً واحداً من أصل 10,000 شخص)

الهياكل طفولة (أمراض النساء التي تتطور في المهد أو القمر أو طبلة الجلد)، يمكن ملطف العلاج من الامثليات الطفولية من الطبيب أو المعنين

مشكلة كوكية

تشنجات خاصة لدى المرضى الذين يتلقون جرعة عالية أو الذين يعانون من مشكلات في الكلى

في الدوار

فرط الشغاف

تكلف العلاج في البول يعنيها اضطرابات أو آلام عند البول، تناول من شرب الكثير من المسوالت العدد من هذه المخاطر

ظهور بقع على سومنو الأسنان تجاهة نتيجة عدم تقطيف الأسنان بالغسالة (يظهر هذا لدى الأطفال)

تصبح ألوان أسنان الصغار أو بيضاء أو سوداء ويمكن أن يظهر وكأنه مغطى بالشعر

تدوره مفترط تحالن الحمراء مما يتسبب في قفر الدم، وتشمل العلامات: العصبية، والصداع، وضيق في النفق، والدوخة، وشحوب، وأصوات الرجل وبعض العينين

انخفاض عدد كريات الدم البيضاء

تأخر في نشر الدم يمكن أن تلاحظ ذلك عند الإصابة بنيزف أو جرح

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إن نشرت بأثر غير متسبباً، المارجو إيجار الطبيب أو الصيدلي، ينطبق ذلك كذلك على أي آخر غير متسبباً لو برد ذكره بهذه التشرية.

5. كيف يجب تخزين أموكسيل؟

يرجى إعاده الدواء إلى الصيدلي وبيان الأطباء.

لتاريخ انتهاء الصلاحية الذي أتى بهم في جرس

25%.

لا تستخدم الدواء في حال ظهور علامات تلف مزمنة

بمنطقة التعرض من أي أداة في هذه المعرفة المرضية أو التفاعلات المترتبة.

6. محتوى العقار الخارجية ومعلومات أخرى

تركيبة أموكسيل **أغ 1** 500 ملء قرص قابل للذوبان

المادة الحيوية: الأموكسيلين بودري كل قرص على 1 غ و 500 ملء من الأموكسيلين.

المكونات الأخرى: رائحة الليمون والخوخ، القراءة، كارمازول الصوديوم، (E211)، حمّى العصاء، شفارات

أموكسيل **أغ 125** ملء 250 ملء 500 ملء، مسحوق من أجل محلول فموي

المادة الحيوية: الأموكسيلين بودري كل مزيج على 125 ملء و 250 ملء و 500 ملء من

الأموكسيلين.

المكونات الأخرى: رائحة الليمون والخوخ، القراءة، كارمازول الصوديوم، 12.

كورسيفون: (الأسبراتام) (E951)، بذور الصوديوم (E211)، حمّى العصاء، شفارات

المترتبة.

GlaxoSmithKline Maroc

عن العودة، جهة الراط.

معلومات طبية: GlaxoSmithKline Maroc:

20000 زاوية شارع الرشيدى وزقة أبو حامد الغزالى الدار البيضاء

الرجو الاتصال بالطبيب المعالج في أقرب وقت ممكن. أخذ الدواء لترة طبيعية، في حال سقوط تناول الموصى:

في حال سقوط جرعة ما، تناول جرعة ملائمة.

• تناول الجرعة الثانية في وقت قريب جداً، إنظر جرعة 4 ساعت قبل تناول

الجرعة المائية.

• لا تتناول جرعة ملائمة بعد تناول الموصى:

في حال تناول جرعة ملائمة.

لا يوجد أي موضع

إن كان لديك أي استثناء أخرى حول استخدام هذا الدواء، المرجو الاستشارة مع الطبيب أو

الصيدلي قبل الحصول على المزيد من المعلومات.

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

بالضرورة أنها تعيق حمّى العصبة، لكن هذا لا يعني

توقف عن تناول الموصى واستئصال الطبيب فإذا واجهت أي من الآثار الجانبية

الشديدة الممكورة أدناه، لا تناوله قد تحتاج إلى علاج طبي عاجل.

الآثار الجانبية التالية تذكرة جداً (يمكن أن تتحقق لدى مريض واحد من أصل 10000

مرضى):

• ردود فعل جانبية يمكن أن تشمل الحكة أو المفعول الجدي، والتورم في الوجه والثديين

في بعض الأحيان.

طفح جلدي أو بقع حمراء على شكل رأس بيوض تحت الجلد، ويكتمل.

التهاب حاد للأوعية الدموية بسبب حمّى العصبة، يمكن أن يرافق هذه الأعراض

الآلام المفاصل، التهاب المفاصل، ومشاكل في الكلى.

يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي متغير عادة خلال 7 إلى 12 يوم بعد تناول أموكسيل.

وتتمثل هذه الحالات الملحظ الجدي، والحمى، والألم المفاصل، وتتضمن تضخم الجلد المبابدة.

خاصية في الإنفلونزا.

رد فعل تحسسي على مكوني الجلد المعروف باسم حمّى العصبة، والذي يتكون

خلال الآعراض المماثلة بالكبد، هذه الآعراض تظهر بشكل رئيسى لدى المرضى

متى العصبة، ويتكون على طبق ملحوظ بمحض الذهاب.

يمكن أن تظهر رد فعل أخرى أكثر خطورة مثل تناول دون الجلد، ودورم العصب الشديد،

وظهور بثور، وقرحة، وطفح جلدي، والاحمرار، والألم، والتشنج، ويمكن أن يرافق هذه

الآعراض نفس المرض والصداع والآلام في الجسم.

حمى، تعرق، التهاب الحلق أو غيره من علامات العدوى، ويكتمل

هذه الآثار الجانبية غالباً على مدار 72 ساعة.

• تناول باريسوكسيميكين الذي يمكن أن يرافق آثاره الجلدية على العصبات وطفح جلدي

وتقشر العصعص، وسعاد الأعصاب، وطفح جلدي، والآلام

والحمى.

قد تظهر آثار جانبية خطيرة بالكبد، هذه الآعراض تظهر بشكل رئيسى لدى المرضى

الذين يعانون من حالات لفترة طويلة، ولذلك لا ينصح بهم من كبار السن، يجب علىك

استشارة الطبيب، فوراً في الحالات التالية:

• 5 الأهمال الشديدة والجديدة، ووجوده،

• ظهرت بثور، وأحمرار، أو كدمات على الجلد،

• 5 بول ألكي أو شفاف،

• اضطراب المعدة والبيلي (أرقان)، انظر أيضاً المعلومات الواردة أدناه حول فقر الدم الذي

قد يودي إلى الإصابة بالرثي.

قد تحدث آثار جانبية عند تناول الدواء أو خلال عدة أسابيع بعد التوقف عن تناول

إذا ظهرت آثاره أي من التفاعلات الممكنة أعلاه، توقف عن تناول هذا الدواء واستشير

الطبيب فوراً.

يمكن أن تكون رد فعل على مكوني الجلد أقل حدة أحياناً.

طفح جلدي (يُدعى بالرثي وردية أو حرارة) مصحوبة بحكة معتدلة، تزداد مرتاحرة

وتفتح على الصاعدون والساقيين والذراري والأخدودين، هذه الآعراض قليلة الشدة

(يمكن أن تظهر لدى شخص واحد في كل 100 شخص).

إذا ظهرت آثاره أي من هذه الآعراض، استشير طبيبك لأنك بحاجة إلى التوقف عن تناول

أموكسيل.

أثر آخر جانبية ممكنة الخطورة:

• آخر شفقة (فيما يخص شخصاً واحداً من أصل 10 أشخاص)

طفح جلدي.

• غثيان.

• إسهال.

الرجو الاتصال بالطبيب المعالج في أقرب وقت ممكن. أخذ الدواء لترة طبيعية،

في حال سقوط تناول الموصى:

في حال تناول جرعة ما، تناول جرعة ملائمة.

• لا تتناول جرعة ملائمة بعد تناول الموصى:

في حال تناول جرعة ملائمة.

لا يوجد أي موضع

إن كان لديك أي استثناء أخرى حول استخدام هذا الدواء، المرجو الاستشارة مع الطبيب أو

الصيدلي قبل الحصول على المزيد من المعلومات.

Amoxil

500mg et 1 g comprimés dispersibles, boîte de 12 et 24,

125 mg, 250mg et 500mg, poudre pour suspension buvable,

flacon de 60 ml.

Amoxicilline

Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car

elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la refire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été prescrit à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AMOXIL et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMOXIL ?

3. Comment prendre AMOXIL ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver AMOXIL ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés "pénicillines".

Dans quelles cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMOXIL ?

Ne prenez jamais AMOXIL :

• Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

• Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.

Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL si vous:

• souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)

• avez des problèmes rénaux

• N'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

• Des analyses d'urine (dosage de glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie.

• Un dosage d'estriol (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AMOXIL. En effet, AMOXIL peut influer sur les résultats de ces tests.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et AMOXIL :

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

• Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AMOXIL, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

• Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'adapter votre dose d'AMOXIL.

• Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), vous pourriez avoir besoin d'effectuer des analyses

sanguines supplémentaires.

- Si vous prenez d'autres antibiotiques (tels que les tétracyclines) AMOXIL peut être moins efficace.
- Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement de cancer et du psoriasis sévère) AMOXIL peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

AMOXIL avec des aliments et boissons :

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

AMOXIL peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à molles que vous vous sentez bien.

AMOXIL comprimé dispersible content de l'aspartam

L'aspartam (E91) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée "phénylétionurie".

AMOXIL pou dre pour suspension buvable contient :

- L'aspartam (E91) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée "phénylétionurie".

- Le méthotrexate est absorbé sous forme de glucose. Si votre médecin vous a informé que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

- En raison de la présence de benzoate de sodium (E211), ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses et peut accroître le risque de jaunissement chez le nouveau-né.

3. COMMENT PRENDRE AMOXIL ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

• Faire disposer complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avaler immédiatement le mélange ;

• Agiter bien le flacon avant chaque utilisation et utiliser la cuillère fournie avec le flacon ;

• Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

RÉSPECTER LES DOSES PRÉSÉNTÉES

Posologie habituelle :

Enfants pesant moins de :

Toutes les posologies sont en kilogrammes.

• Votre médecin vous indiquera

à votre bébé ou votre enfant

• La posologie habituelle est

et par jour à administrer en

• La dose maximale recommandée corporel et par jour.

Adultes, patients âgés et enfant

La forme suspension n'est pas. La posologie habituelle d'AMOXIL 750 mg à 1 g toutes les 12h. sel.

• Infections sévères : 750 mg à

• Infection des voies urinaires

• Maladie de Lyme (infection à

• Erythème migratoire isolé (phase p

4 g par jour, manifestations systématiques plus graves ou quand la maladie

• Ulcère de l'estomac : 750 mg

d'autres antibiotiques et médicaments

• Pour prévenir les infections varie selon le type de chirurgie administrées simultanément. Vo

vous donner plus de détails.

PPV : 55,00 DH

LOT : 567041

PER : 08/18

AMOXIL 10

12 comprimés dispersibles



6 118000 160038

N20819-1

ESAC® 40 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

Composition

Esméprazole 40,00 mg

Sous forme d'omeprazole magnésium trihydrate.

Excipients dont et saccharose : q.s.p 1 gélule gastrorésistante

Qu'est-ce qu'ESAC 40 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament se présente sous forme de gélules contenant des microgranules gastro-résistants.

ESAC est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

ESAC est utilisé dans :

- Reflux gastro-oesophagien : traitement de l'œsophagite érosive par reflux.

- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 40 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

Ne pas utiliser ESAC 40 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC.

- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,

- si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement de VIH).

Prendre des précautions particulières avec ESAC 40 mg dans les cas suivants :

- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétocozaole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour des troubles de la coagulation sanguine), ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique).

- si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.

- si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.

- si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de Helicobacter pylori avec ESAC ou si vous prenez ESAC dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.

En cas de traitement à la demande, vous devez informer votre médecin de toutes modifications des symptômes.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, ou si vous allaitez, dites-le à votre médecin avant de prendre ESAC.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament notamment l'itraconazole ou le kétocozaole, le diazépam, la phénytoïne, la warfarine, l'atazanavir, la clarithromycine ou le cisapride, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Comment prendre ESAC 40 mg ?

Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et quand vous devez les prendre.

Le dosage des gélules que vous prenez et la durée du traitement dépendront de l'importance des symptômes dont vous souffrez.

Vous pouvez prendre vos gélules au cours d'un repas ou à jeun. Les gélules ne doivent pas être mâchées ni croquées.

Eilles doivent être avalées entières avec un demi-verre d'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler, le contenu des gélules peut être mis dans un demi-verre d'eau non gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

Vous pouvez alors boire la solution contenant des petits granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours avant de boire.

Rincez ensuite le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et le boire. Tous les granules doivent être avalés sans être mâchés ni croqués.

Pour les patients ne pouvant pas avaler, le contenu des gélules peut être dispersés dans de l'eau non gazeuse et administrés par sonde gastrique.

La posologie habituelle est :

Adultes et enfants à partir de 12 ans :

- Traitement de l'œsophagite :

40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Chez certains patients, un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

- Prévention des rechutes des œsophagites :

20 mg une fois par jour.

- Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides) :

20 mg une fois par jour.

Si vos symptômes persistent après 4 semaines, consultez votre médecin.

Par la suite, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule de 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins.

Le traitement à la demande, en fonction des besoins, n'est pas recommandé chez les patients traités par un AINS, susceptibles de développer un ulcère

gastro-duodénal.

Adultes :

- Traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori :

La dose initiale est de 20 mg associé à deux antibiotiques (amoxicilline 1 G et clarithromycine 500 Mg) deux fois par jour pendant 7 jours.

- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 à 8 semaines.

- Prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

20 mg une fois par jour.

ESAC ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.
Suivez strictement les instructions de votre médecin, il n'hésitera pas à lui demander conseil.

Si vous avez pris plus d'ESAC 40 mg que vous deviez prendre :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez oublié de prendre ESAC 40 mg :

Prenez-le dès que possible.

Cependant, si vous avez déjà pris à prendre la dose suivante, vous avez dû prendre la dose suivante.

Quels sont les effets secondaires possibles ?

Comme tous les médicaments, ces effets peuvent occasionner des effets indésirables.

Effets indésirables courants :

(chez 1 à 10 % des patients)

Maux de tête, flatulence.

Effets indésirables très courants :

(chez moins de 1 % des patients)

Sensation d'engorgement dans une région particulière du foie, nausées.

Effets indésirables rares :

(chez moins de 0,1 % des patients)

Confusion mentale,

particularité particulière (gonflement des glandes salivaires, inflammation des yeux, champignon), diarrhée, globules blancs, plaquettes), exceptionnellement, hépatite sévère pré-existante, hépatite avec ou sans ictere (jaunisse), insuffisance hépatique, douleurs articulaires ou musculaires, fatigue musculaire, photosensibilisation, réactions cutanées graves (réactions bulleuses), alopecie (chute de cheveux), réactions allergiques telles que gonflement du visage, des lèvres, du larynx et/ou de la langue, bronchospasme, choc anaphylactique, fièvre, néphrite interstitielle (atteinte rénale), augmentation de la sueur, vision trouble, perturbation du goût et diminution du taux de sodium dans le sang.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions d'utilisation pour l'administration par sonde gastrique.

Il est très important que l'administration par sonde gastrique soit réalisée par un personnel entraîné et ayant la connaissance nécessaire pour s'assurer que le matériel choisi (sonde et seringue) est approprié à ce mode d'administration.

Seule de l'eau non gazeuse doit être utilisée.

Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

Rincer la sonde avec de l'eau avant administration.

1. Placer le contenu de la gélule dans une seringue adaptée et remplir la seringue avec environ 25 ml d'eau et environ 5 ml d'air.

Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau est nécessaire pour disperser les microgranules afin de prévenir l'obstruction de la sonde.

2. Remettre immédiatement la seringue pendant environ 2 minutes pour disperser les microgranules.

3. Maintenir la seringue embout en l'air et vérifier que l'embout n'est pas obstrué par la dispersion.

4. Raccorder la sonde sur la seringue en maintenant la position décrite ci-dessus.

5. Agiter la seringue, puis la positionner embout vers le bas. Injecter immédiatement 5-10 ml dans la sonde.

Puis, repositionner la seringue embout vers le haut et l'agiter (la seringue doit être maintenue position embout vers le haut afin d'émpêcher l'obstruction de l'embout).

6. Retourner la seringue embout vers le bas et injecter immédiatement à nouveau 5-10 ml dans la sonde. Répéter cette opération jusqu'à ce que la seringue soit vide.

7. Remplir de nouveau la seringue avec 25 ml d'eau et 5 ml d'air et répéter l'étape 5, si nécessaire, afin de ne laisser aucun résidu dans la seringue. Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau est nécessaire.

Formes et présentations :

Boîte de 7 gélules, boîte de 14 et boîte de 28 gélules

Liste II (Tableau C)

Comment conserver ESAC 40 mg ?

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.



6 118000 241928

226,00