

..... / 201...

REmplir par l'ADHERENT

Mme

14823

Signature de
l'adhérent

Signature de
l'adhérent

& Prénom HASSAN BEN SAAD

ion : R Phones: 06 60 60 79 72

Rachid E-C-01/01/2018

15/07/2018

EDECIN

Prénom du patient HASSAN AI OUA

érent Conjoint Enfant Age 1951

Date 23 JUIL. 2019

de la maladie

Date 1ère visite

affluvirot a stour

it-il d'un accident : Causes et circonstances

| | | |
|---------------|---------------------|---------------------------------|
| ure des actes | Nbre de Coefficient | Montant détaillé des honoraires |
| 2 | 2 | 175 |
| | | 250 |
| | | DNA |

Dr. ACHOUR Ahd
Spécialiste en Endocrinologie Diabetologie
Rue Boukraa - Casablanca
Tel. : 0522 26 53 42 - Tél./Fax : 0522 26 53 42
INP : 091002329

| | |
|-------------------|---------------|
| ARMAGIE | Date 23/07/18 |
| ant de la facture | |

PHARMACIE
CHABIB EL MOKHTAR
15, Bd EL Mousaouy
Casablanca
Tél. 0522 26 53 42
Fax 0522 26 53 42
INP 091002329

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ALYSES - RADIOGRAPHIES | Date : |
| ésignation des Coefficients | Montant détaillé des Honoraires |
| | 163,90 |

CACHET

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| KILAIRES MEDICAUX | | | |
| Date : | | | |

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

| | | | |
|---|----|----|----|
| M | PC | IM | IV |
|---|----|----|----|

CACHET

25 JUIL 2019

ACCUEIL



Casa Le : 23 JUIL. 2019 : البيضاء في :

H. Haddi Ache

1) L'evolution de

13.40 sommeil et

Dr. ACHOUR Ahd
Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie
175, Rue Boukraâ - Casablanca
Tél. : 0522 26 53 41
Fax : 051002329
INP : 0522 26 53 41

Dr. AHD ACHOUR
Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie
175, Rue Boukraâ - Casablanca
Tél. : 0522 26 53 41
Fax : 051002329
INP : 0522 26 53 41

13.40
Sommeil et
arret de la diabète

11900

arret de la diabète

et
reprendre la diabète

31. 3) Akenida

local

163,50

Dr. ACHOUR Ahd
Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie
175, Rue Boukraâ - Casablanca
Tél. : 0522 26 53 41
Fax : 051002329
INP : 0522 26 53 41

Rendez-vous le:

MANIÉZ 24

BI-FORMULE



| | Formule jour (capsule blanche) | Formule nuit (capsule jaune) |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Magnésium marin | 150 mg | 150 mg |
| Vitamine B1 | 0.55 mg | 0.55 mg |
| Vitamine B2 | 0.7 mg | 0.7 mg |
| Vitamine B6 | 0.7 mg | 0.7 mg |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 1.25 µg |
| Extrait de mélisse | | 60 mg |

PRIÉTÉS :

Formule :

Grâce à sa biformule, Maniéz 24 aide à la fois à lutter contre les états de fatigue et à dormir.

Formule jour : Lutte contre la fatigue passagère.

Le magnésium aide à combattre et à surmonter les épisodes de fatigue passagère.

Les vitamines B1, B2, B6 et B12 complètent son action en jouant un rôle clé dans le métabolisme de l'énergie, des équilibres neurologiques et neuromusculaires.

Formule nuit : Favorise l'endormissement.

Elle tient en plus du magnésium et des vitamines du groupe B, l'extrait de mélisse. Botanic Pharma a rigoureusement sélectionné l'extrait végétal de mélisse présent dans la formule nuit de Maniéz 24.

Le mode de production de cet extrait a été minutieusement étudié afin de garantir la composition en molécules actives.

De nombreux composants dans l'extrait de mélisse sélectionné ont montré des propriétés apaisantes. Des tests in-vitro ont montré que l'acide rosmarinique (acide 3,4-dihydroxy-5,6-dihydro-2-méthoxy-2H-cinamique) à travers l'inhibition d'une enzyme, augmente la quantité de GABA dans le Système Nerveux Central qui est lié aux changements positifs de l'humeur.

D'autres composés tels que l'acide ursolique et l'acide oléanolique ont un effet apaisant et calmant.

La formule nuit de Maniéz 24, facilitant la détente, aide à l'endormissement et contribue à un sommeil réparateur.

BOTANIC PHARMA



QUAND UTILISER ?

- Apport nutritionnel inadéquat en magnésium ou en vitamines du groupe B
- Effort physique ou intellectuelle intense.
- Petits stress quotidiens.
- Précordialgic
- Croissance chez l'adolescent

Maniéz 24 est particulièrement conseillé pour les hypertendus.

DOSE RECOMMANDÉE :

1 capsule blanche le matin et 1 capsule jaune au coucher. L'apport recommandé ne doit pas être dépassé.

Durée recommandée de la supplémentation : 20 jours. A renouveler après 10 jours.

MODE D'EMPLOI

1 capsule à avaler avec un grand verre d'eau.

Remarques : Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur (au dessus de 25°C). Tenir hors de portée des enfants.

11080-02

BOTANIC
PHARMA

أكnedكس

سعال حاد شراب

التركيبة

كل 100 مل من الشراب

البالغين: ديكستروميتورفان هيدروبروميد

السواغات: بنزوات الصوديوم، مياه تقية، نكهة المشمش، حمض الستريك مونوهيدرات، محلول السكرورن

الأطفال: ديكستروميتورفان هيدروبروميد.

السواغات: بنزوات الصوديوم، مياه تقية، نكهة الموز، حمض الستريك مونوهيدرات، محلول السكرورن

الشكل الصيدلاني

البالغين: قنينة من فئة 200 مل.

الأطفال: قنينة من فئة 125 مل.

النوع الصيدلاني والعلجي

مضاد للسعال

(R): الجهاز التنفسي

الاستعمالات العلاجية

علاج السعال الحاد وتهيج السعال على المدى القصير.

مواقع الاستعمال

لا يستعمل هذا الدواء في الحالات التالية:

- حساسية لأي من مكونات هذا الدواء.

- ضيق في التنفس.

- السعال في حالات الربو.

- العلاج مع IMAO (العلاج المنصوص عليه في بعض حالات الاكتئاب).

- الرضاعة الطبيعية.

في حالة الشك، يجب عليك طلب المشورة من طبيبك أو الصيدلي.

تحذيرات واحتياطات الاستعمال

التحذيرات

- لا ينبغي استعمال هذا الدواء للسعال المنتج للبلغم. في هذه الحالة، السعال هو دفاع ضروري لإخلاء إفرازات الشعب الهوائية.

- إذا أصبح السعال منتج للبلغم يرافقه احتقان، اللعثم والحمى، يجب استشارة الطبيب.

- بسبب وجود السكرورن، فمن غير المستحسن استهلاك هذا الدواء في حالة عدم تحمل الفركتوز، سوء امتصاص للكلوكوز أو

الكلاكوز أو نقص في سكراز-إينومالاتاز (مرض استقلابي نادر).

احتياطات الاستعمال

- لا ينبغي الزيادة في الجرعات متاجراً ما ينصح به في حالة ظهور الحمى، كما في حالة تدهور أو عدم تحسن بعد 5 أيام، لا تأخذ معه مضاد آخر للسعال، ولكن استشر طبيبك.

- لا تجمع الدواء المسهل لإفرازات الشعب الهوائية (منخم، حال للبلغم) مع مضاد للسعال.

- هذا الدواء يحتوي على السكرورن. يؤخذ بعين الاعتبار في الجرعة اليومية في حالة حمية منخفضة السكر أو مرض السكري.

الحمل و الرضاعة الطبيعية

قبل استخدام هذا الدواء، من الضروري سؤال طبيبك أو الصيدلي.

الحمل

من الممكن أن تأخذ دواء يحتوي على ديكستروميتورفان خلال فترة الحمل، بشرط أن يكون لفترة قصيرة (بضعة أيام) مع

احترام الجرعات الموصى بها.

لكن، في وقت متأخر من الحمل، أخذ ديكستروميتورفان بإفراط قد يسبب آثارا ضارة على الأطفال حديثي الولادة.

ينبغي أن تسعى دائماً لاستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء يحتوي على ديكستروميتورفان.

الرضاعة الطبيعية

يمز هذا الدواء في حليب الأم.

إعطاء جرعات عالية جداً من ديكستروميتورفان للنساء اللواتي يرضعن، يمكن أن يسبب توقف التنفس أو يقلل من نبرة

الرضاعي، لذلك، لا ينبغي استعمال هذا الدواء أثناء الرضاعة.

التفاعل مع الأدوية الأخرى وأشكال أخرى من التفاعل

يرجى اختيار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو اخترت مؤخراً أي أدوية أخرى، حتى لو كان دواء تم الحصول عليه دون

وصفة طبية، خصوصاً إذا كنت تأخذ IMAO (العلاج المنصوص عليه في بعض حالات الاكتئاب).

يحتوي هذا الدواء على مضاد السعال ديكستروميتورفان. لا تخلط هذا الدواء مع أدوية أخرى تحتوي على مضاد للسعال آخر،

حتى لا يتجاوز الحد الأقصى للجرعات الموصى بها.

السلامة: لا تأخذ

AKINDEX

TOUX SÈCHE

Sirop

COMPOSITION

Pour 100 ml de sirop

Adultes : Bromhydrate de dextrométhorphane (DCI) 0,133 g

Excipients : Benzoate de sodium, eau purifiée, arôme abricot, acide citrique monohydraté, solution de saccharose.

Enfants : Bromhydrate de dextrométhorphane (DCI) 0,100 g

Excipients : Benzoate de sodium, eau purifiée, arôme banane, acide citrique monohydraté, solution de saccharose.

FORME PHARMACEUTIQUE

Adultes : sirop, flacon de 200 ml.

Enfants : sirop, flacon de 125 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTITUSSIF.

(R : système respiratoire)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Traitement de courte durée des toux sèches et des toux d'irritation.

ATTENTION! DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des constituants.
- Insuffisance respiratoire.
- Toux de l'asthmatique.
- Traitement par les IMAO (traitement prescrit au cours de certains états dépressifs)
- Ce médicament est contre-indiqué pendant l'allaitement.

En cas de doute, vous devez demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde

- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

- Ne traitez pas par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.

- Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, prenez l'avis de votre médecin.

- En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladie métaboliques rares).

Précautions d'emploi :

- En cas de survenue de fièvre, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, ne pas augmenter les doses au delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consultez votre médecin.

- N'associez pas un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique) avec cet antitussif.

- Ce médicament contient du saccharose : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse

Il est possible de prendre un médicament contenant du dextrométhorphane pendant votre grossesse, à condition que cela soit pendant un temps bref (quelques jours) et aux doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de dextrométhorphane peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né.

Il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de prendre un médicament contenant du dextrométhorphane.

Allaiteme nt

Ce médicament passe dans le lait maternel.

De très fortes doses de dextrométhorphane administrées chez les femmes qui allaient peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En conséquence, la prise de ce médicament est contre-indiquée pendant l'allaitement.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance notamment si vous prenez des IMAO (médicaments prescrits au cours de certains états dépressifs).

Ce médicament contient un antitussif le dextrométhorphane. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE:

• Benzoate de sodium

• Saccharose : Adultes : 11,5 g par cuillère à soupe.

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها بانتهاء قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أستئنلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يتجاوز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تتجاوزها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج. قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ جرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية وأخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات ليفوتيروكس ليس لديه أي آثار على قيادة المركبات و استخدام الآلات

3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

الجرعة، كيفية و / أو طريقة التناول، تردد التناول و مدة العلاج
الجرعة يأخذ دائماً هذا الدواء باحترام تام لتشيرات طبيبك أو الصيدلي.

تحقيق مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت في شك. الجرعة الموصى بها تختلف وفقاً لدرجة المرض، العمر و التحمل الفردي للعلاج. الأعراض قابلة للقطع: يمكن قطعها إلى نصفين عند الحاجة لضبط الجرعة وفق وصفة الطبيب.

ينبغي إعطاء هذا الدواء فقط للأطفال الذين يستطيعون ابتلاع الأفراش.

طريقة و تردد التناول
هذا الدواء يأخذ، من الأفضل في الصباح على الريق مع كوب من الماء.

مدة العلاج
قصور الغدة الدرقية في معظم الحالات، هو مرض نهائى، ينبعى مواصلة العلاج إلى أجل غير مسمى. في جميع الحالات، احترم بدقة وصفة طبيبك.

أعراض و تعليمات الجرعة الزائدة
إذا أخذت كمية زائدة من ليفوتيروكس قرص قابل للقطع، و أنت لست بحاجة لأخذها:

في حالة الجرعات الزائدة أو التسمم العرضي بما في ذلك الأطفال، لا بد أن تعلم بسرعة طبيبك قد يعتزم بيقاف العلاج أو تعليق أو أي إجراء آخر يراه ضروريًا. العلامات أو الأعراض المتصلة بالجرعة الزائدة، لا سيما زيادة في معدل ضربات القلب أو غيرها من علامات فرط التدرق (انظر الفقرة 4)، قد تحدث في بضعة ساعات أو تتأخر ببضعة أيام.

تعليمات في حال نسيان جرعة واحدة أو عدة جرعات

إذا نسيت أخذ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع:

إذا غيّرت جرعة، لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي فاتتك.

تحتوي هذه النشرة:

- 1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى
- 1- ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلاني العلاجي
هذا الدواء هرمونة درقية
دواعي الاستعمال

يوصى باستعماله في الحالات التالية:
• نقص التدرق (نقص إفراز الغدة الدرقية).
• الظروف المرتبطة أو غير المرتبطة بنقص التدرق و التي (الهرمونة المنشطة للغدة الدرقية) TSH تقتضي كبح إفراز.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟

قائمة المعلومات الازمة قبل تناول الدواء
إذا أعلمك طبيبك المعالج بعدم التقبل لبعض أنواع من السكريات يجب أن تتصلوا به قبل تناول هذا الدواء.
الموشرات الضدية:
لا يجوز أبداً استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:
إذا كنت تعاني من حساسية (فرط- حساس) للمادة الفعالة أو إلى أي من المكونات الأخرى في هذا الدواء المذكور في الفقرة 6
إذا كنت تعاني من فرط التدرق (مجموع الأضطرابات الناجمة عن النشاط المفرط للغدة الدرقية)، خارج فرط التدرق المعالج بقصور الغدة الدرقية الناجم عن أدوية ترکيبية مضادة، واليود 131 أو عملية جراحية و التي تحتاج لعلاج بديل بهرمونات الغدة الدرقية (على سبيل المثال في حالة العلاج طويل الأمد لمرض بازدو باشتراك دواء ترکيبی مضاد مع ليفوتيروكسين).
في حالة متلازمة الشريان التاجي الحادة أو التهاب العضلة القلبية الحاد (حدوث التهاب في الجزء العضلي من القلب).
بشكل عام لا يجوز استعمال هذا الدواء، مالم يرتكبي الطبيب خلاف ذلك، في بعض الأمراض القلبية غير المثبتة: مرض الشريان التاجي (أمراض الأوعية الدموية المروية للقلب)، وأضطرابات نضم القلب.

خلال فترة الحمل، لا يستعمل اشتراك الليفوتيروكسين و دواء مضاد لإفراز الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق.
احتياطات الاستعمال؛ تحذيرات خاصة
تحذيرات و احتياطات
شكال، عام، يجب أن يكون العلاج تحت مراقبة سريرية و

LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est une hormone thyroïdienne.

Indications thérapeutiques

Il est préconisé dans les situations suivantes :

- les hypothyroïdies (insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde),
- circonstances associées ou non à une hypothyroïdie où il est nécessaire de freiner la sécrétion de TSH (hormone qui stimule la glande thyroïde).

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais LEVOTHYROX, comprimé sécable dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6,
- si vous souffrez d'hyperthyroïdie (ensemble des troubles provoqués par une activité exagérée de la glande thyroïde), en dehors des hyperthyroïdies traitées avec hypothyroïdie induite par des médicaments antithyroïdiens de synthèse, de l'iode 131 ou une chirurgie et nécessitant un traitement substitutif par hormones thyroïdiennes (par exemple dans le cas du traitement au long cours de la maladie de Basedow par l'association antithyroïdien de synthèse + lévothyroxine).
- en cas de syndrome coronarien aigu ou de myocardite aigüe (inflammation du muscle cardiaque).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, dans certaines maladies cardiaques lorsqu'elles ne sont pas stabilisées : coronaropathies (maladies des vaisseaux irriguant le cœur), troubles du rythme cardiaque.

Durant la grossesse, l'association de la lévothyroxine à un antithyroïdien de synthèse dans le traitement d'une hyperthyroïdie n'est pas indiquée.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hyperthyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

L'hyperthyroïdie ou l'hyperthyroïdie sont susceptibles d'altérer la fertilité. Le traitement d'une hypothyroïdie par Lévothyrox doit donc être adapté sur la base d'une surveillance biologique car un sous-dosage est susceptible de ne pas améliorer l'hyperthyroïdie et un surdosage peut entraîner une hyperthyroïdie.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines
Sans objet.

3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose recommandée varie suivant le degré de la maladie, l'âge et la tolérance de chaque individu au traitement. Les comprimés sont sécables : ils peuvent être coupés en deux si besoin pour adapter la dose à la prescription.

Ce médicament doit être donné uniquement aux enfants pouvant avaler des comprimés.

Mode et fréquence d'administration

Ce médicament est à prendre, de préférence le matin à jeun avec un verre d'eau.

Durée du traitement

L'hyperthyroïdie étant dans la majorité des cas, une maladie définitive, le traitement doit être poursuivi indéfiniment. Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de LEVOTHYROX, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle y compris chez l'enfant, il est impératif de prévenir rapidement votre médecin qui pourra envisager un arrêt ou une suspension de traitement ou toute autre mesure qu'il jugera nécessaire. Les signes ou symptômes liés au surdosage, en particulier une augmentation du rythme cardiaque ou tout autre signe d'hyperthyroïdie (voir section 4), peuvent survenir en quelques heures ou être retardés de quelques jours.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable :

Si une dose a été omise, ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si plusieurs doses ont été omises, contactez votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.